



e-शेतकरी



९६०४४६८७९०



<https://telegram.me/eshetkari>

पशुपालन व शेती विषयी मराठीतुन शास्त्रीय संदेश
प्राप्त करण्यासाठी ९६०४४६८७९० ह्या क्रमांकावर
व्हाट्सअप द्वारे **Subscribe** असा मेसेज करा.
e-शेतकरी टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा.



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीड निर्मुलन:काळाचीगरज

डॉ बाबासाहेब नरळदकर
सहयोगी प्राध्यापक,
पशुविज्ञान महाविद्यालय
मपमविर्वि, परभणी ९४०३८४७७६४


डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडे हे पशुधनाचे एक नंबरचे शत्रू असून
त्याच्या पासून २३ टक्के दुग्धोत्पादनातील घट
व ५० टक्के रोगापासून लागण होऊन
होणाऱ्या मुत्यूचे प्रमाण टाळता येते.



डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडाद्वारे
प्रसारित
होणारे रोग

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडपासून पशुधनासतीन प्रकारे इजापोहचते

१ रक्त शोषण

२ कातडीस इजा

३ घातक रोगांचा प्रसार उदा थायलेरीओसीस

गोचिडाची प्रजात

वहन केलेला रोग

यजमान

अर्गस पेरिंकस

इजीपतीनेल्ला पुलोरम

कोंबडी

बुफीलस मायक्रोप्लस

बबेसीओसीस/लाल मूत्र

गोवशीय
प्राणी

हायलोमा आनातोलीकम

थायलेरीओसीस

गोवशीय
प्राणी

डरमासेनटर

बबेसीओसीस/लाल मूत्र

घोडा

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडामळे होणारे आर्थिक नुकसान

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडमुळे होणारे आर्थिकनुकसान

८०% पशुधन (गोवर्गीय) यांना गोचिडाची लागण होते.

- ❖ एक गोचीड ०.५ मिली रक्तशोषणकरतो.
- ❖ ७०% गोचीडाचे नियंत्रण केल्यास १८%-२३-२६% एवढीदुध वाढसंभवते आणि ५०% मृत्यूदर कमीहोतो (बबेसिओसीस व थायलेरिओसीस मुळे होणारा)
- ❖ गोचीडे बबेसिओसीस व थायलेरिओसीस हे संकरीत गाईंचेआजार फेलवतात.
- ❖ बबेसिओसीस रोगामुळे भारतामध्ये ५७.२ दशलक्ष अमेरिकनडॉलरचे नुकसान होते.(४०२.५० कोटीरुपये प्रतिवर्ष)
- ❖ थायलेरिओसीस रोगामुळे भारतामध्ये ३८४.३ दशलक्ष अमेरिकनडॉलरचे नुकसान होते.(२७०४.८ कोटीरुपये प्रतिवर्ष)

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



पशुधनाचा प्रकार	गोवर्गीय	म्हशी	मेंढी	शेळी
विदेशी/संकरीत गाई	३२०७०११	४९९७७०३		६५३५५३४
दुधातील	१४४४६५९	२१६१९९०		२६४११२८
टक्केवारी	४५%	४३%		४०%
विदेशी/संकरीत बैल	४४३८६६	५९६६८९		
एकूण विदेशी	३६५०८७७	स्रोत: १९ वी पशुगणना २०१२ महाराष्ट्र. दुधाचा भाव महाराष्ट्रशासन यांच्या निर्णयानुसार व७.०२हे दुग्धउत्पादन प्रतिदिन प्रती संकरीतगाय हे केंद्रशासन यांच्या अहवालानुसार गृहीत मानले आहेत.		
देशी गाई	५०५३४९०			
दुधातील	१७१२७२८			
टक्केवारी	३४%			
देशी बैल	६७७९८४०			
एकूण देशी	११८३३३३०			
एकूण	१५४८४२०७	५५९४३९२	२५८०३८१	८४३५३०७

□ एकूण दुधातील संकरीत गाई: १४४४६५९,

□ समजा एक गाई ७.०२ लिटरदुध देते : एकूण दुध १०१४१५०६ लिटर प्रतिदिन

□ समजा २३\$% दुध वाढ गृहीत ठेवल्यास एकूण दुध: २३३२५४६ लिटरवाढ,

□ समजा दुधाचाभाव ३२ रु प्रती लिटर गृहीत धरला असता एकूण वाढीव उत्पन्न : ७४६४१४८४ रु

□ X ३६५दिवस= २७२४४१४२१८५रु प्रतिवर्ष (**दोन हजार सातशे चोवीस कोटी एकेचाळीस लाख**)

\$ स्रोत : Furlong et al. (1996) reduction of 23% in milk Holstein-Zebu cows, Teodoro et al. (1998) reduction of 529 kg (26%) of milk/lactation in Holstein cows. Cited by Martinez et al(2006) Genetics and Molecular Research 5 (3): 513-524 .FUNPEC-RP www.funpecrp.com.br

अर्थशास्त्र

प्रतीगाय दुध ७.०२ ली,
एकूण २३.०० % वाढ =
१.६१ लिटर x रु ३२ =
५१.५२ रुपये प्रतिदिन



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचिडाची उगम स्थाने व पशूच्या शरीरावर वास्तव्य

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचिडाची गव्हाणीतील अंडी



कानाच्या पात्यावरील गोचीडे



रीफिसिफ्यालस (घागऱ्या) मायक्रोप्लस गोचीडे

गोचिडाची गव्हाणीतील अंडी



डोळ्यातील पापणीवरील गोचीडे



डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडाचे पशूच्या शरीरावर वास्तव्य

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



का
ना
ली
ल
गो
ची
ड
अ
र्भ
के




डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



शेपटी खालील गोचीडे



डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



जांगा मधील गोचीड



डोळ्याच्या पापण्या
वरील गोचीड



बाळीवरील गोचीड



मानेवरील गोचीड

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडाच्या प्रजाती

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



हिमोफायस्यालीस



अम्ब्लोमा



हायलोमा



रीफिसिफ्यालस

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडाचे जीवनचक्र

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीडांचे जीवनचक्रनुसार तीन प्रकार आहेत


डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



घागन्या गोचिडाचे जीवनचक्र



एक मादीगोचीड ४००० अंडीघालते. ज्याठिकाणीअंडी घालतेतेथेनियंत्रण करणे अत्नत आवश्यक असते.

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



एकात्मिक गोचीड नियंत्रण

❖ भौतिक: अंडीजाळणे

❖ जैविक:

❖ वनस्पतीजन्य,

❖ बुरशीजन्य किटकनाशाकांचा वापर

❖ कुरनावरील व्यवस्थापन

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



एकात्मिक
गोचीड
नियंत्रण-
दिशा

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



भौतिक पद्धती

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचिडाचीअंडी गव्हानीमध्ये जाळण्याचीसोपी पद्धत .या योगे ३८-४० % गोचीडांची संख्या घटते



डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



वनस्पतीजन्य
गोचीड नाशके

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



करंज तेल,
नीमतेलाचा गोचीड
नियंत्रणासाठी वापर :

जनावरांच्या शरीरावर हिवाळा
किंवा इतर कुठल्याही ऋतूमध्ये
घागऱ्या गोचिडांची लागण
प्रमाणाबाहेर आहे, अशा वेळेस
वनस्पतिजन्य गोचिडनाशकांचा
वापर करावा. यासाठी १०
मि.लि. नीमतेल अधिक १०
मि.लि. करंज तेल अधिक २०
ग्रॅम अंगाचा साबण यांचे द्रावण
प्रति लिटर पाण्यात मिसळावे.
असे द्रावण करून जनावरांच्या
शरीरावर, गोचिडांची अंडी आहेत
त्या जागेवर गोठ्यात फवारावे.



डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



पशधनाच्या
शरीरावर
गोचीडनाशकां
ची फवारणी
उदा:
वनस्पतीजन्य
किटकनाशके

टीप: पशुवैद्यक
डॉक्टरांचा सल्ला
घेणे आवश्यक

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



बुरशीजन्य गोचीड नाशके

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी




गोचीड नियंत्रणासाठी 'मेटारायझिम'चा वापर

'मेटारायझिम' बुरशीचा वापर गोठ्यात गोचिडांच्या अंड्यांचा नाश करण्यासाठी होतो. मेटारायझिमचे द्रावण जनावरांच्या शरीरावर फवारण्यासाठी वापरू नये. केवळ गोठ्यात फवारण्यासाठी याचा वापर करावा.

कृती :

- ▶ शिफारशीत मेटारायझिम पावडर खरेदी करावी.
- ▶ पाच ग्रॅम मेटारायझिम पावडर अधिक पाच मि.लि. दूध प्रति लिटर पाण्यात मिसळून द्रावण तयार करावे.
- ▶ हे तयार केलेले द्रावण गोठ्यात फवारण्यापूर्वी जनावरे गोठ्याबाहेर काढावीत; तसेच चारा व इतर गोष्टीही गोठ्याबाहेर काढाव्यात. गोचीडनाशकाची फवारणी दावणीखाली व गोठ्याच्या भिंतीच्या कडा-कपारीमध्ये जेथे जेथे गोचिडांची अंडी आहेत अशाच ठिकाणी करावी. रात्रीच्या वेळेस फवारणी करणे जास्त फायदेशीर ठरते.



**बुरशीजन्य किटकनाशकाची
पावडर. या पावडर चा
उपयोग करून संशोधन
करण्यात आले. याद्वारे ते
प्रभावी असल्याचे व गोचीड
निर्मूलनासाठी उपयुक्त
असल्याचे सिद्ध झाले.**

स्रोत : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ
राहुरी, किटकशास्त्र विभाग, जैविकनियंत्रण
घटक येथून प्राप्त

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गव्हाणीमध्ये
गोचीडनाशकां
ची फवारणी
उदा:
बुरशीजन्य/
वनस्पतीजन्य
किटकनाशके

टीप: पशुवैद्यक
डॉक्टरांचा सल्ला
घेणेआवश्यक

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गव्हानीतील गोचीडांच्या
अंड्यावर बुरशीजन्य/
वनस्पतीजन्य किटकनाशकाची
फवारणीकेल्यास ते मृत होतात
व नवीनगोचिडाची
पिल्लेअंड्यामधूनबाहेर
पडतनाहीत.
परिणामी, गोचीडांची संख्या
घटत जाते.

साधारणपणे या द्वारे ४८-६०% गोचीडांचे निर्मुलन शक्य
होते. तसेचशरीरावर फवारणी द्वारे देखील या
प्रमाणामध्ये गोचीडांची संख्या घटते

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी




वरील आकृती मध्ये १ कारंज २ निलगिरी आणि ३ कडुनिंब यांचे तेल द्रावणाच्यास्वरूपामध्ये फवारल्यास ते गोचीडांची अन्डीवर परिणाम करतात व त्या योगे अंडी मृत होऊननवीन गोचीड पिल्लांचीनिर्मिती घटत जाते .

४ गोचिडाची जिवंत अंडी ज्यामधूननवीन गोचीडांची निर्मिती होते.

डा बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.००ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

बुरशीजन्य किटकनाशक पावडर फवार्यामुळे गोचीडांची अंडी काळी पडून मृत होतात व नवीन गोचीडांची उत्पत्ती थाबते. हे आकृतीक्रमांक २-६ द्वारे सिद्ध होते. १ न फवारलेली अंडी

डॉ बाबासाहेब नरसुतकर - ९५०३४५११६५ रात्री ६ ०० ते १० ३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीड नियंत्रणासाठी करनावरील व्यवस्थापन

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०




महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



कुरणामध्ये चरणाऱ्या जनावरांचे व्यवस्थापन

- पूर्ण गवत चरून झाल्यावर उन्हाळ्यामध्ये कुरण जाळणे.
- पिकाखालील जमीन चरण्यासाठी व चरण्याचे पडक पिकाखाली, असे केल्यास गोचिडाची अंडी, अर्भके, गोचिडे जमिनीखाली गाडली जातात. ही प्रक्रिया दोन-तीन वर्षांनी केली तर फायदेशीर ठरते.
- चरण्याचे कुरण स्वतंत्र असल्यास त्यांची काल्पनिक पट्ट्यामध्ये विभागणी करून रोटेशन पद्धतीने चारावे.
- चरण्याचे कुरण काही विशिष्ट खुणा ठेवून पट्टेवार विभागणी करावी. गुरांना पट्टा क्रमांक १ नंतर २, ३, ४, ५ अशा क्रमाने रोटेशन पद्धतीत व एकाच पट्टीवर परत चरण्यास सोडू नये- जेणेकरून जनावरांच्या शरीरावरील गोचिडे कुरणावर पडून अंडी घालतात. परंतु अंड्यांतून उत्पत्ती होणाऱ्या नवीन अर्भक गोचिडास यजमान न मिळाल्यामुळे मृत पावतात.



एकाच पट्ट्यामध्ये परत जनावरे चारू नयेत. या चरण्याच्या पद्धतीमुळे गोचिडे व कृमींचेदेखील नियंत्रण करता येते.

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर
पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



गोचीड नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशके

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



तक्ता : गोचीड नियंत्रणासाठी कीडनाशके :

क्र.	कीटकनाशकाचे नाव	वापरण्याची मात्रा	वापरण्याची पद्धत
१	डेल्टामेथ्रीन	२ ते ३ मि.लि. प्रति लिटर पाणी.	पाण्यात सौम्यीकरण करून बाह्य उपयोगासाठी.
२	सायपरमेथ्रीन	१ ते २ मि.लि. प्रति लिटर पाणी.	पाण्यात सौम्यीकरण करून बाह्य उपयोगासाठी.
३	अॅमिट्राज	२ मि.लि. प्रति लिटर पाणी	पाण्यात सौम्यीकरण करून बाह्य उपयोगासाठी.
४	फ्लुमेथ्रीन	१० मि.लि. प्रति १०० किलो वजनासाठी (केवळ गाई बैलांसाठी)	सौम्यीकरण गरजेचे नाही. द्रावण/ औषध पाठीवर सरळ रेषेत (मानेपासून ते शेपटीपर्यंत) टाकावे. केवळ बाह्य उपयोगासाठी.
५	वनस्पतीजन्य	१० मि.लि. प्रति लिटर पाणी.	सौम्यीकरण करून बाह्य उपयोगासाठी.

फ्लुमेथ्रीन हेपाठीवरवापरावयाचे औषध म्हणून वापरू नये. केवळ गाईसाठी वापरावे.

टीप : गोचीड नियंत्रणासाठी वापरत येणारी वरील सर्व कीटकनाशकेही बाह्य उपयोगासाठी असतात. ही कीटकनाशके विषारी असल्यामुळे लहान मुलांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवावीत. कीटकनाशकांचा वापर करताना पशुपालकांना सुरक्षितता बाळगण्याची गरज असते, सर्व रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर गोचिडाच्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने करावा.

- ❖ टीप: रासायनिक कीटकनाशक औषधीचा वापर केवळ शेवटचा उपाय म्हणून करावा.
- ❖ रासायनिक कीटकनाशक औषधीचा वापर पशुवैद्यक यांच्या मार्गदर्शनाखाली करावा.
- ❖ हि औषधे विषारी असल्यामुळे वापरतांना काळजी व खबरदारी बाळगावी.
- ❖ बाजारामधून विकत आणते वेळेस त्या कीटकनाशक औषधीचे बाजारातील नाव पशुतज्ञ यांच्या कडून लिहून घ्यावे



महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी



हे करावयास विसरू नका :

- संकरित पशूंमध्ये गोचिडांची लागण जास्त होते म्हणून त्यांचे गोचिडापासून संरक्षण करणे महत्वाचे ठरते. एक गोचीड देखील जनावरांमध्ये आदिजीव आजार पसरवून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकतो.
- प्रवासामधून आणलेल्या संकरित गुरांना पूर्वीच्या गोठ्यामध्ये तत्काळ बांधू नये. कारण गोठ्यातील गोचीड त्यांच्यावर लगेचच प्रादुर्भाव करतात. म्हणून बाजारातून आणलेल्या संकरित गाईंना पहिल्यांदा मोकळ्या जागेत बांधून गोठा कीटकनाशकांनी धुऊन स्वच्छ करावा. त्यानंतर जनावरे गोठ्यात बांधावीत.
- ताप, निम्फ ग्रंथीची सूज अथवा लाल लघवी आलेल्या संकरित गाईंना तत्काळ पशुवैद्यकाकडून औषधोपचार करावेत. ही गुरे गोचिडास लवकर बळी पडतात.
- कीटकनाशकांचा वापर काळजीपूर्वक करावा. विषबाधा होऊ नये म्हणून सर्वतोपरीने काळजी घ्यावी.
- कुठल्याही कीटकनाशकांचा वापर करतेवेळी त्यांची पाण्यातील मात्रा, कीटकनाशकाची निवड यासाठी पशुवैद्यक तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

- कीटकनाशकांचा वापर काळजीपूर्वक करावा. विषबाधा होऊ नये म्हणून सर्वतोपरीने काळजी घ्यावी.
- कुठल्याही कीटकनाशकांचा वापर करतेवेळी त्यांची पाण्यातील मात्रा, कीटकनाशकाची निवड यासाठी पशुवैद्यक तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
- संकरित जनावरे, वाहतूक करून आणलेल्या जनावरांना गोचिडाची लागण होऊ नये म्हणून गोठ्यातील गोचिडे नष्ट करावीत.
- कुठलेही कीटकनाशक वापरून जनावरांच्या बाह्य शरीरावर फवारणीबरोबरीच गोठ्यातील गोचिडाची अंडी नष्ट करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण जनावरांच्या शरीरावरील गोचिडे मरतात; परंतु गोठ्यामध्ये नवीन अंड्यांतून निर्माण झालेल्या गोचिडांची लागण होते, त्यामुळे पशुपालकाचा गैरसमज असा होतो, की फवारलेली कीटकनाशके प्रभावी नाहीत; परंतु हे लक्षात ठेवावे, की कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे जनावरांच्या शरीरावरील गोचिडे मृत झाली तरीही गोठ्यातील गोचिडे नष्ट न केल्यामुळे हे सर्व उद्भवते.

डॉ बाबासाहेब नरळदकर- ९४०३८४७७६४ रात्री ६.०० ते ७.३०



धन्यवाद