

१) ग्लॅण्डर्स ✚

ग्लॅण्डर्स हा जिवानूंचा संसर्गजन्य आजार असून अश्ववर्गीय प्राण्यांत गाढव,घोडे व खेचरे यांचेमध्ये आढळतो. हा रोग बुरखोडलेरीया मॅली या सुक्ष्म जिवानूपासून अश्ववर्गीय प्राण्यांमध्ये होतो. (रोग प्राचीन असून,हिप्पोक्रेटस (इ.स.पूर्व 4580) या आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या आद्य जनकाच्या लिखाणामध्ये या रोगाचा उल्लेख आढळतो.)

अश्व कुळापैकी गाढवामध्ये हा रोग अतितीव्र स्वरूपात,घोडयांमध्ये तीव्र व सौम्य स्वरूपात तर खेचरांमध्ये दोन्ही स्वरूपात आढळतो. तर इतर प्राण्यांपैकी कुत्रा आणि मांजरे यांना ग्लॅण्डर्स रोग होऊ शकतो.गायी-म्हशी,शेळ्या-मेंढ्या,डुकरे या जनावरांत हा रोग आढळत नाही. मात्र बाधीत जनावरांच्या (घोडयांच्या) संपर्कात येणा-या माणसात हा रोग येण्याची शक्यता असते.

ग्लॅण्डर्स प्रसार-

ग्लॅण्डर्स या रोगात अश्वजातीय प्राण्यांच्या श्वसन संस्था आणि बाह्य कातडीवर रसग्रंथींना गाठीनिर्माण होऊन त्यात पू तयार होतो. बाधीत अश्व प्राण्यातील नाकातील स्त्रावाने,चारा,खादयाचे, खाद्यान्ने, पीण्याचे पाणी तसेच तबेले,चारा पाण्याची भांडी यात जंतूंचा शिरकाव होतो. चारा पाण्यावाटे संसर्ग इतर घोडयांना होतो. खरारा करण्याच्या साधनातही बाधीत घोडयाकडून इतर घोडयांना संसर्ग होण्याची शक्यता असते. श्वसन मार्गे जंतूंचा शरीर प्रवेश क्वचित होतो. बाधीत घोडयांकडून माणसांना होणारा संसर्ग प्रामुख्याने मानवी शरीरावरील जखमांद्वारे होतो.

ग्लॅण्डर्स संबंधी लक्षणे -

दुषित चारा पाण्यावाटे ग्लॅण्डर्सच्या जंतूंचा शिरकाव आतडयामार्गे घोडयांच्या शरीरात होऊन मग हे जंतू रक्तावाटे श्वसनमार्गात, त्यातही प्रामुख्याने फुफ्फुसात जाऊन स्थिरावतात. श्वास नलीका व कातडी येथेही काही प्रमाणात हे जंतू मुक्काम ठोकतात. जंतू स्थिरावलेल्या ठिकाणी प्रथम लहान आकाराच्या गाठी तयार होतात व या गाठींमध्ये यथावकाश पू तयार होतो व गाठी फुटून त्यांचे व्रणात रुपांतर होतो. यातील जंतू मग आजूबाजूच्या इतर पेशीत पसरतात व तेथे गाठी निर्माण करतात. शेवटी तीव्र स्वरूपाचा फुफ्फुस दाह (न्युमोनिया) होऊन श्वसनक्रियेतील अडथळ्यांमुळे घोडा मृत्यूमुखी पडतो. गाठी वाढण्याच्या व फुटण्याच्या काळातच जंतू श्वसनसंस्थेतील स्त्रावात मिसळून आजूबाजूचे वातावरण दुषित करता. तीव्र स्वरूपाच्या ग्लॅण्डर्स मध्ये खूप ताप येणे,नाकातून प्रथम पातळ व नंतर पू मिश्रीत मधासारखा घट्ट स्त्राव वाढणे,खोकला व श्वसनास अडथळा व दोन तीन दिवसात मृत्यू अशी लक्षणे आढळतात.

सौम्य व दिर्घकालीन ग्लॅण्डर्समध्ये श्वसन संस्थेबरोबर बाह्य त्वचा आणि नाकातील अंतःत्वचा बाधीत होतात. बाह्य त्वचेवर साधारणपणे एक ते दोन सेंटीमीटर आकाराच्या गाठी तयार होतात व फुटतात व व्रणात रुपांतरीत होतात. या व्रणातून काळसर मधाच्या रंगाच्या व जाडीचा स्त्राव वाहू लागतो. कित्येकदा हे व्रण कातडीत खोलवर शिरून फीस्ट्युला निर्माण करतात. कातडी खालील लसिका ग्रंथीची सूज व त्यातून स्त्राव वाहणे ही लक्षणे दिसून येतात.

ग्लॅण्डर्समध्ये बाह्य त्वचेवरील व्रण प्रामुख्याने मागील पायाचे आतील बाजूस जास्त प्रमाणात दिसतात. नंतर बाह्य त्वचेवरील दृष्यस्वरुपाच्या ग्लॅण्डर्सला फार्सी असे दुसरेही नांव आहे. दिर्घकालीन किंवा सौम्य स्वरुपाच्या ग्लॅण्डर्सने बाधीत जनावरे कधीच पूर्णतः बरी होत नाहीत. कालांतराने ती मृत्यू पावत असली तरी मधल्या काळात जंतू प्रसाराचे काम करतात.

रोग निदान-

या रोगाचे निदानासाठी मॅलीन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन व इलायझा अशा खात्रीशीर चाचण्या उपलब्ध आहेत. डोळ्याच्या खालच्या पापणीच्या अंतःत्वचेत मॅलीन हे द्रव्य टोचून 48 ते 72 तासा नंतर त्यांचे डोळ्यांवर होणारे परिणाम पाहणे, ही घोड्यांना क्षेत्रिय स्तरावर तपासण्यांची सोपी व खात्रीलायक पध्दत आहे.

ग्लॅण्डर्स रोग प्रादूर्भाव उदभवल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजना-

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान (National Research Centre on Equines) अथवा रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे 67 यांनी घोड्यांमध्ये ग्लॅण्डर्स होकारार्थी निष्कर्ष कळविल्यानंतर तात्काळ खालील प्रमाणे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

1. बाधीत अश्ववर्गीय प्राणी तात्काळ इतर अश्ववर्गीय प्राण्यांपासून वेगळा करणे व त्याच्या खादयपाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करणे
2. सदर जागेचे तात्काळ निर्जंतूकीकरण करणे. निर्जंतूकीकरण करण्यासाठी या Sodium Hypochlorite ,(500 ppm available chlorine) Gluteraldehyde,(1:2000 concentration) Benzalkonium chloride ,Potasium permanganate या जंतूनाशकांपैकी एक जंतूनाशक वापरावे.
3. अश्ववर्गीय प्राण्याला Euthanasia देण्यापूर्वी संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद ग्रामपंचायत यांना लेखी कळविण्यांत यावे. मृत अश्ववर्गीय प्राणी पुरण्यासाठी जागेची निवड करण्यांत यावी. सदर जागा मनुष्यवस्तीपासून दूर असावी तसेच पाण्याच्या स्त्रोताजवळ (नदी/विहीर/तळे/धरणाचे पाणी-बॅकवॉटर) नसावी.
4. सदर गावातील ,तालुक्यातील अथवा शहरातील अश्ववर्गीय प्राण्यांत रोग प्रादूर्भाव उदभवल्यास , संबंधित पोलीस स्टेशन अथवा पोलीस चौकी अथवा पोलीस अधिका-यांशी संपर्क साधावा व याबाबत तसेच Prevention and control of Infectious and contagious diseases in Animals Act 2009 बाबत लेखी पत्र दयावे. तसेच अश्ववर्गीय प्राण्याच्या मालकाकडून सदर अश्ववर्गीय प्राण्याला Euthanise करण्यासाठी ताब्यात घेण्याबाबत व पोलीस संरक्षण मिळण्याबाबत पत्रात नमुद करावे.
5. ग्लॅण्डर्स रोग प्रादूर्भाव उदभवल्यानंतर मा.जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांना लेखी कळविण्यांत यावे. तसेच त्यांना सदर जिल्ह्यामधून अश्ववर्गीय प्राण्यांची वाहतूक तात्काळ बंद करण्याबाबत तसेच जत्रा आयोजीत न करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्याबाबत कळवावे.
6. ग्लॅण्डर्स बाधीत अश्ववर्गीय प्राण्यांच्या मालकास सदर रोगाबाबत कल्पना देणे यावी. तसेच Prevention and control of Infectious and contagious diseases in Animals Act 2009 अंतर्गत

अश्ववर्गीय प्राण्याला Euthanise करावा लागणार असल्याबाबत लेखी कळवावे व शक्य असल्यास सदर अश्ववर्गीय प्राण्याच्या मालकाचे प्राणी Euthanise करण्याबाबत संमतीपत्र घ्यावे.

7. ग्लॅण्डर्स बाधीत अश्ववर्गीय प्राण्यांची छायाचित्र घेण्यांत यावीत. तसेच Euthanasia देऊन झाल्यानंतरही अश्ववर्गीय प्राणी मृत होताच छायाचित्रे घेण्यांत यावीत.

8. मृत अश्ववर्गीय प्राणी पुरण्यासाठी 12' फुट लांब 6' फुट रुंद व 8' फुट खोल खड्डा तयार करण्यांत यावा. त्यामध्ये चुन्याची फक्की पसरावी व मग मृत अश्ववर्गीय प्राणी खड्यात ठेवून पूरण्याची क्रिया पूर्ण करावी. मृत अश्ववर्गीय प्राण्याच्या शवावरही कमीत कमी 1' फुट मातीचा थर असावा. सदर जागेत कुंपण घालून जागा संरक्षित करावी जेणे करून मोकाट कुत्री अथवा इतर जनावरे सदर जागेत प्रवेश करणार नाहीत.

9. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र F No K-50/1/2017-LH Dated 18.1.2017 तसेच Prevention and control of Infectious and contagious diseases in Animals Act 2009 नुसार सर्व कार्यवाही करण्यांत यावी.

10. उपरोक्त नमुद पत्रानुसार ग्लॅण्डर्स रोगासाठी सिरोसब्रह्मक्षण करण्याकरीता 0-5 किमी परिघातील गावांची यादी व अश्ववर्गीय प्राण्यांची संख्या (100./ अश्ववर्गीय प्राण्यांचे रक्तजल नमुने गोळा करण्यासाठी) तसेच 5-10 किमी परिघातील गावांची यादी व अश्ववर्गीय प्राण्यांची संख्या (50./ रक्तजल नमुने गोळा करण्याकरिता) तयार करण्यांत यावी. गोळा करण्यांत आलेल्या रक्तजल नमुन्यांवर जबाबदारीने, व्यवस्थितपणे नंबर टाकावेत व सदर अश्ववर्गीय प्राण्यांचे वय, नाव, वर्णन, लिंग, गाव, जिल्हा, तालुका व मालकाचे नाव अशी सर्व माहितीचा तक्ता करून रक्तजल नमुने शीतसाखळी राखून रोग अन्वेषण विभाग पुणे येथे पाठवावेत. रक्तजल नमुने गोळा करण्यासाठी क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय अधिका-यांची मदत घ्यावी. तसेच नमुने संकलनाचे वेळापत्रक तयार करून/ रोग अन्वेषण विभाग पुणे यांना कळवावे.

11. मृत अश्ववर्गीय प्राण्याच्या संपर्कात असलेल्या इतर सर्व अश्ववर्गीय प्राण्यांचे रक्तजल नमुने सुध्दा गोळा करून ग्लॅण्डर्स रोगाचे तपासणीसाठी रोग अन्वेषण विभागास पाठवावेत.

12. ग्लॅण्डर्स बाधीत अश्ववर्गीय प्राण्याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व माणसांची वैद्यकीय तपासणी नजीकच्या शासकीय रुग्णालयातून करून घेण्यासाठी तेथील वैद्यकीय अधिका-यांना लेखी कळविण्यांत यावे.

13. Euthanise करण्यांत आलेल्या अश्ववर्गीय प्राण्याच्या नुकसान भरपाई पोटी सदर अश्ववर्गीय प्राण्याचे मालकास अनुदान देण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र 53-57/2006- LDT (LH) Pt.Vol.II Dated 18.8.2015 नुसार प्रस्ताव प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे मार्फत मा.आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयास सादर करावा.

14. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा.आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य तसेच सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग पुणे 67 तसेच त्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना वेळोवेळी सादर करावा.

