

४) घटसर्प

घटसर्प हा पशुधनास जिवाणूमुळे होणारा आजार आहे. हा आजार पास्ट्यूरेल्ला मल्टोसिडा या जिवाणूमुळे होतो. या आजारास हिमरेजिक सेप्टिसेमिया असे म्हणतात. सर्व प्रकारच्या पशुधनात हा आजार दिसून येतो, जसे गाय वर्ग, म्हैस वर्ग, मेंढ्या व शेळ्यांमध्ये हा आजार होतो. देशी गाय पेक्षा म्हैस वर्गाचे पशुधन जास्त बळी पडतात.

रोगप्रसार - पशुधनात हे जिवाणू घशात वास्तव्यास असतात. परंतु विविध ताणतणावामुळे जसे पोषक चारा व पशुखाद्य न मिळणे, कुपोषण, दमट वातावरण, अतिवृष्टी, थंडी, जंतुंची बाधा, पशुधनाचे स्थलांतर अथवा वाहनांद्वारे त्यांची वाहतूक, लाळ खुरकूत रोगांमध्ये पशुधनाची चारा खाता न आल्यामुळे होणारी उपासमार, प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेळेवर केलेले नसल्यास पशुधनाची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे या कारणांनी हे जिवाणू वाढीस लावून रोग निर्माण करतात. तसेच या जिवाणूंचा संसर्ग बाधित चारा - पाणी व बाधित पशुधनाच्या संपर्कामुळे होतो. या आजाराचा संसर्ग झाल्यापासून तीन ते पाच दिवसात रोगाची लक्षणे दिसू लागतात. रोगाची लक्षणे दिसू लागल्यापासून 24 तासात बाधित पशुधन दगावू शकते. हा आजार घातक असतो आणि कधीकधी बाधित पशुधनात मरतुकीचे प्रमाण जास्त असते.

आजारी पशुधनात दिसणारी लक्षणे - श्वासोच्छ्वासास त्रास, ताप येणे, नाक व तोंडास फेस, चारा कमी खाणे किंवा चारा खाणे बंद पडणे, रवंथ बंद पडणे, पशुधनात हालचाल मंदावणे, एकाच जागी बसून राहणे ई. रोगाच्या पुढील टप्प्यात पशुधनाच्या घशाला सूज येते व ती सूज खाली गळ्याकडे व पोटाकडे सरकते.

औषधोपचार - पशुधनास वेळीच अँटिबायोटिक, ताप प्रतिबंधक, सूज प्रतिबंधक औषधे, जिवनसत्वे व सलाईन दिल्यास आजारी पशुधन बरे होऊ शकते.

रोगनिदान - या रोगाचे निदान पशुधनातील लक्षणे, मृत पशुधनाचे शवविच्छेदन तसेच प्रयोगशाळेतील चाचण्यांद्वारे करता येते.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - या रोगाचा वेळेत प्रतिबंध केल्यास या रोगापासून पशुधन शेतकरी व पशुपालक यांचे होणारे नुकसान टाळता येते.

- पशुपालकाने त्यांच्या पशु निवाऱ्यात अथवा गोठ्यात आजारी पशुधनास निरोगी पशुधन यापासून स्वतंत्र बांधावे. पशुधनावर ताणतणाव येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

- आजारी पशुधनास चारा व पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी. आजारी पशुधनात काम करणाऱ्या व्यक्ती व तेथील पाणी खाद्य दुधाची भांडी इत्यादी निरोगी पशुधनासाठी वापरू नये.
- पशुधन व्यवस्थापनाच्या आदर्श पद्धती व जैव सुरक्षा उपायांचा अवलंब करावा.
- पशुधनाच्या गोठ्यात नियमित स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी 10% कॉस्टिक सोड्याचे द्रावण किंवा एक टक्का हायपो (सोडियम हायपो क्लोराईड) द्रावण वापरावे तसेच नियमित निर्जंतुक द्रावणे पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने वापरावीत.
- आजारी पशुधनास त्याच्या निवारा अथवा गोठ्यात सूर्यप्रकाश व खेळती हवा मिळेल याची खबरदारी घ्यावी. तसेच गोठ्यात चुन्याची फक्की पसरण्यात यावी. गोठ्यात कमी जागेत जास्त पशुधन दाटीवाटीने बांधू नये.
- नवीन खरेदी केलेले पशुधन मुख्य कळपात मिसळू नये तसेच ते किमान 15 दिवस मुख्य कळपापासून दूर बांधावे. आजाराची लक्षणे नसल्यास त्या पशुधनास मुख्य कळपात समाविष्ट करावे.
- या आजाराने मृत पशुधनाच्या शवाची विल्हेवाट व्यवस्थितरित्या शास्त्रीय पद्धतीने करावी. यासाठी एक मीटर खोल खड्डा घ्यावा. तळाला चुन्याच्या फक्कीचा थर द्यावा. नंतर मृत पशुधनास ठेवावे आणि त्या पशुधनावर चुन्याचा थर द्यावा. हा खड्डा बुजवल्यानंतर स्वापदाद्वारे मृत शव उकरून काढू नये म्हणून दगड ठेवावेत.
- पशुधन आजारी असल्यास त्वरित पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क करावा आणि औषधोपचार करून घ्यावेत.
- घटसर्प लसीकरण पावसाळ्यापूर्वी करून घ्यावे तसेच लस उत्पादकाच्या सूचनेनुसार लस मात्रा आणि वर्षात आवश्यकतेनुसार दुसरी मात्रा देण्यात यावी. घटसर्प लसीकरण करत असताना लाळ खुरकूत आणि इतर लसीकरण करावयाचे असल्यास दोन लसीकरणा मध्ये किमान पंधरा दिवसांचे अंतर राखावे जेणेकरून रोगप्रतिकारशक्ती चांगली विकसित होते.