

चयापचय रोग

1) दुग्ध ज्वर (मिल्क फिवर)

या आजारास दुग्धज्वर, दुधाचा ताप किंवा मिल्क फिवर असे नाव असले तरी यामध्ये जनावराचे तापमान नेहमीपेक्षा कमी झालेले असते व जनावरास ताप नसतो. दुग्धज्वर किंवा मिल्क फिवर हा आजार साधारणपणे जास्त दूध देणाऱ्या गायी आणि म्हशींमध्ये आढळून येतो. जास्त दूध देणारी जनावरे त्यांच्या तिसऱ्या ते पाचव्या वितामध्ये या आजारास बळी पडण्याचे प्रमाण मोठे आहे. हा आजार मुख्यत्वेकरून संकरित गायी व म्हशींमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो.

आजाराची कारणे:-

- रक्तातील कॅल्शियमचे प्रमाण कमी होणे हे या आजाराचे मुख्य कारण आहे. यासाठी खालील गोष्टी कारणीभूत ठरतात.
- गाभण किंवा दुधाळ जनावरांतील कॅल्शियमची वाढलेली गरज.
- चान्यातून कमी प्रमाणात कॅल्शियम मिळणे. चान्यामध्ये कॅल्शियम व स्फुरदाचे कमी प्रमाण तसेच 'ड' जीवनसत्त्वाची कमतरता.
- चान्यातील कॅल्शियमचे शोषण न होणे.
- गाभण काळात गरजेपेक्षा जास्त कॅल्शियम देणे.
- आहारात ऑक्झेलेट आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण अधिक असणे.
- विण्यापूर्वी किंवा विल्यानंतर जनावराची होणारी उपासमार.
- जनावरांना ऊसाचे वाढे जास्त प्रमाणात खाऊ घालतात, वाढ्यांमध्ये असणारे ऑक्झेलेट चान्यातील कॅल्शियमबरोबर संयुग तयार करून लघवीवाटे बाहेर निघून जातो व जनावरास कॅल्शियमची उपलब्धी होत नाही.
- हिरवा चारा न मिळणे व जास्त दूध उत्पादन या कारणांनी हा आजार मोठा प्रमाणात आढळतो.

आजाराची लक्षणे:- सर्वसाधारणपणे तीन अवस्थांमध्ये हा आजार आढळून येतो.

- प्रथम अवस्था: जनावर सुस्त होते आणि चारा खाणे व दूध देणे कमी करते. डोके हलविणे, सतत जीभ बाहेर काढणे, दात खाणे, अडखळत चालणे अशी लक्षणे दिसू लागतात.
- द्वितीय अवस्था: जनावर खाली बसते. ते उभे राहू शकत नाही. बसलेल्या अवस्थेत मान एका बाजूला वळवते. शरीर थंड पडते, श्वासोच्छवास व नाडीचे ठोके जलद होतात, नाकपुड्या कोरड्या पडतात. शेण टाकणे व

लघवी करणे बंद होते, दूध देणे बंद होते, रवंथ करणे थांबून पोट फुगते.

- तिसरी अवस्था: जनावरे आडवी पडतात. श्वासोच्छवास मंद होतो. शरीराचे तापमान आणखी कमी होऊन शरीर थंड पडते. डोळ्यांना हात लावला असता पापण्यांची हालचाल होत नाही.
- जनावराचे तापमान नेहमीपेक्षा कमी झालेले असते व जनावरास ताप नसतो.



उपचार:-

कॅल्शियम बोरोग्लुकोनेट 25 टक्के इंजेक्शन साधारण 1 मिली प्रतिकिलो वजन या प्रमाणात शरीरातून दिल्यास जनावरे बरी होतात. आजारातून बरे होण्याचे लक्षण म्हणजे जनावर उठून उभे राहते, नाकपुड्या ओल्या होतात, शरीराचे तापमान पूर्ववत होते, चारा खाणे, लघवी करणे आणि शेण टाकणे सुरू होते.

प्रतिबंधात्मक उपाय:-

- जनावरास योग्य आहार द्यावा.
- गाभण काळात योग्य प्रमानत व सकस आहार द्यावा.
- गाभण काळात जनावरांना थोडेसे फिरवल्यास व्यायाम मिळतो.
- 50 ग्रॅम खनिज मिश्रण खुराकातून द्यावे.
- ऊसाचे वाढे जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नये.
- विण्यापूर्वी साधारण एक आठवडा आधी जीवनसत्त्व 'ड' चे इंजेक्शन देणे फायदेशीर ठरते.
- शरीरावाटे किंवा खुराकातून कॅल्शियम दिल्यास उपयुक्त ठरते.

2) केटोसिस (रक्तजल आम्लता) :

कारणे:-

अतिदूध उत्पादन असणाऱ्या जनावरांमध्ये व्यायल्यानंतर एक ते दोन महिन्यांच्या कालावधीत हा आजार दिसून येतो. यामध्ये जनावराच्या रक्तातील शर्करेचे प्रमाण कमी होते. किटोन आम्लाचे प्रमाण वाढते आणि ते रक्तात पसरते. यालाच रक्तजल आम्लता किंवा किटोसिस असे संबोधले जाते. आहारात प्रथिने, तंतुमय पदार्थ, ऊर्जा हे घटक गाईच्या दूध देण्याच्या प्रमाणात असावे लागतात.

लक्षणे:-

१. जनावराचे दूध उत्पादन २० ते ४० टक्क्यांनी कमी होते.
२. आंबवण खाणे जनावर बंद करते.
३. रवंथ करीत नाही. तोंडाला, लघवीला व दुधाला गोड वास येतो.
४. खूप लाळ गळते. गाय हनुवटी किंवा नाकपुडी गव्हाणीला किंवा जमिनीला टेकवून ठेवते.



उपाय:-

- जनावराला गूळ आणि खनिज मिश्रण खायला द्यावे.
- जनावराच्या आहारात अधिक खुराक द्यावा. आहारामध्ये चांगल्या प्रतीचा चारा असावा.
- प्रतिबंधक उपाय म्हणून दुधाच्या प्रमाणात संतुलित आहार देऊन ऊर्जेचा पुरवठा योग्य प्रमाणात करावा.

३) डाऊनर गायीचा आजार:

कारणे:-

- वितांना स्नायूंची कमी-अधिक ताणामुळे होणारी दुखापत, मागच्या पायाच्या सांध्याचे आजार, दुग्धजन्य ताप, पायाचे आखडलेले स्नायू.
- गाई-म्हशीत हा आजार व्यायल्यानंतर २-४ दिवसांत दिसतो.
- रक्तातील कॅल्शियम, स्फुरद, मॅग्नेशियम यांचे प्रमाण योग्य असते; पण स्नायूतील पोटॅशियमचे प्रमाण कमी होते.

लक्षणे :-

- ताप नसतो, उठू शकत नाहीत; परंतु उठण्याचा प्रयत्न करतात.
- कधीकधी शरीराचा तोल सांभाळता न आल्यामुळे जनावरे पडतात.
- काही वेळा कुत्र्यांप्रमाणे दोन पाय पुढे आणि दोन पाय मागे पसरून बसतात.

उपचार :-

- पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याने तातडीने उपचार करावेत.
- गायीच्या पोटाच्या खाली पोते घालून उभे करावे. पायांना वेदनाशामक मलमाने मालिश करावे.