



दुग्ध व्यवसायामध्ये सध्याच्या ठाणबंद पध्दतीमध्ये जनावरांचे व्यवस्थापन करताना अधिकाधिक वेळ गोठ्याची स्वच्छता व जनावरांच्या स्वच्छतेमध्ये जातो. ठाणबंद पध्दतीत वर्षानुवर्षे गाई-म्हशींना एका जागी बांधल्यामुळे काही समस्या उद्भवत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पायांचे, सांध्यांचे, खुरांचे आजार, कासेचे आजार स्तनदाह, गर्भाशयाचे विकार इ. मोठे आजार संभवतात.

मुक्त संचार गोठा पध्दती

वरील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पशु-पालकांचा अधिक पैसा व वेळ वाया जात आहे.

वरील सर्व समस्यांवर खात्रीशीर उपाय म्हणजे मुक्त संचार गोठा पध्दतीच्या गोठ्यामध्ये जनावरांचे संगोपन करणे. यामध्ये मोकळ्या जागेत कुंपण करून जनावरांना दावे न लावता मुक्त ठेवण्यात येते. (२०० ते २५० चौ. फूट) व त्यात वैरण पाणी व स्वच्छ हवा २४ तास पुरविली जाते.



मुक्त संचार गोठा पध्दतीचे फायदे :-

१. शेण उचलावे लागत नाही.
२. फिरण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने पाय व खुराचे आजार होत नाही.
३. स्तनदाहाचे प्रमाण अत्यल्प असते.
४. जनावरांना उन्हात अथवा सावलीत बसण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने गरजेनुसार नैसर्गिक वातावरणाचा लाभ होतो.
५. पिण्यासाठी पाणी २४ तास उपलब्ध ठेवलेस तहान लागलेनंतर पाणी पिणे जनावरांना शक्य होते याचा फायदा दुग्धोत्पादन वाढीमध्ये दिसून येतो.
६. नैसर्गिक सर्व सुविधा मिळल्यामुळे गाई, म्हशी आनंदी राहतात ज्यामुळे म्हशीमधील पान्हा सोडणेची समस्यासुध्दा कमी होते.
७. मुक्त संचार गोठा पध्दतीमध्ये या गोठ्यात कोंबड्या पाळल्यास त्या जनावरांच्या अंगावरील व गोठ्यातील गोचीड/किटक खातात ज्यामुळे जैविक नियंत्रण होते.

दुग्धव्यवसायामध्ये वेळ, मनुष्यबळ व पैशाची बचत करणेचे दृष्टिने पशुपालकांनी मुक्त संचार गोठा पध्दतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

मुक्त संचार गोठा पद्धतीमध्ये दुधाळ जनावरांसाठी जागा आवश्यकता.

जनावराचा प्रकार	तळजागा प्रति जनावर शेडची जागा (चौ. मि.)	खुली जागा (चौ. मि.)
वासरे (८ आठवडे पेक्षा लहान)	१.००	२.००
वासरे (८ आठवडे पेक्षा मोठी)	२.००	४.००
कालवडी/ पारडया	२.००	४-५
गाय	३-५	७.००
म्हैस	४.००	८.००
व्यायला झालेली गाय/म्हैस	१२.००	२०-२५
खोंड	१२.००	१२०.००
बैल	३.५	७.००

(Source- ICAR NDRI Karnal)

वासरासाठी चिक/दुधाची गरज

वजन (किलो)	वय (दिवस)	चिकाचे प्रमाण	दुध (किलो)
३० किलो पर्यंत	०-४	वजनाच्या १० टक्के	--
३० किलो पर्यंत	५-३०	--	वजनाच्या १० टक्के
३१ ते ६० किलो पर्यंत	--	--	वजनाच्या ५ टक्के

टिप : वासरांना १-१/२ ते २ महिने वयानंतर वासराचे खाद्य (काफ स्टार्टर) देण्यात यावे. वयाच्या ६० ते ९० दिवसानंतर दुधाचे प्रमाण हळूहळू कमी करावे आणि वासरांना ७५० ग्रॅम पर्यंत पशुखाद्य देण्यात यावे. वयाच्या २ ते ३ आठवड्यापासून वासरांना मऊ हिरवा चारा खावयास दिल्यास त्यांच्या पोटाची वाढ व्यवस्थित होते.

३ महिन्यांपर्यंतच्या वासरांचे खाद्य आहार

वासरांचे वय	संपूर्ण दुध ग्रॅम / दिवस	साय काढलेले दुध ग्रॅम / दिवस	वासरांचा आहार ग्रॅम / दिवस	चांगल्या प्रतीचे वाळलेले गवत ग्रॅम / दिवस
०-३ दिवस	२५००(चीक)	--	--	--
४-७ दिवस	२५००	--	--	--
२ आठवडे	३०००	--	१००	३००
३ आठवडे	३२५०	--	३००	५००
४ आठवडे	३०००	--	४००	६००
५ आठवडे	१५००	१०००	५००	७००
६ आठवडे	--	२५००	६५०	७५०
७ आठवडे	--	२०००	८००	८५०
९ आठवडे	--	१२५०	१२००	११००
१० आठवडे	--	--	१३००	१२००
११ आठवडे	--	--	१४००	१३००
१२ आठवडे	--	--	१५००	१५००
१३ आठवडे	--	--	२०००	२०००

३ महिन्यांनंतरच्या वासरांचे खाद्य आहार

वासरांचे वय	अल्प मिश्रण (Concentrate)(किलो ग्रॅम)	पोटभरु खाद्य (Roughage) (किलो ग्रॅम)
३-६ महिने	१ ते १.५ किंवा २	बरसीम १.५-२.५ चारा/सुकलेली वैरण २ किंवा हिरवा मका ७.५-८
६-९ महिने	२ किंवा १	गव्हाचे काड २-३ बरसीम १.५-२.० चारा/सुकलेली वैरण ५
१ वर्ष ते गर्भधारणेपर्यंत	२ किंवा १.५	हिरवा मका किंवा बरसीम ३०-३५ सुकलेला चारा ३०-३५

संतुलीत खाद्य तयार करण्याचे सूत्र

अ.क्र	खाद्य घटक	प्रमाण/भाग
१	भरडलेले धान्य - उदा. मका,ज्वारी,बाजरी	३०
२	गहू,ज्वारी,बाजरी यांचा कोंडा	२०
३	भरडलेल्या डाळी उदा. तूर,चना,उडीद	१२
४	तेल विरहित पेंड-सरकी, शेंगदाणा, सोयाबीन	२०
५	तेलयुक्त पेंड-सोयाबीन, सूर्यफुल	१५
६	खनिज क्षार मिश्रण	०२
७	मीठ	०१
	एकूण	१००

विविध शारीरिक अवस्थेमध्ये संतुलित खाद्य देण्याचे प्रमाण

पशुधन	उदरनिर्वाहाकरिता	दुध उत्पादनाकरिता
गाई (देशी)	१ ते १.५ कि.प्रतिदिन	२.५ लिटर दुधाकरिता १ किलो प्रतिदिन
संकरित गाई/म्हशी	१.५ ते २ कि.प्रतिदिन	२ लिटर दुधाकरिता १ किलो प्रतिदिन
वाढीकरिता	१.५ ते ३ कि.प्रतिदिन	
गर्भावस्थेमध्ये	१.५ ते २.५ कि.प्रतिदिन	
शेतातील काम करणाऱ्या बैलांना	१.५ ते २ कि.प्रतिदिन	

संतुलीत खाद्यासोबत वाळलेला तसेच हिरवा चारा द्यावा. चारा कुटी करूनच द्यावा. हिरव्या चान्यामध्ये लसूण, बरसीम इ. चा समावेश असल्यास अधिक चांगले.

संतुलित खाद्य दुध उत्पादनानुसार कसे द्यावे. ?

दुध उत्पादन (किलो)	संतुलित खाद्य (किलो)	हिरवा चारा (किलो)	वाळलेला चारा (किलो)
०-२	१-२	१०-१५	५-७
३-५	३-४	१६-२३	५-७
६-८	४-५	२३-२८	८-९
९-११	५-६	२८-३४	८-९
१२-१४	६-७	३४-४०	९-१०
१५-१८	७-९	४०-४४	९-१०
१९-२१	९-११	४४-४७	१०-११

गायी/म्हशींसाठी संतुलीत आहाराची गरज (शुष्क आहाराच्या प्रमाणात)


जनावराचा प्रकार	टक्केवारी (शरीराच्या वजनाच्या)
वासरे	२.५ ते २.७ %
कालवडी/ पारड्या	२.८ ते ३.० %
भाकड म्हशी	३ %
दुध देणाऱ्या गायी/म्हशी (१ ते ३ लि/दिन)	२.७ ते ३.० %
अल्प दुध देणाऱ्या गायी/म्हशी (४ ते ७ लि/दिन)	३.० ते ३.२५ %
मध्यम दुध देणाऱ्या गायी/म्हशी (८ ते १४ लि/दिन)	३.२५ ते ३.५ %
उच्च दुध देणाऱ्या गायी/म्हशी (१५ ते २५ लि/दिन)	३.५ ते ४.० %
अति उच्च दुध देणाऱ्या गायी/म्हशी (प्रति दिन २५ लि पेक्षा जास्त)	४% व अधिक

टिप : या व्यतिरिक्त गायीमध्ये प्रत्येक २.५ किलो दुध उत्पादनामध्ये १ किलो व म्हशीमध्ये प्रत्येक २ किलो दुध उत्पादनामागे १ किलो अतिरिक्त पशुखाद्य (२० ते २२% कूड प्रोटीन आणि ७०-७५% टी.डी.एन.) देण्यात यावे. जनावरामधील चयापचयाचे रोग टाळण्यासाठी वरील नमुद टक्केवारीमध्ये पशुखाद्याचा वापर ६० % पेक्षा जास्त करण्यात येऊ नये. गाभण अवस्थेत शेवटच्या ३ महिन्यामध्ये वरील टक्केवारी नमूद केल्याव्यतिरिक्त १ किलो पशुखाद्य गायींना व १ ते १.५ किलो पशुखाद्य म्हशींना अतिरिक्त द्यावे.

गाई -म्हशींसाठी पाण्याची गरज

- स्वच्छ व थंड पाणी गाई-म्हशींना पिण्यासाठी २४ तास उपलब्ध असावे.
- पाण्याचे तापमान १६ ते २६ डीग्री सेंटिग्रेड असावे.
- गाई-म्हशी पाण्याच्या टाकी/पाण्याच्या गव्हाणीपेक्षा त्यांच्यासाठी खास बनविलेल्या पाणी पिण्याच्या भांड्यामधून पाणी पिणे पसंत करतात.

- गाई-म्हशींना पाणी कमी पाजल्यास त्याची दुग्धोत्पादन क्षमता असतानाही घटेल हे लक्षात ठेवावे. व त्याकरिता त्यांना दिवसातून निदान ५ ते ६ वेळा पाणी पाजावे.



संकरित जनावरांना वातावरणातील सरासरी तापमान 30 डीग्री सेंटिग्रेड असताना लागणारी पाण्याची गरज खालील प्रमाणे असते.
(फक्त पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याची गरज तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.)

शरीराचे वजन (किलो)	पाणी (लिटर)	शरीराचे वजन (किलो)	दुधातील गाई
५०	५-६	४००	२७ ते ३० लिटर + ३ लिटर प्रतिकिलो दुग्धउत्पादनास
१००	१६-१७	५००	३२ ते ३५ लिटर + ३ लिटर प्रतिकिलो दुग्ध उत्पादनास
२००	२६-२७		
३००	३७-४०		
५००	४६-५०		

म्हशींसाठी पाण्याची गरज

प्रकार	पिण्यासाठी पाणी (लिटर)		धुण्यासाठी लिटर	एकुण पाण्याची गरज (लिटर)
	हिवाळा	उन्हाळा		
रेडकु	१२	२९	१५ ते २३	२७ ते ४२
रेडी	२८	५४	२८ ते ४५	४७ ते ९९
भाकड म्हैस	४५	५५	२४ ते ३६	७० ते ९०
दुधातील म्हैस	६०	६५	२४ ते ३६	८० ते १०२

गायींची तुलनात्मक माहिती

	गावठी गाय		संकरित गाय
१.	४० ते ४२ महिन्यांची असताना पहिले वेत देते	१.	२२ ते २६ महिन्यांची असताना पहिले वेत देते
२	दुध देण्याचा काळ १५० ते १८० दिवस	२	दुध देण्याचा काळ २४० ते ३०० दिवस
३	व्याल्यानंतर ६ ते ८ महिन्यांनी पुन्हा गाभण राहते.	३	व्याल्यानंतर ३ ते ४ महिन्यांनी पुन्हा गाभण राहते.
४	भाकड काळ ७ ते ८ महिने	४	भाकड काळ २ ते ४ महिने
५	दोन वेतातील अंतर १८ ते २० महिने	५	दोन वेतातील अंतर १३ ते १५ महिने
६	सरासरी रोजचे दूध उत्पादन ३ लिटर म्हणजे १८० दिवसांत ५४० लिटर	६	सरासरी रोजचे दूध उत्पादन ६.२५ लिटर म्हणजे ३०० दिवसांत १८७५ लिटर
७	वासरांची वाढ रोज २०० ते ३०० ग्रॅम	७	वासरांची वाढ रोज ५०० ते ७०० ग्रॅम रोज
८	दुध काढताना पान्हवण्यासाठी वासरू आवश्यक	८	पान्हवण्यासाठी वासराची आवश्यकता नाही
९	बैलाचा शेतीला उपयोग	९	बैल वशिंड नसतानाही जास्त ताकतीचे काम सातत्याने करू शकतात.
१०	आरोग्याची काळजी नगण्य	१०	गावठीच्या तुलनेत आरोग्याची काळजी आवश्यक
११	दुध देण्याच्या काळात सातत्य नसते	११	दुध देण्याच्या काळात सातत्याने दूध देते

टीप:- वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या गावठी गाईमध्ये जातिवंत देशी गाईचा (गीर, साहिवाल, देवणी, लालकंधारी इ.) समावेश नसून जातिवंत देशी गाईची उत्पादन क्षमता देखील संकरित गाईच्या इतकीच उत्कृष्ट असते.

संकरीत गाईच्या कृत्रिम रेतनासाठी प्राधान्य क्रम

पैदास		वळूतील विदेशी रक्त प्रमाण				
		५०	६२.५	७५.००	७५ .०० टक्के	१००
		टक्के	टक्के	टक्के	पेक्षा जास्त	टक्के
संकरीत	५० टक्के	३	३	२	२	१
गाईतील	६२.५ टक्के	३	१	२	२	२
विदेशी	७५.०० टक्के	१	३	२	२	३
रक्त प्रमाण	७५.०० टक्के पेक्षा जास्त	१	२	२	३	३
	१०० टक्के	२	३	३	२	१

अशी पैदास टाळा

१. अनुवंशिक दोष, दीर्घ वंध्यत्व असलेल्या जनावरांची पैदास
२. नैसर्गिक रेतन पध्दतीचा वापर
३. देशी जनावरांसाठी संकरीकरण आणि परजात पैदास
४. संलग्न पिढ्यांची आंतरपैदास
५. निवडी शिवाय नरांचा वापर, आरोग्य तपासणी शिवाय रेतन
६. नोंदी शिवाय रेतन पध्दत



गर्भधारणा केल्यानंतर गाय केव्हा विणार? (अंदाजे तारीख) गर्भकाल २७५ ते २८० दिवस

कृत्रिम रेतनाची तारीख	विण्याची तारीख	कृत्रिम रेतनाची तारीख	विण्याची तारीख
०१ जानेवारी	०८ ऑक्टोबर	०८ जुलै	१२ एप्रिल
०७ जानेवारी	१४ ऑक्टोबर	१५ जुलै	१९ एप्रिल
१४ जानेवारी	२१ ऑक्टोबर	२२ जुलै	२६ एप्रिल
२१ जानेवारी	२८ ऑक्टोबर	२९ जुलै	०३ मे
२८ जानेवारी	०४ नोव्हेंबर	०५ ऑगस्ट	१० मे
०४ फेब्रुवारी	११ नोव्हेंबर	१२ ऑगस्ट	१७ मे
११ फेब्रुवारी	१८ नोव्हेंबर	१९ ऑगस्ट	२४ मे
१८ फेब्रुवारी	२५ नोव्हेंबर	२६ ऑगस्ट	३१ मे
२५ फेब्रुवारी	०१ डिसेंबर	०२ सप्टेंबर	०७ जून
०४ मार्च	०८ डिसेंबर	०९ सप्टेंबर	१४ जून
११ मार्च	१५ डिसेंबर	१६ सप्टेंबर	२१ जून
१८ मार्च	२२ डिसेंबर	२३ सप्टेंबर	२८ जून
२५ मार्च	२९ डिसेंबर	३० सप्टेंबर	०५ जुलै
०१ एप्रिल	०५ जानेवारी	०७ ऑक्टोबर	१२ जुलै
०८ एप्रिल	१२ जानेवारी	१४ ऑक्टोबर	१९ जुलै
१९ एप्रिल	१९ जानेवारी	२१ ऑक्टोबर	२६ जुलै
२२ एप्रिल	२६ जानेवारी	२८ ऑक्टोबर	०२ ऑगस्ट
२९ एप्रिल	०२ फेब्रुवारी	४ नोव्हेंबर	०९ ऑगस्ट
०६ मे	०९ फेब्रुवारी	११ नोव्हेंबर	१६ ऑगस्ट
१३ मे	१६ फेब्रुवारी	१८ नोव्हेंबर	२३ ऑगस्ट
२० मे	२३ फेब्रुवारी	२५ नोव्हेंबर	३० ऑगस्ट
२७ मे	०१ मार्च	२ डिसेंबर	०६ सप्टेंबर
०३ जून	०८ मार्च	९ डिसेंबर	१३ सप्टेंबर
१० जून	१० मार्च	१६ डिसेंबर	२० सप्टेंबर
१७ जून	२२ मार्च	२३ डिसेंबर	२७ सप्टेंबर
२४ जून	२९ मार्च	३० डिसेंबर	०३ ऑक्टोबर
०१ जुलै	०५ एप्रिल		

दुग्धव्यवसायासाठी उपयुक्त नोंदीचे तक्ते

(१) पशुधन नोंद वही

अनुक्रमांक	विकत घेतल्याची तारीख व किंमत (किंवा घरची असल्यास घरची लिहा)	कोठून विकत घेतली ?	गाईचा रंग /जात व इतर वर्णन (थोडक्यात)
गाईचे वय	नाव अगर नोंदवलेला नंबर	विकल्याची (अगर मेल्याची)नोद तारीख	

(२) दैनंदिन दुधाच्या नोंदी

अ. क्र	गाय/ म्हैस क्रमांक	विण्याची तारीख	प्रथम दिवस		२ रा दिवस		३ दिवस		४ दिवस		५ दिवस		३० दिवस		३१ दिवस		एकुण
			सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	सकाळ	संध्या.	

(३) दुधाच्या विक्रीची नोंद

अ.क्र	महिना	एकुण निघालेले दुध	घरी वापरलेले दुध विकलेले दुध	विकलेल्या दुधाची एकुण किंमत

(४) वासरे जन्म नोंदवही

गाय/म्हशीचा क्रमांक	विण्याची संभाव्य तारीख	विण्याची प्रत्यक्ष तारीख	वळू क्रमांक	वासराचा क्रमांक	वासराचे लिंग	वासराचे जन्मतः वजन	वासराची जात	शेरा

(५) माजावरील गाईच्या कृत्रिम रेतन व तत्सम बाबीची नोंदवही

अ.क्र	गाईचे नाव व नंबर	माजावर आल्याची तारीख	कृत्रिम रेतन केल्याची अगर वळू दाखविल्याची तारीख वळूचे नाव अगर नंबर	पुन्हा माजावर आली का ? तारीख	गर्भधारणा तपासणी तारीख व निदान	अंदाजे विण्याची तारीख



(६) दुध उत्पादन नोंदी

गाय / म्हैस क्रमांक	दुध उत्पादन (दुधातील सरासरी----- बाबत कंसामध्ये नोंद घेण्यात याव्यात)												एकुण दुध उत्पादन	दुध उत्पादनाचा कालावधी	भाकड कालावधी	शेरा
	जाने.	फेब्रु.	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑग.	सप्टे.	ऑक्टो	नोव्हे.	डिसें.				

(७) दैनंदिन पशुखाद्य व्यवस्थापन नोंदी

महिना :

दिनांक	जनावरांची संख्या	पशुखाद्य			हिरवी वैरण			वाळलेली वैरण			इतर खाद्य		
		प्राप्त	वापरलेले	शिल्लक	प्राप्त	वापरलेले	शिल्लक	प्राप्त	वापरलेले	शिल्लक	प्राप्त	वापरलेले	शिल्लक

(६) दैनंदिन नोंद वही:

यात दैनंदिन घटनांची नोंद करून नोंदी आठवडयातून एकदा लिहून काढाव्यात. उदा :

१. गाय माजावर आल्याची तारीख
२. वळू दाखविल्याची तारीख
३. खुराक चारा-वैरण विकत किंवा स्वमालकीच्या शेतातील किती आणली तिची किंमत
४. दैनंदिन दुध उत्पादन
५. दुधाच्या व्यवहाराची नोंद , इत्यादी गोष्टी रोज लिहाव्यात.

अनेक ठिकाणी एकुण दुधाचे उत्पन्न व विक्री या संबंधीच्या नोंदी मिळतात. प्रत्येक गाईच्या रोजच्या दुधाची नोंद फार थोडे शेतकरी ठेवतात. त्यामुळे प्रत्येक गाईचे दुधाचे उत्पन्न किती , ती फायद्यात आहे का तोटयात हे कळत नाही.

तीच गोष्ट खाद्यासंबंधी . स्वमालकीच्या शेतातील वैरण किती आली, किती वापरली या बदल नोंद न ठेवल्यामुळे दुध उत्पादना बाबत निश्चित कल्पना येवू शकत नाही. स्वमालकीच्या शेतातील वैरणीच्या एका पेंढीच्या वजनावरून सर्वसाधारणपणे अंदाज बाधता येईल.

कालवडीचे वजन करण्याचे सूत्र:

अ. गाईच्या छातीचा घेर (इंचात) मोजावा. असा घेर पाठीवरील जास्त उंचवटयाजवळ मोजावा.

ब. गाईची लांबी (इंचात) (पुढच्या खांद्याजवळ) व शेपटी जवळील कंबरेचे हाड येथपर्यंत मोजावे

$$\text{सूत्र: } \frac{(\text{छातीचा घेर})^2 \times \text{गाईची लांबी}}{300} = \text{वजन पौंडात (२.२ पौंड = १ किलोग्रॅम)}$$

गायी, म्हशी यांचे शरीराचे सरासरी तापमान / नाडीचे ठोके / श्वसनदर

जनावरांचा प्रकार	तापमान	नाडीचे ठोके / मिनिटे	श्वसनाचा दर / मिनिटे
गायवर्ग	३७.८ - ३८.९° सें. (१०० - १०२° फॅ)	४५-५०	२०-२५
म्हैसवर्ग	३७.२ - ४०° सें. (९८.८ - १०४° फॅ)	४०-४५	१६

गायी/म्हशीतील माजाबाबतची माहिती

जनावरांचा प्रकार	पहिल्यांदा माजावर येण्याचे वय (महिण्यात)	पैदासक्षम वय (महिण्यात)	माजाचा ऋतू नियमन कालावधी (दिवसात)	माजाचा कालावधी (तासात)	व्याल्यानंतर पहिल्यांदा माजावर येणे (दिवसात)	कृत्रिम रेतन करणेसाठी योग्य वेळ (तासात)
गाय-स्थानिक जाती	३२-४२	४०-४५	१९-२२	२४	१००-१२०	१२ तासानंतर (पहिले लक्षण दाखविल्यानंतर)
संकरीत	१२-१८	२४ महिने > २४० किलो शारीरिक वजन	२४	२४	६०-७०	
म्हैस	३६-४२	४०-४२	१९-२२	१८-२४	१००-१५०	





e-शेतकरी



९६०४४६८७९०



[telegram.me/eshetkari](https://t.me/eshetkari)

पशुपालन व शेती विषयी शास्त्रीय माहिती संदेश प्राप्त करण्यासाठी ९६०४४६८७९० हा क्रमांक आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये एड करा.

टेलिग्राम ॲप डाउनलोड करा

<https://t.me/eshetkari>

लिंक उघडून e-शेतकरी टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा,

शेती व पशुपालन विषयी संग्रहीत माहिती लेख मिळवा