

दुभत्या गाई / म्हशींची निवड

दुध व्यवसायात दुध देणाऱ्या, चांगल्या गाई/ म्हशीची निवड करणे आवश्यक ठरते, ही खरेदी गुरांच्या बाजारातून किंवा सरकारी/ खाजगी डेअरीतून केली जाते.

दुभती गुरे शक्यतो माणसाकडून अगर संस्थेतून घ्यावयाची असली तरी काही गोष्टींची पारख स्वतः करणे जरूर आहे.

दुभती गुरे विकत घेताना तिचे वेत, जात, दुधाचे प्रमाण, शारिरिक निरोगीपणा (निरोगी कास), दुभता काळ आणि योग्य वेळी गाभण रहाण्याची क्षमता इ. गोष्टी माहिती करून घ्यावयास हव्यात. या दृष्टीने संकरित गाय फायद्याची.

आपल्याकडे गाईच्या जन्माच्या, रोजच्या दुधाच्या, लावलेल्या वळूच्या नोंदी किंवा अनुवांशिक गुणाबद्दल काहीही माहिती गाय विकत घेताना मिळत नाहीत, त्यामुळे दर्शनी परिक्षा करूनच गाय विकत घ्यावी लागते, यासाठी खालील मार्गदर्शन तत्वे उपयोगी पडतील.

- १) अशी गाय शक्यतो दुसऱ्या अगर तिसऱ्या वेताची घ्यावी. चौथ्या वेतात गाय जास्तीत जास्त दूध देते म्हणजे त्यावेळी गाय आल्या घरी हवी. प्रत्यक्षात कितवे वेत आहे हे काटेकोर नोंदीवरूनच कळते. दातावरून वय कळते पण वेत कळत नाही. अंदाजे सहादाती (पहिले वेत पूर्ण), आठ दाती (दुसरे वेत पूर्ण) असे समजावयास हवे. (संकरित गाईत)
- २) प्रत्यक्ष दुध देण्याची क्षमता माहिती करून घेणे या साठी आपल्या समक्ष तीन वेळा दुध काडून पहावे. यासाठी ताजी व्यालेली (७-८ दिवस) गाय घ्यावी. आज सकाळी, आज संध्याकाळी, उद्या सकाळी, या तीनही वेळी समक्ष काढलेल्या दुधाच्या सरासरीवरून रोजच्या दुधाचे प्रमाण कळते.
आपल्या समोर दुध काढलेले असल्यामुळे खालील गोष्टी कळतात.
अ) गाईला पान्हावावयाला लागणारा वेळ.
ब) चारही सडातून मोकळी धार येते का ? एखादे सड मुके आहे का ?
क) गाय गरीब आहे का तापट आहे.
ड) कासेतील अगर सडातील दोष लक्षात येतात.
- ३) शेतकऱ्याला घरी अगर सरकारी संस्था/ खाजगी डेअरी इथे जाऊन समक्ष गाय पहाणे केव्हाही चांगले कारण या ठिकाणी
अ) जमीन फरशीची आहे का काँक्रीटची का कोबा असलेली का रबरी चटई अंधरलेली हे कळले.
ब) गव्हाण आहे का ?
क) प्रत्येक गाईला पाण्यासाठी वेगळे कुंड आहे का ?
ड) गाईच्या खुरांचा निरोगीपण (खुरे कमी अधिक वाडलेली आहेत का ?)
इ) चारा, वैरण खुराक देण्याची पध्दत, वेळ इ. कळते.
फ) आंगठा आत दुमडून दुध काढताना का न दुमडता दुध काढतात ते कळेल.
म) गाय मोकळी आहे का बांधलेली ते कळेल.
- ४) शक्यतो गाभण गाय घेऊ नये एक तर तिचे विणे व्हावयाचे असते. विण्याच्या वेळच्या तिच्या खोडी, सडातून येणारे दुध याची कल्पना नसते. म्हणजे गाभण गाय घेणे एक जबाबदारी समजावयास हवी काही आजारात गाभणीपणी गाय निरोगी दिसते पण व्याल्यानंतर आजार उचल खातो आणि गाय अशक्त होते.
- ५) गोठ्यात गाय पाहिलेली असल्यामुळे तिचे उठणे - बसणे चालणे मोकळे हवे.

- ६) गाईच्या चारही सडाची लांबी एकसारखी असावी. दोन इंच लांबीचे सड आखूड ,तर २ ते ३इंच लांबी योग्य, तीन इंचापेक्षा लांब असू नयेत. सडांची टोके आत वळलेली हवीत.
- ७) सडांच्या टोकाची जमिनीपासूनची उंची कमीत कमी १८ इंच हवी त्या पेक्षा कमी असली तर कास लोंबती आहे. त्यामुळे बसताना, उठताना गाईच्या कासेला मार बसेल.
- ८) कासेवरील कातडी मऊ असावी. सडावर पुरळ, अगर चामखीळ / मस नसावेत.
- ९) संपूर्ण दूध काढल्यावर कासेला घडी पडावयास हवी.
- १०) अशी गाय शांत स्वभावाची, निरोगी व पाणीदार डोळ्याची हवी.
- ११) गाईच्या कमरेची हाडे दूर हवीत.
- १२) गाईची खुरे वेडीवाकडी नकोत. दोन खुरांच्या बेचकीत जखम अगर गाठ नको.
- १३) पूर्वीच्या वेताबद्दल माहिती मिळाली तर दोन वेतातील अंतर किती होते याची माहिती हवी. सर्वसाधारणपणे दोन वेतात बारा ते तेरा महिन्याचे अंतर आदर्श मानले जाते. पण तेरा महिन्यान पेक्षा जास्त अंतर असल्यास गर्भाशयाचा दोष असावा.
- १४) गाईला पूर्वी कधी मोठा आजार होता का त्याची माहिती घ्यावी. यात गर्भाशय बाहेर पडणे,(याला भांडे बाहेर पडणे म्हणतात.) 'सुशी' (धापणे) याबद्दल माहिती घ्यावी (अशा गाईचे पाठीवरील केस राठ असतात.) किरकोळ खोडीत- मारकेपणा-लाथ उचलणे-घोरणे या गोष्टी पहाव्यात.
- १५) संकरित गाईत साडेबासष्ट टक्के विलायती रक्तगुणाची गाय आपल्याकडे हवामानात व्यवस्थित रुळते. यापेक्षा जास्त रक्तगुण असलेली गाय त्या मानाने नाजुक असते. चांगल्या गुणवत्तेची गाय-प्रत्यक्षात किती दुध देते या महत्वाच्या गुणांनंतर - बाकीचे गुण विचारात घ्यावयास हवेत. सध्याच्या बाजारभावानुसार रु. ळक हजार प्रति लिटर किंमत आहे. दहा लिटर दुध देणारी गाय रु. दहा ते बारा हजारात मिळावयास हवी. आपला अनुभव - आपल्याकडील खाद्य-चारा पाणी यांच्या सोयी - दुधाचा भाव या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन मगच गाय किंवा म्हैस खरेदीचा विचार करावा.
- १६) संस्थेतून अगर खाजगी संस्थेतून गाय विकत घेण्यापूर्वी वरचेवर उलटणारी (गाभण न राहणारी), अंग न धरणारी एक किंवा दोन सडे मुके असलेली गाय घेण्याचे टाळावे. कारण याबाबतीतले त्यांचे प्रयत्न संपलेले असतात. अपेक्षेप्रमाणे दुध न देणारी निरोगी कास व शरीर असलेली गाय घ्यावी. आपल्या घरी कमी गुरे असल्याने तिची वैयक्तिक काळजी घेतली जाते. त्यामुळे ती अपेक्षे ऐवढी किंवा जास्त दुध देवू शकते.




गाई/ म्हशींचा गोठा

गाईला गोठा म्हणजे गाईसाठी निवारा, उन्हापावसापासून संरक्षण येवढाच अर्थ नाही. गोठा म्हणजे गाईला बसण्यासाठी सुरक्षित योग्य मापाची जागा. यात तिला बसण्यासाठी व उठण्यासाठी मोकळेपणा असावा. ऊन, पाऊस, हवा यापासून निवारा हवा. गाईला आरामशीर व सुखकारक गोठा असावा.

गाईला जितका आराम मिळेल तितकी ती जास्त दुध देईल त्या दृष्टीने खालील मार्गदर्शन तत्वे उपयोगी पडतील.

- १) दुध धुद्याच्या दृष्टीने आपण किती गुरे पाळू शकू. (चार, वैरण, मनुष्यबळ, पाणी, दुधाचा बाजार यावरून) अंदाज करून कोणत्या आकारमानाचा गोठा बांधायचा ते ठरवता येईल. (कित्येक शेतकरी गोठा बांधण्यात सुरुवातीस भांडवली खर्च करतात मग प्रत्यक्ष गाई खरेदी, किरकोळ सामग्री, पशुखाद्य खरेदी यासाठी पैसा रहात नाही.)
- २) गाईचा गोठा शक्यतो घराजवळच असावा म्हणजे दुभत्या गाईसाठी दैनंदिन व्यवस्थापन सोपे जाते.
- ३) गोठ्यासाठी महत्वाचे मद्दे याप्रमाणे :-
 - अ) पूर्व पश्चिम लांबीचा (पूर्व व पश्चिमेकडे भिंत) आणि दक्षिणोत्तर मोकळा असा हवेशीर गोठा असावा.
 - ब) छताची उंची १० ते १२ फूट असावी. छतासाठी पन्हाळी पत्रा/ किंवा सिमेंट पत्रा वापरावा.
 - ग) शेण उचलून दूर खताच्या खड्ड्यात टाकावे अगर त्याचा गोबर गॅस बनवावा.
 - घ) गायींची संख्या १० पर्यंत वाढल्यास कडबा कुट्टी यंत्र गोठ्याच्या आत बसवावे. पशुखाद्य, इतर खाद्य घटक व औजारे ठेवण्यास गोठ्याजवळच एक बंदिस्त हवेशीर खाली असावी.
- ११) गव्हाणीजवळ बांधण्यासाठी जो कडी - बसवायची ती खालीलप्रमाणे बसवावी. गव्हाणीजवळ अलिकडील भिंतीत ४ इंच रुंद जमिन पासून उंच व दीड इंच खोल असा कोनडा करून त्यात लोखंड सळई बसवून त्यात दीड इंच व्यासाची कडी अडकवावी. ही कडी वर खाली होवू शकते. या कडीला गाईच्या गळ्यातील कासरा बांधावा. याची आकृती अशी दिसेल.

(आकृती)



- १२) गोठ्याला आतील भिंतीना पांढरा चुना दर दोन महिन्यांनी लावावा. पाण्याचा हाळ असेल तर महिन्यातून एकदा त्याला आतून चुना लावावा.
- १३) दिवसातून दोनदा (दरवेळी किमान २ तास) गाईना मोकळे सोडावे. त्यासाठी गोठ्याजवळ झाडाच्या सावलीत गाई मोकळेपणाने पाय मोकळे करू शकतील. माजावरील गाईची लक्षणे व्यवस्थित दिसतील.
- १४) गोठ्यासाठीचे पाण्याचे नळ जमिनीखाली चौदा इंचावरून न्यावे म्हणजे नळ उन्हाने तापून पाणा गरम होणार नाही. रोग गुरांना

स्वच्छ थंड व ताजे मिळावयास हवे.

- १५) काही ठिकाणी क्षाराचे पाणी असते. अर्धा ते एक टक्का क्षारयुक्त पाणी गाई पिऊ शकतात. त्यापेक्षा जास्त क्षाराचे पाणी गाई पित नाहीत.
- १६) उन्हाळ्यात गायींना दिवसातून पाच वेळा, पावसाळ्यात चार वेळा तर हिवाळ्यात तीन वाळा पाणी पाजावे, गव्हाणीलाच लहान हौदाची सोय असल्यास गाई स्वतःच्या इच्छेने पाणी पितील.



वासरांचे संगोपन

आजची कालवड ही उद्याची गाय आहे. कालवडीची जोपासना व्यवस्थित केली तर ही कालवड जोमाने वाढते. तिचे वजन झपाट्याने वाढल्यामुळे अशी कालवड लवकर वयात येते. ती लवकर गाभण राहते, तिची लवकर गाय होते. तिच्यापासून जास्त वेते मिळतात- जास्त दुध मिळते.

जन्मल्यानंतर होणारी कालवडीची वाढ तिचे जन्माच्या वेळी किती वजन होते यावर अवलंबून असते. कालवडीचे जन्माच्या वेळचे वजन हे गाय गाभण असताना गाभणपणाच्या शेवटच्या दोन महिन्यात वाढीव खुराक दिला आहे. किंवा नाही यावर अवलंबून आहे. यावेळी गाईच्या गर्भाशयात कालवडीची वाढ चौपटीना होते म्हणून तिला वाढीव खुराक (आंबोण/खाद्य) देणे अत्यंत जरूरीचे आहे.

अशा रितीने जन्मलेल्या कालवडीची व्यवस्थित जोपासना केल्यावर रोजचे वजन ६०० ते ७०० ग्रॅम वाढलेले आढळते. जन्मतःच कालवडीचे वजन २५ ते ३० किलो असले तरी ही कालवड दरमहा १८ ते २० किलो वजनाचे वाढते. वयाच्या १२ व्या महिन्यापर्यंत २०० किलो पर्यंत वजन होते. यासाठी वासराच्या संगोपनासाठी खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत.

- १) वासराचा जन्म काळ, कोरड्या जागी होईल अशा जागी विणाऱ्या गाईला बांधा.
- २) विण्याच्या वेळी शांतता हवी. गाय नेसर्गिकपणे विते. (गाय घाबरेल, बिचकेल असे वातावरण नको.) विणाऱ्या गाईला थोपटा.
- ३) जन्मल्यावर वासराचे नाक, तोंड स्वच्छ करा. त्याच्या खुरी हाताने तोडा, त्याची नाळ बेंबगच्या खाली चार बोटे ठेऊन दोन्याने बांधा. उरलेली कापून टाका. बांधलेली नाळ कपात आयोडीन घेऊन त्यात बुचकळा (दिवसातून दोनदा) अशी नाळ वाळेपर्यंत बुचकळावयास हवी.
- ४) वासराला स्वच्छ पण खरखरीत कपड्याने पुसून कोरडे करा. त्याचे सर्व अवयव व्यवस्थित आहे का ते पहा. तोंड उघडून वरच्या टाळूला छिद्र नाही ते पहा.
- ५) वासराला पोत्यात ठेऊन चार कोपऱ्यात उचलून ताण काट्यावर त्याचे वजन करा. ते नोंदवून ठेवा.
- ६) वासराला गाई पुढे ठेवा. गाय त्याला चाटून स्वच्छ करेल. गाईने चाटल्याने वासराचे रक्ताभिसरण वाढते.
- ७) जन्मल्यापासून अर्ध्या तासात वासराला चीक पाजा. असा चीक वासराच्या १०% दिवसातून पाजावयास हवा.
- ८) वासराला त्याच्या वयाच्या सहा आठवडे पर्यंत दुधाचा आहार जरूरी आहे. असे दुध त्याच्या वजनाच्या १०% दिवसातून दोनदा विभागून द्यावे. वासराला दुध पाजण्याच्या खालील पद्धती आहे.
 - अ) अंगावर पाजणे. यासाठी कास स्वच्छ व कोरडी हवी. वासराला तोंडात सड धरता येईल इतपत आकाराचा हवा. त्यातून मोकळी धार यावयास हवी. असे दुध सुरुवातीस पिऊ द्या, शेवटी नको.

- ब) बादलीतून दुध पाजताना बादली स्वच्छ हवी. त्यात दुध कोमट करून पाजावे. या पध्दतीत वासरु घाईघाईत अधाशा सारखे दुध पिण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अपचनाची शक्यता आहे.
- क) उथल परतीतून दुध पाजण्यासाठी वासरुस शिकवावयास हवे. स्वच्छ व कोरड्या परातीत कोमट दुध वासरुस पाजावे.
- ड) प्लॅस्टिकच्या स्वच्छ बाटलीत कोमट दुध घेऊन त्याला रबराचे निपल बसवून उलटी टांगून दुध पाजणे. ही पध्दत जास्त नैसर्गिक आहे.
- १०) वासरुचे दुध पिणे झाल्यावर त्याचे तोंड ओल्या फडक्याने पुसून घ्या.
- ११) वयाच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर वासरुच्या शिंगकळ्या कॉस्टिक पोटॅशच्या कांडीने जाळून घ्या. या ठिकाणी जखम वाळेपर्यंत जंतूनाशक मलम अथवा हळद पावडर लावा.
- १२) सहा आठवडे वयानंतर दिवसातून एकदाच दुध पाजा. त्याच्या समोर गव्हाचे अगर तांदुळाचा भुसा, मका अगर ज्वारी भरडा १५० ते २०० ग्रॅम ठेवा. वासरु खाद्य खाऊ लागल्यावर दर आठवड्याला यात ५० ते ६० ग्रॅमने वाढ करा. किंवा खास वासरुसाठी मिळणारे पशुखाद्य बारामती अॅग्री कंपनीचे द्या. याच वेळी सावलीत वाळलेला पालेदार हिरवा चारा वासरुसमोर टांगून ठेवा. हळू हळू वासरु हा चारा खाऊ लागेल. कालवडीच्या कासेतून रोज हात फिरवा.
- १३) वयाच्या तीन आठवड्यापासून बारामती अॅग्रीचे काल्फ स्टार्टर वासरुसाठी खास मिळणारे पशुखाद्य द्या. (पण) कधीही मोठ्या गुरांसाठी असलेली गोळी पेंड, वासरु सहा महिन्याचे होईपर्यंत देऊ नका.
- १४) दोन महिने वयानंतर वासरुचे वजन करा. असे वजन ६० किलोपेक्षा जास्त भरल्यास वासरुची उत्तम वाढ झाली. ५५ किलो भरल्यास मध्यम, तर या पेक्षा कमी भरले तर वासरुकाडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे.
- १५) गोठ्यात ५ पेक्षा जास्त वासरु असतील तर वासरुला ओळखण्यासाठी नंबर गोंदवुन घ्या. (कानावर/अगर शेपटीखाली).
- १६) वासरु दीड महिन्याचे झाल्यावर त्याला जंतूनाशक औषध देऊन घ्या. नंतर वर्षातून दोनदा असे औषध पाजा. (पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर)
- १७) वासरु तीन महिन्याचे झाल्यावर त्याला स्वतंत्र जागा द्या. तिथे त्याला खाण्यासाठी वेगळी पाटी/ टोपली किंवा गव्हाणीत जागा असावी. (वासरुला दीड चौरस मिटर सुरुवातीस जागा पुरते)
- १८) वासरु तीन महिन्याचे झाल्यावर त्याला लाळखुरकूत प्रतिबंधक तेलयुक्त लस टोचून घ्यावी. मग बुस्टर डोस देऊन घ्यावा. या नंतर वर्षातून एकदा लस टोचून घ्यावी (आपल्या भागात घटसर्प, फऱ्या रोग असेल तर त्याची प्रतिबंधक लस डॉक्टरांकडून लाळखुरकूत लशीनंतर १० दिवसाच्या अंतराने टोचून घ्यावी.)
- १९) वासरुच्या अंगावरिल गोचिड / गोमाशा यांचा बंदोबस्त करावा. २५ ग्रॅम निरमा पावडर १/२ लिटर पाण्यात टाकून त्याने वासरुचे अंग पुसून घ्यावे. (दर आठ दिवसांनी)
- २०) वासरुला एकसारखे बांधू नये. त्याला हुंदडण्यासाठी गोठ्याजवळील बंदिस्त पटांगण/ जागा हवी. वासरुचे दुध पिणे, खाद्य खाणे झाल्यावर या जागेत त्यांना मोकळे सोडा. वासरुला व्यायाम नसेल तर वासरुचे पोट मोठे दिसेल.
- २१) दुध पित्या वासरुला पाण्याची आवश्यकता नसते. खाद्य/ पशुआहार खाऊ लागल्यावर त्याला पाणी पिण्याची इच्छा होईल. तेव्हा ताजे स्वच्छ पाणी उपलब्ध हवे. नाहीतर जेव्हा पाणी मिळेल तेव्हा ती आधाशा सारखी पाणी पितील. त्यामुळे त्यांना लाल लघवी होईल
- २२) वासरुंना ताजे ताक, (आंबट नसलेले) चक्क्यातून निथळलेले पाणी, क्रिम काढलेले दुध देता येते. (वजनाच्या ५ ते १०%)
- २३) गाईला जास्त चीक निघाल्यास तो फ्रिजमध्ये ठेवावा. असा चीक वासरुच्या शरीर तापमानाला आणून ३ लिटर चिकात १/२ लिटर स्वच्छ कोमट पाणी टाकून दुधा ऐवजी देता येतो. (वजनाच्या १०% तीन आठवडे वयापर्यंत)

- २४) जन्मल्यानंतर वासरास रोज तीन अश्वगंधा पावडर द्या. त्याने त्यांच्या शरिरात चांगली प्रतिकार शक्ती तयार होते.
(२ महिने वयापर्यंत द्या)
- २५) वासराला ६ महिने वयापर्यंत युरिया प्रक्रिया केलेला चारा देऊ नका.
- २६) वितांना ज्या गाई अडकतात अशा वासरांची विशेष काळजी घ्यावयास हवी. मान अटकल्यामुळे वासराची जीभ जाड होते. ती दुध पिऊ शकत नाहीत. जी वासरे पायाने जन्माला येतात त्यांच्या पोटात वितांना गर्भाशयातील पाणी जाते. अशा वासरांना उलटे करून दोन्ही हातांनी छातीवर दाब देऊन पोटातले पाणी काढून काढून छाती चोळावी.
- २७) वासराच्या खाण्या पिण्याच्या वेळा कटाक्षाने पाळा. उबदार कोरडी जागा, वेळच्या वेळी मिळणारा संतुलित आहार, रोगप्रतिबंधक उपाय व वासरास लावलेले प्रेम याने त्याची वाढ झपाट्याने होईल.



गाईच्या दुधातील फॅट व एस.एन.एफ.

दुधाची प्रत - त्याचा दर्जा हा दुधातील फॅट व एस.एन.एफ (फॅट व्यतिरिक्त इतर घन पदार्थ उदा. प्रथिने, क्षार व दुग्ध शर्करा) यावर प्रामुख्याने अवलंबून असले. यावरच दुधाचा भाव ठरवला जातो.

दुधातील फॅट व एस.एन.एफ. हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते.

या गोष्टीत गाईची जात, वय, वेत, व्याल्यानंतर दुधातील दिवस याचबरोबर गाईचे आरोग्य, कासेचा निरोगीपणा, गाईचे खाद्य - इतर व्यवस्थापन या गोष्टी येतात.

- मुळातच गाईचे एकूण दुध व त्यातील फॅट यांचे प्रमाण व्यस्त असते. जेव्हा गाय जास्त दुध देते तेव्हा फॅटचे प्रमाण कमी असते तर जेव्हा कमी दुध असते तेव्हा दुधातील फॅटचे प्रमाण जास्त असते हे नैसर्गिक आहे.
- आपल्याकडील देशी गाईच्या दुधात सरासरीने ४.५% फॅट असते. शुध्द होलस्टीन गाईत २.८ ते ३.५% तर शुध्द जर्सी गाईत हेच प्रमाण ४ ते ५% असते.
- देशी गाईचा होलस्टीन बरोबर संकर केला तर दुधात ३.६५ अंश ते ४% फॅट मिळू शकते. देशी गाईचा जर्सी बरोबर संकर केला तर ४.३ ते ४.७% पर्यंत दुधात फॅट मिळू शकते. संकरित गाईत विलायती रक्ताचे जितके प्रमाण अधिक तितके त्यांच्या दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होत जाते. यासाठी ५०% किंवा ६२.५% रक्तगुणांची संकरित गाय चांगली.
- आपल्या गाईला कोणत्या वळूचे बीज दिले त्याच्या आईच्या दुधातील फॅटचे प्रमाण किती होते ही माहिती शेतकऱ्याने घ्यावयास हवी. गोठवलेले बीज तयास करणाऱ्या चांगल्या संस्थेकडे याची माहिती असते.
- गाईचे वय व वेते जशी वाढतात तसे फॅटचे प्रमाण ०.३ टक्क्याने दरवेता मागे कमी होते तर एस.एन.एफ. चे प्रमाण दर वेतामागे ०.६% कमी होते. उदा. पहिल्या वेताला जर दुधातील फॅटचे प्रमाण ४.५% असले तर दुसऱ्या वेताला ४.४८ तर तिसऱ्या वेताला ४.४६% असावयास हवे. यापेक्षा कमी असल्यास खाद्य व व्यवस्थापनाकडे लक्ष हवे. पहिल्या वेतात दुधात जर ९.५% एस.एन.एफ. असले तर दुसऱ्या वेतात ९.४४% तर तिसऱ्या वेतात ९.३८% असू शकते.
- दुधातील फॅटही ६०% ते ८०% अनुवांशिक असते. यासाठी ज्या वळूत दुधात जास्त फॅट उतरण्याचे अनुवांशिक गुण असतात. अशाच वळूपासून पैदास करवून घ्यावी.
- गाईचा एकूण आहार (खाद्य(आंबोज)हिरवा चारा, वाळलेली वैरण, मिनरल मिश्रण इ.) व फॅट यांचा संबंध खालील प्रमाणे

असतो.

अ) गाईच्या आहारात एकूण १५ ते १८% तंतुमय खाद्य हवे.

ब) चारा/वैरण कुट्टी करून देतांना त्याचे तुकडे एक इंचापेक्षा लहान नकोत.

क) आंबोण (खाद्य) व चारा (हिरवा + वाळलेला) यांचे प्रमाण २५:७५ ते ४०:६० यापेक्षा जास्त नको.

इ) गाईची भूक भागली जाणे आवश्यक आहे.

ई) हिरव्या वैरणीचे प्रमाण जास्त असल्यास शेण पातळ येते. यावेळी गाईला जुलाब झाले तर दुधातील फॅट कमी होते.

फ) वितांना दुभत्या गाईची प्रकृती चांगली हवी. व्याल्यावर गाईच्या शरीराच्या तीन बरगड्या दिसल्यास चांगले. यापेक्षा जास्त दिसत असल्यास गाय अशक्त समजावी.

- ८) दोन दुध काढण्याच्या वेळेत १२-१२ तासाचे अंतर असल्यास दुधाचे प्रमाण, फॅट व एस.एन.एफ. सारखे असते. यापेक्षा १० व १४ तासाचे अंतर असल्यास जास्त अंतरानंतर काढलेल्या दुधातफॅटचे प्रमाण जास्त असू शकते.
- ९) गाभणपणात गाईला वाढीव खुराक दिल्यानंतर तिच्या अंगात साठवलेल्या चरबीमुळे व्याल्यानंतर फॅट व चरबीचे प्रमाण टिकून राहते.
- १०) संतुलित आहारात मिनरल फ्रिशर आवश्यक आहे. असे खनिज मिश्रण मिळाले नाही तर गाईच्या दुधातील फॅट अपेक्षेएवढी वाढणार नाहीत.
- ११) गाईला भाकड काळ पुरेसा मिळाला (कमीत कमी ५० ते ५५ दिवस) नाही तर वेतात ३० ते ४०% दुध कमी मिळेल.
- १२) व्याल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसात - एखाद्या वेळेस आहार मिळाला नाही तर दुध देण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यानंतर आहार मिळाल्यावर पूर्वी इतकेच दुध देते.
- १३) खाद्यात उर्जा कमी पडली तर (एकदल धान्य भरडा) दुधाचे प्रमाण कमी होईल. पण फॅटवर परिणाम होणार नाही.
- १४) खाद्यात जास्त प्रमाणात पिष्टमय पदार्थ म्हणजे बटाटे, रताळी, बीट असे आले तर दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होते.
- १५) खाद्यात प्रथिनांचे प्रमाण (नेहमी प्रमाणे १६ ते १८%) कमी झाल्यास सुरुवातीस दुधशतील एस.एन.एफ. चे प्रमाण कमी होते. नंतर फॅटचे प्रमाण कमी होते. यासाठी आहार संतुलित हवा.
- १६) व्याल्यानंतर लगेच फॅटचे प्रमाण चांगले असते. नंतर १० आठवडे ते कमी होते. पुन्हा ते वाढते.
- १७) दुधात चांगलीफॅट मिळण्यासाठी गाईने दिवसातून १० ते १२ तास रवंथ करणे आवश्यक आहे. यासाठी
- अ) तिच्या खाद्यात योग्य प्रमाणात तंतुमय खाद्य हवे.
- ब) तिला बसवण्यासाठी सपाट, कोरडी जागा हवी.
- क) इच्छा होईल त्यावेळी, पिण्यासाठी ताजे - स्वच्छ आणि थंड पाणी हवे.
- ड) शरीराचा कोणताही भाग दुखरा नको.(वाढलेली खुरे,जखम, तोडांची मोकळी हालचाल, निरोगी शरीर)
- इ) रवंथ करतांना गाईला त्रास देऊ नका. बिचकेल असे काही करू नका उठवू नका जास्त रवंथ जास्त फॅट.
- १८) दुध काढण्यापूर्वी गाईला व्यवस्थित पान्हवा. प्रत्येक गाईचा मानसिक कल ओळखा. प्रमाणे थोपटा, गाय पान्हवल्यावर कास स्वच्छ धुवून (धुताना कास चोळा) कोरडी करून लगेच दुध काढा. शेवटच्या दुधात जास्त फॅट असते.
- १९) दुध काढताना गाय बिचकेल, घाबरेल असे होवू देऊ नका. त्यामुळे पान्हा कमी पडतो. फॅटचे प्रमाण कमी होते.
- २०) सुप्तावस्थेतील कासेचा आजार, पोटफुगी, अपचन यामुळे दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होते.
- २१) अंगावरून वासरु पीत असल्यास, दुध काढण्याच्या शेवटी वासराला दुध प्यायला सोडल नका. सुरुवातीस सोडा.

- २२) बाजारात मिळणारी दुधातील फॅट वाढवण्याकरिता म्हणून मिळणारे खाद्य घटक वापरताना-आपल्या गाईचा आहार संतुलित नसल्यास - असे खाद्य घटक वापरून दुध / फॅट वाढलेले काही वेळेस आढळते. पण त्यात सातत्य नसते. याबाबत अशा खाद्य घटकांची किंमत त्यातून वाढणारे दुध / फॅट यांचा हिशेब करून मगच अनुभवाप्रमाणे अशा खाद्याचा वापर करावा.
- २३) उन्हात बांधलेली किंवा तापलेल्या फरशीवर बसलेल्या गाईच्या दुधात त्या दिवशी फॅट कमी मिळेल.
- २४) मॅग्नेशियम खनिजाची कमतरता असल्यास दुधातील फॅटचे प्रमाण कमी होते.
- २५) फॅट तपासणाऱ्याचे ॲटोमॅटिक मशिनची कार्यक्षमता, गुणवत्तेबद्दल वारंवार तज्ञांकडून तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल शेतकऱ्याने आग्रही हवे, नाहीतर फॅट तपासणीचे चुकीचे निष्कर्ष निघतील.



गाई / म्हशी का उलटतात? (गाभण राहत नाहीत)

कारणे व उपाय

ज्या गाई/ म्हशी माजावर आल्यावर कृत्रिम रेतन करून सुध्दा गाभण राहत नाहीत - पुन्हा माजावर येतात (याला उलटणे असे म्हणतात) अशा गाई / म्हशी तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून मगच उपचार करावे. शी तपासणी लागोपाठ दर एकवीस दिवसांनी गाय माजावर असताना तीन ते चार वेळा करावी लागते. त्या वेळी गाय / म्हैस गाभण न राहण्याचे निदान होऊ शकते.

गाय/म्हैस माजावर येते असे आपण म्हणतो त्यावेळी निश्चित किती दिवसांच्या अंतराने माजावर येते याची पक्की नोंद हवी. गाय/म्हैस गाभण राहणे यात गाय, म्हैस व त्यांचा मालक व कृत्रिम रेतन करणारा या तीन गोष्टींचा संबंध येतो.

अ) गाय व म्हशीची प्रकृती निकोप हवी. तिचे गर्भाशय निरोगी हवे. तिचे वजन योग्य असावे. याव/म्हैस फार अशक्त नको. (तिच्या शेवटच्या चार बरगड्या/ फासळ्या दिसत असतील तर गाय/म्हैस अशक्त समजावी.) अशा गाई म्हशीने दाखविलेली माजाची लक्षणे व्यवस्थित दिसतात. पण ज्या वेळी तिच्या माजातदोन अंतर कमी जास्त असेल तर गर्भाशयातील व बीजांडावरील वकृती बाबत प्राथमिक माहिती मिळते. उदा.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| १) दर १९ ते २२ दिवसांचे अंतर | नैसर्गिक माज |
| २) दर ४ ते ६ दिवसांचे अंतर | बिजांड कोषावर विकृती |
| ३) दर ७ ते १३ दिवसांचे अंतर | गर्भाशयाचा दाह |
| ४) दर ३५ ते ४३ दिवसांचे अंतर | पेशी अवस्थेतील गर्भाचा मृत्यु |
| ५) दर ४२ ते ४५ दिवसांचे अंतर | मधला एक माज ओळखण्याचे राहून गेले |

* काही गाय / म्हशींचा माज विभागून दिसतो. म्हणजे आज माजाची लक्षणे दिसतात व पुन्हा दोन तीन दिवसांनी लक्षणे दिसतात.

* काही गाय/म्हैस व्यवस्थित माजावर असताना ती विशिष्ट लक्षणे दाखवते. या वेळी तिचे निरण सुजलेले असते. त्यातून लहान मुलाच्या लाडेसारखा चिकट, स्वच्छ, पारदर्शक स्त्राव गळतो. अशी गाय/म्हैस मोकळी सोडल्यास दुसऱ्यावर उडते (उडी मारते) त्यांच्या निरणातून पडणारा हा स्त्राव गर्भाशयाच; आरोग्य निकोप आहे हे दाखवितो. पण या स्त्रावात पांढरा ठिपका, अगर बदललेला रंग दिसला तर गर्भाशय निरोगी नाही. यावेळी कृत्रिम रेतन केल्यास गाय गाभण राहणार नाही. यासाठी स्त्रवाचेही निरीक्षण करावे. निरणातून माजाच्या वेळी पडणारा स्त्राव पाण्यासारखा पातळ असल्यास स्फुरदाची कमतरता असते. यावेळी गाय / म्हैस गाभण राहणार नाही.

निकोप गाय / म्हशीला योग्य माजावर असताना कृत्रिम रेतन केल्यावरही पहिल्या इंजेक्शनला भागण रहाणाऱ्यांची संख्या ६०% तर त्यानंतर येणाऱ्या माजावर दुसरे इंजेक्शन दिल्यावर २०% गाई म्हशी गाभण राहतात तर उरलेल्या गाई / म्हशींना दोन पेक्षा अधिक इंजेक्शन लागतात असे आढळले आहे. यावरून एक गोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी की गाय, म्हैस गाभण राहणे ही तिच्या शरीरातील गुंतागुतीची क्रिया आहे. निकोप गाय/ म्हैस निरोगी गर्भाशय, उत्तम बीज, अनुभवी रेतन करणारा, योग्य वेळी केलेले रेतन यामुळे गाभण राहण्याची शक्यता अधिक असते. (पण १००% खात्री नाही) पशुप्रजनन शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे गाय / म्हैस गाभण राहणे ही तिच्या शरीराची चेन आहे, गरज नाही. (गरज मालकाला). शरिराच्या आहार विषयक व आरोग्याबाबतच्या गरजा पूर्ण झाल्यावरच शरिर यंत्रणा गर्भधारणेसाठी कार्यक्षम होते. यासाठी संतुलित आहार देणे यात प्रथिने-ऊर्जा - खनिज मिश्रण आवश्यक आहे. तिचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून हवेशीर स्वच्छ गोठा, रोगप्रतिबंधक लशी नियमित टोचणे - गोचिड, गोमाशा, पोटातील जंत यांचा बंदोबस्त आवश्यक आहे. पिण्यासाठी तिला ताजे, थंड, स्वच्छ पाणी मिळावयास हवे.

- ब) मालक - त्याला गाई / म्हशींचा माज नीट ओळखता यायला हवा. त्याने माजावर आलेल्याची तारिख नोंदवून ठेवली पाहिजे. कृत्रिम रेतन करणाऱ्याला वेळेवर निरोप द्यावयास हवा. माजावरिल गाय / म्हैस ओळखण्यासाठी गाय / म्हैस जेव्हा निवांतपणे रवंथ करतात त्यावेळी त्यांचे निरीक्षण करावयास हवे. यासाठी संध्याकाळी, रात्री (१० ते ११ वाजता) व पहाटे गोठ्यात चक्कर मारावयास हवे. मालकाने संतुलित आहार द्यावयास हवा. कृत्रिम रेतन करण्यापूर्वी शोपटी- निरण पाण्याने स्वच्छ धुवून कोरडे करावे. त्याचवेळी गाई / म्हशींना कृत्रिम रेतन करताना मालकाने काही गोष्टी अवश्य पहावयास हव्यात.
- क) १) रेतन करणाऱ्या व्यक्तीने हाताची नखे काढलेली हवीत. वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी. त्याने गाई/ म्हशीला ममतेने हाताळावे.
- २) रेतन करणाऱ्या गन् शिथ - धुळी पासून संरक्षित हवे. शिथ हे प्रत्येकी वेगळ्या प्लॅस्टिक पिशवीत सिलबंद हवे.
- ३) रेतन करणाऱ्याजवळ द्रवरूप नत्रवायुचे भांड्यात व्यवस्थित द्रवरूप नत्रवायु हवा. त्याची पातळी बिजकांड्याच्या मापाच्यावर १ इंच हवी.
- ४) रेतन करणाऱ्याने स्वच्छ भांड्यात स्वच्छ योग्य तापमानाचे गरम पाणी घेऊन त्याचे तापमान मोजण्यासाठी तापमापकच वापरावा. (पाण्याचे तापमान बोटे बुचकळून पाहू नये.)
- ५) बीज कांडी पाण्यात फारतर ३० ते ६० दांकद ठेवायची. नंतर कोरडी करून (स्वच्छ कपड्याने) गन तयार करावयाची.
- ६) रेतन करणाऱ्याने हाताला क्रिम लावून (श्रीजेल) साबण लावू नये. शेणाच्यामार्गात हात घालून गर्भाशय मुख पकडून गर्भाशयाच योग्य ठिकाणी बीज सोडावे. हि क्रिया लवकर व्हावयास हवी.
- ७) द्रवरूप नत्राच्या भांड्यातून बीजकांडी काढून - गरम पाण्यात टाकावी व ते गर्भाशयात सोडणे ही क्रिया पाच मिनीटांत व्हावयास हवी. त्यानंतर पुन्हा शोपटी व निरणाचा भाग कोरडा करावा. कोणत्या वळूचे रेत वापरले याची नोंद हवी. वरिल सर्व गोष्टींचा गाय/ म्हैस गाभण राहण्याशी संबंध आहे म्हणून या बाबत मालकाने ही दक्ष असावे. गाई/म्हशी नियमित माजावर येवून वेळेवर गाभण राहावे यासाठी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा.
- १) गाय/म्हैस सात महिन्यांची पूर्ण गाभण झाल्यावर पोटभर चान्याशिवाय, तिला वाढीव खुराक (आंबोण) द्यावयास हवे. शरिरासाठी २ किलो+वाढीव खुराकामुळे शरिरात चरबी साठेल. व्याल्यावर गाय/म्हैस या चरबीचा उपयोग करून दुध देते. पण गाय/म्हैस जर अशक्त राहिली तर वार लवकर पडणार नाही. व्याल्यावर लवकर माजावा येणार नाही.
- २) व्याल्यावर ६० ते ९० दिवसात माजावर येऊन रहावयास हवे. (जास्तीत जास्त १२० दिवस) म्हणजे दोन वेतातील अंतर १३-१४ महिने राहिल अशी गाय फायदत पडेल.

- ३) कृत्रिम रेतन केल्यावर लागोपाठ दर २१ दिवसांनी तीन वेळा माजाची लक्षणे दाखविली नाहीत तर गाभण आहे किंवा नाही हे डॉक्टरांकडून तपासून घ्या.
- ४) गाई/ म्हशींना न चुकता रोगप्रतिबंधक लक्षी टोचून घ्या.
- ५) गाई/म्हशींना वर्षातून किमान दोनदा जंतुनाशक औषध द्यावे.
- ६) गाई /म्हशींच्या अंगावरील गोचिडींचा बंदोबस्त करावा.
- ७) गाई/म्हशींना रोज न चुकता खनिज मिश्रण द्या. खनिजात कॅल्शियम, स्फुरद, आयोडिन, तांबे व सलेनियम ची माजावर येण्यासाठी व गाभण राहण्यासाठी जरूरी आहे. (रोज ४० ते ५० ग्रॅम)
- ८) आरोग्याची काळजी घेताना माजाची तारिख, लावल्याची तारिख विण्याची तारिख इ. आवश्यक नोंदी ठेवा.
- ९) व्याल्यावर वार लवकर पडेल अशी औषध योजना डॉक्टरांकडून करवून घ्या. पण हाताने कधीही वार काढू नका.
- १०) गाभडणाऱ्या गाई/ म्हशीत - गर्भाशयाच्या आरोग्याबद्दल डॉक्टरांकडून वेळीच उपचार करून घ्या.
- ११) सांसर्गिक गर्भपाताबद्दल तपासणी करवून घ्या.
- १२) कासेच्या आजारात (प्रत्यक्ष दिसणारा व सुप्तावस्थेतील) गाय/ म्हैस गाभण राहण्यास अडथळा येतो. यासाठी कासेचेही आरोग्य नीट हवे. यासाठी कासेच्या स्वच्छतेसाठी लक्ष द्या.
- १३) खुरांकडे लक्ष द्या. वढलेल्या खुरांमुळे खुप त्रास होतो. यासाठी वाढलेली खुरे वेळीच कापून टाका. वाढलेल्या खुरांमुळे गाभण राहण्याचे लांबणीवर पडते. गाई/ म्हशींच्या शरिरातील कोणत्याही अवयवाला दुखापत झाली तरी एकूणच त्यांचे स्वास्थ्य बिघडते. त्यामुळे गाभण राहण्यात अडचण येते. गाई/ म्हशींचे आरोग्य संतुलित आहार, वेळेवर कृत्रिम रेतण या गोष्टींवर गाभण राहणे अवलंबून आहे, यासाठी मालकाने दक्ष असावयास हवे.



गाई/ म्हशीत वार का अटकते? कारणे व उपाय

गर्भाशयात असताना वासराच्या भोवती जे आवरण असते त्यालाच वार (जार) असे म्हणतात. गाई/म्हशीत या वारेला बाहेरच्या बाजूने सुपारी एवढी अनेक फुले असतात. याच प्रमाणे गर्भाशयाच्या आतिल बाजूस सुध्दा फुले असतात, गर्भाशयाची व वारेची फुले ही एकमेकांना चिकटलेली असतात. यातूनच आईच्या रक्तावाटे वासराला प्राणवायू पुवयला जातो. व कार्बनडाय ऑक्साईड बाहेर टाकला जातो. या वारेवरिल फुलांची संख्या ७० ते ११० असते. (तेवढ्याच संख्येची फुले गर्भाशयाच्या आतील बाजूला असतात.) या वारेला पाच पापुद्रे असतात. नैसर्गिक रित्या वासराचा जन्म झाल्यावर गर्भाशयाच आकुंचन प्रसरण होते. त्यामुळे गर्भाशयाची व वारेची फुले सुटतात आणि वार बाहेर टाकायला मदत होते.

गाई/म्हशीची प्रकृती निकोप असली, तिच्या विण्यापूर्वी आहार समतो असेल तर अशी वार व्याल्यानंतर २ ते ८ तासात बाहेर टाकली जाते. गाई/म्हशीला विताना त्रास झाला नाही, त्यांनी व्यवस्थित चीक दिला. नेहमी प्रमाणे चारा-आंबोण खाल्ले तर चोवीस

तास पडली नाही तरी काही अपाय होत नाही. मात्र या वेळी गाई / म्हशीला ताप नको आणि तिच्या गर्भाशयातून बाहेर पडलेल्या स्त्रवाला घाण वास नको.

वार न पडण्याची महत्त्वाची कारणे याप्रमाणे :-

- १) विताना गाय / म्हैस अशक्त असेल तर गाई / म्हशीला शेवटच्या चार बरगड्या / फासळ्या दिसत असतील तर गाय / म्हैस अशक्त समजावी. विण्याबुर्वी ४५ दिवसात गाभण गाई / म्हशीला रोज किमान दोन ते तीन किलो पशुखाद्य (आंबोण) देणे आवश्यक आहे. म्हणजे गाई / म्हशीच्या शरिरात चरबीच्या रुपाने ताकद साठून राहते. (कमरेची हाडे, शेपटीचा बुंधा, बरगड्या / फासळ्या याच्या (भोवती चरबी साठते.)
घालावे. विण्याच्या वेळी वेणा देताना गर्भाशयाच्या व पोटाच्या स्नायूंचे आकुंचन - प्रसरण होते. त्यामुळे गाई / म्हशीची खुप ताकद खर्च होते. यानंतर वार पडण्यासाठी सुध्दा गर्भाशयाचे आकुंचन - प्रसरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शरिरात जादा ताकद असणे जरूरीचे आहे. अशी ताकद नसली तर वार बाहेर टाकली जाणार नाही.
- २) वार पडण्यासाठी जशी ताकद (उर्जा) याची जरूरी आहे, त्याचप्रमाणे अल्पप्रमाणात कॅल्शियम व स्फुरद यांची जरूरी आहे. तर अत्यल्प प्रमाणात सलोनीयम - तांबे व आयोडिन या खनिजांची आवश्यकता आहे. यासाठी रोजच्या पशु आहारात रोज ३० ते ४० ग्रॅम खनिज मिश्रण (मिनरल मिक्चर) देणे आवश्यक आहे.)
- ३) जंतूजन्य / विषाणूजन्य अथवा इतर कारणांमुळे गर्भाशयाचा दाह (उदा. सांसर्गिक, गर्भपात इ.) असेल तर वार लवकर सुटत नाही, अटकून राहते.
- ४) व्याल्यानंतर गर्भाशयाच्या आकुंचन प्रसरणाची क्रिया लगेच सुरु झाली तर वारेचा न सुटलेला भाग तसाच गर्भाशयात अटकून राहतो.
- ५) अपुन्या दिवसात व्यालेल्या / गाभडलेल्या गुरात वार अटकते.
- ६) विताना गाई / म्हशीला त्रास झाला (वासरु आडवे येणे) त्यामुळे गाय दमली तर,
- ७) काही गुरात वार अटकण्याचा अनुवांशिक दुर्गुण असतो. पण हे प्रमाण फार कमी असते.
- ८) ज्या गुरांत जुळी वासरे जन्माला येतात त्या गुरात वार अटकण्याचे प्रमाण जास्त असते.
- ९) ज्या गाई / म्हशीत गाभणपणाचा काळ जास्त असतो. (गाईत २८० दिवसापेक्षा जास्त, तर म्हशीत ३०० दिवसांपेक्षा जास्त त्या गुरांत वार अटकण्याचे प्रमाण जास्त असते.
- १०) वार जर अटकली तर 'गर्भाशयाचा दाह' होतो. त्यामुळे गाय / म्हैस लवकर माजावर येत नाही. गाभण राहत नाही. त्यामुळे दोन वेतांतील अंतर वाढते. वार अटकल्यावर करावयाचे उपाय (व्याल्यानंतर दहा तास वाट पाहून)
अ) वार कधीही हाताने काढावयाची नाही.
ब) शक्यतो वार निरणाखाली चार बोटे ठेऊन कापावी व लगेच खड्यांत पुरावी. (वारेलर चप्पल, दगड, केरसुणी बांधु नका.)
क) ६ ते ८ तास वाट पाहून ही वार पडली नाही तर अनुभवी डॉक्टरांकडून गर्भाशयात नळीने प्रतिजैविकाचे औषध सोडून द्यावे. असे उपाय सलग पाच दिवस करावयास हवेत. व्यायल्यानंतर गर्भाशय मुख ३६ ता ४८ तासांनी बंद होते. त्याच्या आधी गर्भाशयात औषध सोडणे आवश्यक आहे.

ड) वार अटकून २४ तासापेक्षा जास्त वेळ झाला असेल तर तज्ञ डॉक्टरांकरवी शेणाच्या मार्गात हात घालून गर्भाशयाला हलके मालिश करावे. नंतर शिरेतून प्रतिजैविक इंजेक्शन देऊन घ्यावीत. त्यामुळे वार पडेल.

वार वेळेवर पडावी म्हणून खालील काळजी घ्यावी :-

- १) व्यायल्यानंतर गाई / म्हशीला लगेच गुळाचे सरबत द्यावे. (कोमट पाणी १० लिटर त्यात अर्धा किलो गुळ)
- २) गाई / म्हशीची विण्याच्या वेळी प्रकृति चांगली हवी, अशक्त नको.
- ३) गाई / म्हशीची रोज न चुकता चांगल्या कंपनीचे खनिज मिश्रण द्या. (रोज ३० ते ४० ग्रॅम)
- ४) आपल्या गाई/ म्हशीला 'सांसर्गिक गर्भपात' चा आजार नाही याची तपासणी करून घ्या.
- ५) विण्यापुर्वी गोठा स्वच्छ ठेवा. विण्यापूर्वी शेवटचा आठवडा रोज निरण - शेपटी - कासेचा मागचा भाग कोमट पाट्याने धुवावा. व्यायल्यानंतर अशीच स्वच्छता ठेवावी.
- ६) व्यायल्यानंतर लगेच कास धुवून कोरडी करून चीक पिळावा व वासरास द्यावा. त्याने वार सुटावयास मदत होते. जो पर्यंत वार पडून गर्भाशय पुर्वस्थितीत येत नाही तो पर्यंत गाय / म्हस दुधाला कधीही पुर्णवेळ उतरणार नाही. (कमी दुध देईल)



गाई/ म्हशीच्या वेतातील महत्वाचे शंभर दिवस

दुभत्या गाईचे वेत व्यायल्यापासून ३०५ दिवसांचे मानले जाते. यातील पहिले पाच दिवस चीक मिळतो म्हणून उरलेले ३०० दिवस हे दुधाचे अपेक्षित दिवस समजले जातात. बऱ्याच ठिकाणी गाईचे दुध देण्याचे दिवस ३०० पेक्षा जास्त असतात. पण त्यातील ३०५ दिवसांचेच (खरे तर ३०० दिवसांचे) दुध प्रमाणित मानतात. ज्या गाई ३०० दिवसापेक्षा कमी दुध देतात त्यांच्या बाबत मात्र त्यांनी ३०० दिवसांत किती दुध दिले असते यासाठी सर्वमान्य अशा सुत्राचा अपयोग करून गाईची त्या वेताची दुध देण्याची क्षमता मोजली जाते.

कोणतीही संकरित गाय जेव्हा आपण पाळतो त्यावेळी (अ) दरवर्षी एक वेत (ब) दोन वेतातील अंतर १३ ते १४ महिने असणे आवश्यक आहे. नाहीतर अशी गाय परवडणारी नाही. यासाठी तिचा वेतातील काही दिवस हे जास्त मानले जातात.

गाईच्या वेतातील महत्वाचे शंभर दिवस म्हणजे विण्यापूर्वीचे ३० दिवस आणि व्यायल्यानंतर ७० दिवस. याच दिवसात गाईच्या शरिराची तयारी ही दुध देणे - त्याची सरासरी टिकविणे आणि त्यांनी पुन्हा गाभण राहणे या सर्व गोष्टी करता येतात.

गाय गाभण आहे. - दुध देत नाही म्हणजे तिच्या कासेला विश्रांती, गाईला विश्रांती आणि मालकाला विश्रांती नसून गाभण पणाचा हा काळ म्हणजे नुसती विश्रांती नसून पुढच्या वेताची तयारी - व्यायल्यानंतर दुधात सातत्य टिकविणे - गाभण राहणे या महत्वाची गोष्टी येतात आणि हे काम शरिर करित असताना कोणताही ताण शरिरावर न पडता शरिराचे कार्य सुरळीत चालावे - महत्वाची कसरत तिला करावी लागते. व्यायल्यानंतर दुध देणे यासाठी सर्व शरिर यंत्रणा काम करित असते. त्यासाठी लागणाऱ्या खाद्य घटकांची भरपाई (प्रथिने - उर्जा - खनिज - तंतुमय पदार्थ इ.) होऊन काही प्रमाणात त्यांची गरज दुध देण्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्त असते. असे असले तरच गाय पुन्हा गाभण राहण्यासाठी सक्षम राहू शकेल. कारण गाभण राहणे ही शरिराची चैन आहे.

पण याच काळात (या शंभर दिवसात) जर योग्य प्रमाणात तिला संतुलित आहार मिळाला नाही तर व्यायल्यानंतर तिचे दुध वाढणार नाही. वाढले तर टिकणार नाही आणि टिकले तरी योग्य वेळेत ती गाभण राहणार नाही. याच शंभर दिवसात गाईच्या शरिरावर जास्त ताण असतो. जास्त आजाराच्या तक्रारी याच काळात असतात. विण्याच्या वेळच्या

अडचणी, वार अटकणे, व्याल्यावर होणारे मिल्क फिवर वा इतर आजार हे शरिरावरिल ताणाचे परिणाम आहेत.

गाभणपणातील शेवटचा महिना त्यातल्या त्यात महत्वाचा मानतात. कारण पहिल्या ६ महिन्यात गर्भाशयातील गर्भाची वाढ ३५% होते तर शेवटच्या तीन महिन्यात ६५% होते.

अ) १) शेवटच्या महिन्यात गाईला रोज २०० ग्रॅम पचनीय प्रथिने आणि १५०० कि.कॅलरी उर्जा लागते. यामुळे गर्भाशयातील वासराची वाढ नीट होते आणि गाईच्या शरिरात चरबीच्या रुपाने ताकद साठून राहते. या शेवटच्या महिन्यात कमी तंतुमय व जास्त उर्जेचे खाद्य तिला द्या. या वेळी तिचा प्रकृती अंक ३.५ ते ४ हवा. प्रकृती अंक म्हणजे काय हे जाणकार डॉक्टरांकडून समजावून घ्या.

२) तिला जंतुनाशक औषध (सर्व प्रकारच्या जंतावर लागू पडणारे द्या.)

३) जरूर असल्यास तिचे खुर कापून घ्या.

४) तिच्या कासेवरील लव काढून घ्या.

ब) व्याल्यानंतर कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार वार अटकणे, खाद्य न खशणे, दुधात अपेक्षे एवढी वाढ न होणे- मिल्क फिव्हर- कटासिस इ. होवू नये म्हणून * अॅल्युमिनिअम क्लोरोईड १०० ग्रॅम + मॅग्नेशियम सल्फेट १०० ग्रॅम किंवा कॅल्शियम क्लोरोईड १०० ग्रॅम + मॅग्नेशियम सल्फेट १०० ग्रॅम द्या. (शेवटचे १५ दिवस निदान) यामुळे आतड्यात चांगला कॅल्शियम शोषला जाईल.

शेवटचे ८ दिवस शेपटी -निरण - मागील भागा रोज स्वच्छ धुत जा.

शेवटच्या आठवड्यात - निवाऱ्याच्या मोकळ्या जागी बांधा. विण्याच्या तारखेनुसार तिच्यावर लक्ष ठेवा बहुसंख्य गाई रात्री/पहाटे वितात. त्यासाठी लक्ष हवे. विण्याच्या वेळी गाईच्या शरिराची एकही फासळी दिसता कामा नये.

व्याल्यानंतर अर्धा किलो गुळ १० लिटर पाणी तिला पिण्यास द्या. व्याल्यावर ज्या प्रमाणात गाई चीक देतील त्या प्रमाणात शरिरातील (रक्तातील) कॅल्शियम बाहेर पडेल. (दुधाच्या तिपटी पेक्षा जास्त कॅल्शियम चीकात असतो. त्या प्रमाणात गाय कमतरतेची लक्षणे दाखवते. (यावेळी मिल्क फिव्हर असतो.) पण यामुळे गाय झुलत चालते. डोळे अर्धवट फिटलेले असतात. त्यामुळे इन्शुलिनचे रक्तातातील प्रमाण कमी होते. त्यामुळे शरिरातील ग्लुकोज वापरला जात नाही. त्यामुळे वार अटकते. गर्भाशय व्यवस्थित आकुंचन पावत नाही. गाय माजावर येत नाही. दुध कमी होते. व्याल्यावर दुध देण्याच्या प्रमाणात गाईची भुक वाढत नाही. गाय व्याल्यावर जे दुध देते ती गाभणपणात शरिरात साठविलेली चरबीवर. व्याल्यावर गाईच्या शरिराच्या शेवटच्या तीन फासळ्या दिसणे हे चांगले लक्षण आहे. पण यापेक्षा जास्त दिसणाऱ्या फासळ्यांमुळे १०% दुध कमी होते तर गाईचा माज २१ दिवसांनी लांबणीवर पडतो. व्याल्यानंतर गाईच्या प्रकृतीचा अंक २.८ ते ३.२ असावा. व्याल्यावर काही ठिकाणी तिळाचे तेल + कणिक ५०० ग्रॅम याचा गोळा किंवा चण्याचे पीठ + पाणी १५० मि.ली + गुळ देतात. किंवा चांगले तुप ३०० मिली दर ५ दिवसांनी देतात. हे टाळण्यासाठी गाय विण्यापुर्वी एक महिना हे खाद्य द्याव त्यामुळे गाईचे दुध टिकून राहते व गाय लवकर माजावर येतात. दुध देण्याच्या प्रमाणात उर्जा / क्षार असल्यावर गाय गाभण राहण्याची शक्यता अधिक.

व्याल्यावर ३५ ते ४५ दिवस पर्यंत गाईचे दुध वाढत जाते. ज्या दिवशी ती जास्ती दुध देईल त्याला २४५ ने गुणले असता जी संख्या येते तितके दुध गाय त्या वेतात देईल असा अंदाज करता येतो. पहिलेच वेत असेल तर एका दिवशी जास्तीत जास्त दिलेले दुध गुणीले २१५ = त्या वेताला मिळणाऱ्या एकुण दुधाचा अंदाज.

गाई जेव्हा जास्ती दुध देतात त्यावेळी कमीत कमी वजनाच्या खाद्यातून जास्तीत जास्त उर्जा मिळवण्यासाठी बारामती अॅग्रीच्या मॅक्सक्रिम किंवा मॅक्स मिल्कचा वापर करा.

गाय व्याल्यावर रोची दुधाची नोंद असल्यावर दुधातील चढउतार याबरोबर शरिराचा प्रकृती अंक कसा कमी अधिक होतो ते पहावयाचे हवे. अर्ध्या अंकाने जरी प्रकृती अंक कमी झाला याचा अर्थ गाईचे वजन दुध देण्याच्या प्रयत्नात कमी झाले तेव्हा ह्या घटलेल्या वजनानुळे गाईचे माजावर येणे ३० दिवस पुढे जाते.

गाय व्याल्यावर पहिल्या शंभर दिवसात एकुण दुधाच्या ४०% दुध देते. पहिल्या १२० दिवसात ५०% दुध देते. गाईने दुधात वाढणे (व्याल्यावर ३० ते ४० दिवस) नंतर दुधात टिकुण राहणे - व्याल्यावर सर्वात जास्त दुध दिल्यावर १५-२० दिवस - मग दुधात हळूहळू उतरणे (दरमहा १० - १२%) हे नैसर्गिक आहे. पण यापेक्षा झपाट्याने दुध उतरणे हे व्यवस्थापनातील उणीवा दाखवितात.

दुध देण्याच्या प्रमाणाचा एकुण अंदाज - व्याल्यानंतर ७० दिवसात कळतो. याच काळात वार अटकणे, गर्भाशय पुर्ववत आकुंचन न पावणे - मिल्क फिव्हर- केटोसिस इ. आजाराचीही शक्यता असते म्हणून हे ७० दिवस महत्वाचे -तसेच. विण्यापुर्वी ३० दिवसात - गर्भाशयातील गर्भाच्या वाढीसाठी योग्य खुराक देणे इ. गोष्टीवर लक्ष ठेवावे लागते, म्हणून हे ३० दिवस महत्वाचे. असे गाईच्या वेतातील महत्वाचे १०० दिवस.

(गाय सात महिन्याची पुर्ण गाभण झाल्यावर आटवली जाते, त्यावेळी कासेत औषध मलमाच्या ट्युबा सोडल्या आहेत हे गृहित धरले आहे.)



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.