

३) पशुधनामधील विषबाधा

प्रस्तावना

किफायतशिर पशुपालन करताना पशुपालक व शेतकरी चारा व पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी विविध स्रोतांचा चारा व पशुखाद्य म्हणून वापर करीत असतात. सध्याच्या काळात विविध भाजीपाला प्रकार जसे पालेभाज्या, फळभाज्या, कंदभाज्या यांचा थेट चान्यासाठी वापर करतात. उदा. बाजारभाव फायदेशीर नसल्यास किंवा बाजारात विक्री न झालेला माल, शेतात ही पिके काढल्यानंतर प्रतवारीत न बसलेला माल अथवा भाजीबाजारातील टाकावू झालेला माल तसेच मोठी स्वयंपाक व्यवस्था असलेल्या कार्यक्रमातील टाकावू भाजीपाला इत्यादी.

काही भाजीवर्गीय पिके जास्त प्रमाणात खाल्यामुळे विविध विषबाधा पशुधनात उद्भवत असतात. या विषबाधेमुळे पशुपालकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. यासाठी ज्या पालेभाज्या, फळभाज्या, कंदभाज्या यांच्यामुळे पशुधनात विषबाधा होते, अशा काही प्रमुख पिकांची माहिती या माहितीपत्रकात विषद केलेली आहे.

तसेच पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी पशुपालक धान्यांपासून मद्य निर्मिती नंतर उरलेला चोथा पशुखाद्य म्हणून वापरत असतात. या चोथ्याच्या अतिसेवनामुळे लॅक्टीक अॅसिड विषबाधा होत असते याबाबत ही माहिती या माहितीपत्रकात विषद केलेली आहे.

१) कांदा-विषबाधा

- कांदा व कांद्याची पात, लसूण तत्सम वर्गाच्या वनस्पती मुळे, रवंथ करणाऱ्या पशुधनात विषबाधा झाल्याच्या नोंदी आहेत. कांदा वर्गीय वनस्पती जास्त प्रमाणात खाण्यात आल्यास ही विषबाधा होते. अश्ववर्गीय, गुरे, मेंढ्या व शेळ्या यांच्या मध्ये ही विषबाधा दिसून येते. कुत्रा व मांजर या पाळीव प्राण्यांत ही अशी विषबाधा होते.
- कांद्यामध्ये आढळणाऱ्या एन प्रोपाइल डाय सल्फाईड या घटकामुळे ही विषबाधा होते.
- बाधित प्राण्यांमध्ये हिमोलायटीक अॅनेमिया, हिमोग्लोबीनुरीया व कावळ होते.
- **औषधोपचार** - इनऑर्गेनिक फॉस्फोरसचे इंजेक्शन, बी कॅम्प्लेक्स, तसेच तोंडावाटे कॅल्शियम आणि सलाईन इंजेक्शन यांचा वापर फायदेशीर ठरतो.

२) कोबी - विषबाधा

- कोबी मध्ये एस मिथाईल सिस्टेईन सल्फाईड हा घटक असतो. कोबी जास्त प्रमाणात पशुधनाने खाल्ल्यास उपरोक्त घटकामुळे विषबाधा होते.
- विषबाधेची लक्षणे कांद्याच्या विषबाधेसारखीच असतात. पशुधनाची वजनवाढ खुंटते
- **औषधोपचार** - कांद्याच्या विषबाधेसाठी करावयाचे उपचार या विषबाधेत उपयोगी आहेत.

३) ब्रीवर्स ग्रेन - विषबाधा

- (मद्य निर्मिती उद्योगात धान्यापासून मद्य निर्मिती नंतर उर्वरीत चोथा)
- धान्यापासून मद्य निर्मिती नंतर उर्वरीत चोथा पशुधनास खाऊ घालण्याच्या पध्दतीचा अवलंब काही पशुपालक करत असतात. हा चोथा ओला किंवा वाळवलेला असू शकतो. ओल्या चोथ्याची साठवण ढीगाच्या स्वरूपात करण्यात येत असेल तर त्यात लॅक्टिक ॲसिडची निर्मिती होत असते. अशा प्रकारचा चोथा पशुधनास खाऊ घातल्यास लॅक्टिक ॲसिड विषबाधा होण्याची शक्यता असते. तसेच अशा चोथ्यामध्ये इथेनॉलचे अंश असू शकतात. या इथेनॉल मुळेही पशुधनात विषबाधा होऊ शकते.
- या विषबाधेने बाधीत पशुधनाची हालचाल मंदावते, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते (डिहायड्रेशन) तसेच शेण चिकट व दुर्गंधीयुक्त असते. चोथ्यामध्ये इथेनॉलचा अंश असल्यास त्यामुळे हृदयविकाराने पशुधनाचा मृत्यु होतो.
- औषधोपचार - सोडीयम बाय कार्बोनेट याचा वापर उपयोगी ठरतो.

४) शुगर बीट - विषबाधा

- या वनस्पतीच्या पालेदार भागात ऑक्झॅलेट हे विषारी द्रव्य आढळते.
- ही वनस्पती जास्त प्रमाणात खाल्यानंतर पशुधनाचे पोट गच्च होते, पोटाचे चलनवलन मंद झाल्यामुळे अपचन होते. लॅक्टिक ॲसिडचे प्रमाण वाढते. कॅल्शियमची कमतरता व मॅग्नेशियमच्या प्रमाणात वाढ होते. पशुधनाची दृष्टी अंधु होते आणि ॲनिमिया होतो.
- औषधोपचार - लक्षणावरून आणि ऑक्झॅलेट विषबाधेप्रमाणे उपचार उपयोगी ठरतात.

५) बटाटा - विषबाधा

- मोड (कोंब) आलेला व हिरवट झालेला बटाटा पशुधनास खाऊ घातल्यास विषबाधा होते. हिरव्या पडलेल्या साली मध्ये सोलॅनीन हे विषद्रव्य असते. बाधीत पशुधनास आळीव पदार्थ (ॲस्ट्रीजंट) द्यावेत तसेच सीएनएस स्टीम्युलंटस द्यावेत.