

जनावरांतील पोटफुगी कारणे, लक्षणे, प्रथमोपचार


पोटातील वायू बाहेर न पडल्यामुळे जनावरांना होणारी पोटदुखी अतिशय त्रासदायक असते. वेळीच उपचार न केल्यास जनावर आजारी पडून दगावते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागते.

अजय गवळी, डॉ. विशाल केदारी

पोटफुगी -

खवंध करणाऱ्या जनावरांच्या पोटात खाद्याचे पचन होत असताना वायूची निर्मिती होत असते

आणि हा वायू तोंडावाटे (ढेकर) किंवा अन्य मार्गांनी बाहेर पडत असतो. पण काही कारणामुळे पोटातील वायू ढेकर किंवा अन्य



मार्गांनेही शरीराबाहेर पडू शकत नाही त्यामुळे जनावरांना पोटफुगी होते.

काही वेळेला या वायूचे साबणाचा फेस जसा तयार होतो तशा फेसामध्ये रूपांतर होऊनही शरीराबाहेर पडणे कठीण जाते व जनावर पोटफुगीने आजारी पडते.

लक्षणे -

१) पोटफुगीमुळे जनावर सुस्तावते..

(i) चारा खात नाही.

(ii) पाणी पीत नाही.

(iii) पोटात त्रास होतो.

२) जनावर मागच्या पायाने पोटावर लाथ मारते.
डाव्या भकाळीकडे पाहते.

३) पोटातील वाढलेल्या वायूमुळे पोटाचा दाब
फुप्फुसावर पडतो, त्यामुळे जनावरास
श्वासोच्छ्वासास त्रास होऊन जनावर दगावते.

4) जनावराच्या डाव्या भागाकडील पोट हे पूर्णपणे फुगते आणि हाताने पोट वाजविले तर येणारा आवाज हा घुमतो.

5) पोटफुगीने त्रस्त असलेले जनावर ओरडत असते, वारंवार लघवी व शोण टाकते.

6) जनावराला श्वासोच्छवास व्यवस्थित करता येत नसल्यामुळे ते जीभ बाहेर काढून श्वासोच्छवास करत असते त्यामुळे जनावर बैचेन व अस्वस्थ होते.

7) पोट जर वायूमुळे फारच फुगले तर जनावर लगेच दगावू शकते, त्यामुळे लवकरात लवकर पशुवैद्यकाकडून उपचार करावेत.

कारणे -

१. खराब दर्जाचा चारा खाल्याने पोटफुगी होते.

२. अन्नातील कोबाल्टच्या कमतरतेमुळे, विषबाधेमुळे आणि प्लॅस्टिक खाल्ल्यामुळेही पोटफुगी होते.

३. चारा / खाद्य गिळत असताना चुकून आंब्याची कोय किंवा बटाटा अन्ननलिकेत अडकल्यामुळे पोटात वायू तयार होतो आणि हा वायू बाहेर न पडल्यामुळे पोटफुगी होऊ शकतो.

४. पावसाळी हंगामात हिरवा चारा जास्त प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यामुळे तो जनावरांना भरपूर खाण्यास मिळतो. परंतु चान्याचे पूर्णपणे पचन न झाल्यामुळे पोटफुगी होते.

५. जनावर एकाच जागेवर सारखे न हालचाल करता बसलेल्या अवस्थेत असले तरी पोटफुगी होऊ शकते.

प्रथमोपचार -

१. वायूचे प्रमाण वाढल्यामुळे जर पोट पूर्णपणे टणक झाले असेल तर दाभणाने किंवा जाडसर इंजेक्शनच्या सुईने मणका व कटिबंधातील हाड यांच्या तयार झालेल्या त्रिकोणातील डाव्या बाजूस छिद्र पाडावे जेणेकरून पोटातील वायू बाहेर पडू शकेल.

२. जनावरांच्या तोंडात बोटे घालून पडजीभेच्या स्नायूंना उत्तेजित करावे. जेणेकरून ढेकर येऊन वायू बाहेर पडेल.

३. शक्य असल्यास जनावराच्या अन्ननलिकेत जाऊ शकेल अशी रबराची लांब नळी पोटात सोडावी व पोटातील वायू बाहेर काढावा. ही क्रिया काळजीपूर्वक करावी. जनावराला इजा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

४. जनावरातील फुगलेल्या पोटाच्या भागावर बाहेरून जोरजोरात तेलाने चोळून मालिश करावी व त्याला चालण्यास किंवा पळण्यास लावावे.

५. जनावरांच्या तोंडात थोड्या वेळ काठी बांधून ठेवावी. जेणेकरून पोटातील साठलेला वायू बाहेर पडेल.

६. घरगुती प्रथमोपचार म्हणजे अर्धा लिटर गोडेतेल व टर्पेटाईनचे तेल ३०-४० मी.ली. मिसळून जनावरास हळूहळू पाजावे.

7. जनावरांमध्ये पोटफुगीचे लक्षण दिसून आल्यास जास्त प्रमाणात दिला जाणारा चारा आणि पाणी देणे थांबवावे.

8. जनावराचे पुढचे पाय उंचावर व मागचे पाय उतारावर असतील, अशा पद्धतीने बांधावेत, त्यामुळे फुगलेल्या पोटाच्या पिशवीचा दाब फुप्फुसावर पडणार नाही, जनावराला श्वासोच्छवास सुरळीतपणे घेता येईल.

9. जनावराच्या तोंडात आडवी एक फूट लांबीची लाकडी काठी देऊन ती मोरकीस दोन्ही बाजूंनी बांधावी. त्यामुळे जनावर ती काठी चघळत राहते. लाळेच्या स्रावाचे प्रमाण वाढून पोटफुगी कमी होण्यास मदत होते.

10. मोठ्या जनावरांना पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आय.पी. प्रतवारीचे औषधी उपयोगाकरिता शिफारस केलेले टर्पेन्टाईन तेल ३० मि.लि. आणि गोडतेल २०० ते २५० मि.लि. एकत्रित मिसळून पाजवावे.

11. पशुवैद्यकाकडून तातडीने उपचार करून घ्यावेत.

पोटफुगी होऊ नये यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी -

१. पावसाळी हंगामात हिरवा चारा मर्यादित किंवा गरजेपुरताच द्यावा त्याचबरोबर जनावरास भरपूर प्रमाणात व्यायाम द्यावा.

२. चांगल्या प्रतीचा चारा उपलब्ध करून द्यावा. निकृष्ट दर्जाचा चारा देणे टाळावे. चाऱ्यामध्ये प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कागद, खिळे, तारा, आंब्याची कोय, जाड घन वस्तू जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

३. जनावरांना एका कुशीवर/अंगावर फार वेळ बसू देऊ नये

४. पोटफुगीची लक्षणे दिसून आल्यास ताबडतोब गोडेतेल पाजावे.

५. हिरव्या चाऱ्यासोबतच जनावराला काही प्रमाणात कोरडा चाराही द्यावा.

६. फक्त ओला चारा देणे शक्यतो टाळावे. गाई-म्हशी मध्ये हिरव्या चाऱ्यामुळे पोटफुगी होण्याचे प्रमाण साधारणतः २० टक्क्यांपर्यंत आहे.

धन्यवाद

PDF Create by

Mr. Rupesh. G. Chaundkar