

लेप्टोस्पायरोसिस

लेप्टोस्पायरोसिस हा रोग जिवाणूजन्य रोग असून या रोगाचा प्रादुर्भाव 150 हून अधिक प्राण्यांच्या प्रजाती दिसून आलेला आहे. उत्पादक पशूंमध्ये मोठ्या प्रमाणावर या रोगाचा संसर्ग होतो.

प्रसार - लेप्टोस्पायरोसिस या रोगाचा प्रसार मुख्यत्वे गवत पिण्याचे पाणी आणि पशू चारा यावर होणाऱ्या आजारी जनावरांच्या मूत्र, गर्भाशयस्त्राव आणि गर्भपाताशी संबंधित स्त्रावयांच्या संपर्काने होतो. बाधित जनावरांचे मूत्र हेच रोग प्रसाराचे मुख्य माध्यम समजले जाते. आजारपणानंतर साधारणपणे चाळीस दिवस या रोगाचे जंतू मूत्रावाटे बाहेर पडत असतात. संपर्काने बाधित झालेले निरोगी जनावरे रोग प्रादुर्भावास बळी पडतात. कातडी व आंतर त्वचेतून यकृतात पोहोचणारे जंतू फार मोठ्या प्रमाणात संख्यात्मक वाढ घडवतात आणि सर्व शरीरभर रक्ताद्वारे पसरतात.

लक्षणे - लेप्टोस्पायरोसिस या रोगाचा प्रादुर्भाव तात्काळ तीव्र तात्काळ सौम्य आणि दीर्घकालीन तीव्र अशा तीन टप्प्यात दिसून येतो. एक महिन्यापर्यंत ची वासरे या रोगाला सर्वाधिक बळी पडतात. कारण तीव्र ताप, रक्ताळलेली अंतर त्वचा, रक्तक्षय, कावीळ आणि रक्त लघवी अशी लक्षणे दिसतात, गाभण जनावरांमध्ये चौथ्या महिन्यानंतर आणि शेवटच्या गर्भधारणेच्या टप्प्यात गर्भपात घडून येतो. अजिबात लक्षणे किंवा मागमूस नसताना होणारा गर्भपात अचानक घडतो हे लेप्टोस्पायराचे लक्षण असते. दूध देणाऱ्या जनावरात दूध घट्ट, लाल रंगाचे येते आणि रक्ताच्या गाठी दिसून येतात मात्र स्तनदाहासारखे (दगडी) कोणतेही बाह्य बदल दिसून येत नाहीत. दीर्घकालीन आजारात केवळ गर्भपात हेच लक्षण असते. तीव्र स्वरूपात मूत्रसंस्थेच्या विकार जनावरांचा मृत्यू घडवतो. अवघ्या दहा दिवसात रोग प्रादुर्भाव जीवघेणा ठरतो असणारी जनावरे या रोगाला लवकर बळी पडतात.

रोगनिदान - या रोगाच्या निदानासाठी प्रयोगशाळा चाचण्यांची मोठी गरज असते. सामान्यपणे रोगजंतूंची प्रयोगशाळेत वाढ घडवून आणणे ही दीर्घकालीन चाचणी ठरते. रोगनिदानासाठी पीसीआर तंत्र वापरले जाते.

रोगप्रतिबंधक उपाययोजना - लेप्टोस्पायरोसिस आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उपाय आणि उपचारांची गरज असते. जनावरांच्या यकृत आणि मूत्र संस्थांना कायमचा विकार जडण्यापूर्वी करण्यात येणारे उपाय फायद्याचे असतात. ज्या भागात अल्कली धर्मीय जमिनीचा सामू आहे आणि पाणी साचले जाणारा भूभाग आहे अशा उष्ण व आर्द्रतायुक्त वातावरणात पशुधन व मानवांसाठी लेप्टोस्पायरोसिस धोका टाळणे गरजेचे असते. आजारी पशुधनास प्रतिजैविकांची मात्र पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने तात्काळ द्यावी.