

व्यवसायीक शेळीपालन... बंदीस्त शेळीपालन

... प्रशिक्षण ...



“ सुस्वागतम ” द्वारा

डॉ.गोविंदराव लोखंडे

शेळीपालन उद्योग ... स्वागत सर्वांचे...१

- स्वागत आहे सर्व उद्यमी शेतकऱ्यांचे .
- जे तांत्रिक, वैज्ञानीक विचारांना सोबत घेउन चालण्याचा प्रयास करतात.!
- त्यांचे , जे २१ व्या शतकात वैचारीक बदल आणु शक्तात.!
- त्यांचे, ज्यांचा विश्वास , स्वतःच मालक बनण्यावर आहे. !
- गावातच , आपल्या परसातच , स्वतः आणि
- अनेक बांधवांना रोजगार देउ शक्तात. !
- फक्त मानसीकता बदलण्याची गरज आहे, . !
- हिम्मत दाखविण्याची गरज आहे.!



शेळीपालन उद्योग.....२

- शेळी ..भारतातील एकमेव खरा प्राणी ,,, ज्यावर उद्योग करता येईल.
- सर्व भारतीय पशु पक्षी उद्योग या परिभाषेत न बसणारे....
- म्हणुन ,आपण गाई, कोंबडया ,डुकरं बाहेरुन मागविली ..
- गावठी शेळी वरच लक्ष दिल्यास, लाखो रुपये कमविता येतात.
- फक्त मानसीकता बदलायला हवी. शेळी चे गुण ओळखुन तिला सांभाळायला हवे. एवढेच. एका वर्षात मोठा अधिकारी होउनही एवढे वार्षिक उत्पन्न मिळवु शकत नाही,
- एवढा नफा १००शेळयांचा कळप एकाच वर्षात देते.



बंदीस्त शेळीपालन ,,,,,,,^३

मानसीकता...बदला

या खिशातुन खर्च न होता , दुसरा खिसा भरायला पाहीजे.

फुक्टातुन सर्व व्हायला पाहीजे...

आले किती ,गेले किती याचा हिशेब नसल्याने शेळीपालनाचा

नफ़ा तोटा काढताच येत नाही.

हिशेब काढण्यासाठी, उद्योग शिकले पाहीजे.

जास्त नफ़्यासाठी साठी खऱ्या अर्थान उद्योग करा.

लाखो रुपये मिळवा.



शेळी कुटूंब चालविणारा घटक . . . ४



❖ गरीबाची गाय

❖ शेतकऱ्याचे

अ.टी.एम.

❖ अडचणीची बँक.

❖ मजबुत कणखर

जात. जगात सर्वदुर

❖ कसेही राहुन

माणसाशी जवळीक

साधणारा आणि भिती

नसलेला जवळचा

कुटुंबाचा एकमेव सदस्य

शेळीपालन काल आणि आजही ...रानात नेणे ..५



खाद्याचा खर्च नाही.
पौष्टीक चारा नाही?
शुध्द पाणी नाही.?
रोगाची जादा लागण.
पिलांमध्ये जादा मरतुक.
एकच नराने फळविल्याने
पिलांची पैदास कमी ...
वाढ कमी ...
खताचे उत्पन्न नाही.?
एकंदर नुकसानच...?
म्हणुन लक्ष नाही.

शेळीपालन काल आणि आजही...रानात नेणे...६



- खाद्याची सर्व शक्ती फिरण्यातच वाया..
- उन, पावसामुळे शरीरावर जादा ताण ..
- पौष्टीक चारा नसल्याने वाढ खुंटते.
- पौष्टीक चारा नसल्याने उत्पादन क्षमता कमी .. दोन वितातील अंतर जास्त .
- भारतात जादा वजनाच्या शेळ्या आहेत. संकरीकरण करा.. जादा वजन मिळवा . बंदीस्त शेळीपालन करा. सर्व प्रश्नांच एकच उत्तर ... बंदीस्त शेळीपालन... बंदीस्त शेळीपालन...

शेळीपालन काल आणि आजही ...रानात नेणे..७



सदर चित्र कय दर्शवीते ?

- ❖ शेळीला चार पोट असतात. ती बकाबका खुप चारा खाते. नंतर रवंथ करीत बसते. ओल्या चान्यात पाण्याची टक्केवारी ८०% असल्यामुळे सायंकाळी हगवण लागणे निश्चितच.
- मादी माजावर आल्यास एकच नराने फळविली जाते. त्यामुळे एकएकच करड होतात. करडांनी खुप हिरवा चारा खाल्यामुळे मरतात. रोपे पायाने तुडविल्यामुळे रोपांची वाढ खुंटते..

शेळीपालन काल आणि आजही ...रानात नेणे..८



किती पौष्टीकचारा, ? स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था, ? आजारी जनावरांशी
जवळीक, रोगास निमंत्रण ,... विल्यानंतर घ्यायची काळजी..? पिले किती दुध
पितात ? सर्वात जास्त पिलांमध्ये मरतुक ? काय कमविले? उन्हाळ्यात
कसला चारा? चान्यात पौष्टीकता काय? किती..? फक्त पोट भरणे.

प्रश्नच प्रश्न ? उत्तर एकच बंदीस्त शेळीपालन.!

शेळीपालन काल आणि आजही . . . रानात नेणे..९



- पिकस पायदळी तुडविल्याने वाढ खूंटते ,कपता येत नाही.
- दिवसाला किती चारा लागतो तो मोजुन देता येत नाही. पोटफुगी होते, यामुळे आंत्रविषार रोगाचा धोका नेहमी संभवतो. चांगली जनावरेच मरतात.
- पावसाळ्यात पायात चिखल्या होतात. फुट रॉट हा रोग होतो.लेंडया वाया जातात.
- आजारी जनावरांची विष्टा तेथेच सांडल्यामुळे रोगाचा धोका जास्त असतो.

बंदीस्त शेळीपालन ...१०



बंदीस्त शेळीपालन...११



बंदीस्त शेळीपालन...१२




बंदीस्त शेळीपालन१३



शेळीपालन उद्योग ...

१४



बंदीस्त शेळीपालन१५



बंदीस्त कां ? बंदीस्त कां ?

✓ बंदीस्त शेळीपालनाचा उद्देश...

आपण जे कधी खातो त्यापासुन १०० युनीट शक्ती तयार होते.

✓ त्यापैकी ७० युनीट शक्ती मेंदुस जाते.

✓ उर्वरीत ३० युनिट शक्ती हालचालीत खर्च ...

❖ ही शक्ती वाचविल्यास, ती शक्ती उत्पादक शक्ती म्हणुन शरीरात जमा होते. वजन वाढते.

➤ कोंबडया आपण बंदीस्त केल्या, उत्पादन वाढले?

➤ गाई बंदीस्त केल्या.. दुध वाढले?

➤ तर शेळया कां नाही? कां नाही? बंदीस्त...



मानसीक्ता बदला.

बंदीस्त कां ?.....उद्योग म्हणुन१६

शुध्द पाणी ,पौष्टीक चारा ,

तांत्रिक रोगमुक्त व्यवस्थापन, स्वच्छता, कमी श्रम,
यंत्राचा उपयोग. शुध्द संकरीकरण,

चांगल्या शेळयांची निवड ,लवकर **वजन** वाढ.

गर्भार शेळया तसेच करडांचे व्यवस्थापन ,

गावातच बाजार व्यवस्था,

पडीक जमीनीचा चारा लागवडीसाठी त्परोग

गावातच रोजगार निर्मिती.



बंदीस्त शेळीपालनाचे अर्थशास्त्र...१७

शेळीपालनाची आजची परिस्थिती..

कोरडवाहु क्षेत्रातजुलैमध्ये पाउस येतो ... जो हिरवा चारा उगवतो ते खाउन शेळी मे मध्ये माज दाखवते... (माज दाखविण्यासाठी ५ महीने लागतात)

तसेच बागायती भागात जानेवारी मध्ये चारा थोडाबहुत मिळतो तो खाउन शेळी मे मध्ये माज दाखविते..... (माज दाखविण्यासाठी ५ महीने लागतात)

आपणास शेळी उद्योग करायचा झाल्यास तीला नेहमी पौष्टीकचारा मिळालाच पाहीजे. यासाठी आपल्याकडील जमीनीत पौष्टीकचारा उगवा. शेळी प्रकल्पाला चारा विका.

दिदल धान्य ... लसुण गवत ...बरसीम ,,,चवळी ,, भुईमुग, सोयाबीन...

एकदल धान्य ... मका , कडवळ, बाजरी, हत्ती गवत, गीन्नी गवत, दशरथ

. गवत, यशवंत गवत. ज्यादा असल्यास सुकवुन ठेवा. ओल्या चान्यापेक्षा

- सुक चारा उत्तम. झाडाच्या फांद्यांही तोडुन सुकवुन ठेवल्यास
- पावसाळ्यात चान्याची चणचण भासणार नाही.



शेळीपालनाचे अर्थशास्त्र . . . १८

हिरवा चारा

व्दिदल गवताचे उत्पादन मुल्य साधारणतः ...६५ पैसे किलो

एकदल पिकचे उत्पादन मुल्य साधारणतः ...३५ पैसे किलो.

एक शेळी दररोज ४ किलो ओला चारा खाते . २ कि. लसुण ..१.३०.

२ किलो एकदल ...७० पैसे... म्हणजे २.०० रुपये प्रतिदिन

सुक्र चारा ,,, रोज १ किलो ...झाडाची सुकविलेली पाने, भुइमुगाची पाने,, इतर

कुटार ,तुरीच्या शेंगाची टरफले, ...इत्यादि...५० पैसे किलो.

खुराक... मक्क ७५० ग्रॅम ,११ रुपये. सोयाबीन २५० ग्रॅम ...१० रुपये.

खनीज मिश्रण४ रुपये. एकुण२५ रुपये

शेळीला १ महीना विण्याचे आधी आणि १ महीना विल्यानंतर द्या.....म्हणजे एक

वर्षात दोन वेते (१४ महीन्यात) ४ महीने .रोज २०० ग्रॅम म्हणजे ५ रुपये

म्हणजे वर्षात ,,...६०० रुपये.खुराक .



शेळीपालनाचे अर्थशास्त्र १९

मोठी शेळी (१४ महीने) ४२५ दिवस	तपशिल	करडं ६ महीनेपर्यंत	करडे १२ महीने पर्यंत
२ रुद्रदिवस . ८५०	हिरवा चारा	१२६	३६०
५० पैसे २१२	सुक्र चारा	८०	९०
४ महीने १२० दिवस ६००	खुराक	७२५	१५०
३००	व्यवस्थापन	२००	२००
१९६२	एकुण	१९३१	८००



एका पिलावर एका वर्षात खर्च...१९३१+८००= रु.१९३१.

तीन पिलांचा एका वर्षाचा खर्च १९३१×३ = रु.५७९३.

आईचा खर्च ...१९६२ +५७९३ =रु.७७५५.

शेळीपालनाचे अर्थशास्त्र २०

- उत्पन्न फक्त पिलांची विक्री (वय १ वर्ष) नर साधारणतः ५० किलो.(१८० रु किलो)
- मादी गर्भार . . . ४ महीने रु. ९००० (साधी शेळी ७००० रुपये , गर्भार शेळी ९००० रुपये)
- ३ पिले विक्री , , , , रु. ९००० प्रति $९००० \times ३ = रु. २७,०००$
- खत विक्री ४ . . . मोठी (आई आणि ३ पिले) $७०० \times ४ = रु. २८००$
- एकुण २९,८००
- खर्च . . . आईचा आणि ३ पिलांचा रु. ७,७५५
- शिल्लक रु. २२०४५ तीन वरडांवर
- एक पिलावर सरासरी $२२०४५ / ३ = रु. ७३४८ / -$ धरु फक्त ७०००
- चार पिले झाली तर . . . $७००० \times ४ = २८०००$, पाच झाली तर . . . $७००० \times ५ = ३५०००$
- १०० शेळ्यांवर . . . ३ पिलांवर २२लक्ष, चार पिलांवर २८लक्ष . . . ५ पिलांवर ३५ लक्ष . . .
- होता येते ना लक्षाधीश ! होता येते ! होता येते ! होता येते ! होता येते !

शेळीपालनाचे अर्थशास्त्र २१

हा नफा निव्वळ नफा आहे.

खर्चात आपण ..शेळीस ३०० रु.

एक करडास ...४०० रु. व्यवस्थापन खर्च धरला
आहे. ३ करडांचा १२०० रु. खर्च

१०० शेळ्यांच्या प्रकल्पावर

३०,००० मोठ्या शेळ्यांसाठी

१,२०,००० तीन करडांसाठी

१,५०,००० व्यवस्थापनासाठी ठेवले आहेत.(यात
साधारणतः विजपाणी ,कर्मचारी इ.)



शेळीपालन उद्योग..अधीक कमवा...

२२

- दोन वर्षात जेव्हा आपला आत्मविश्वास वाढेल , तेव्हा आपल्या शेळ्या संकरीत करणे सुरु करा.
- बोअर नर आणा . त्याचेशी गावठी माद्या फळवा.
- पिलांचे वजन ,,, निरीक्षण करा..
- ३ महीन्यात१९ किलो ...
- ४ महीन्यात ...२४ किलो
- पाच महीन्यात ...३० किलो.....
- किती पैसा मिळेल? **होता येते ना लक्षाधीश ! होता येते ?**



शेळीपालन उद्योग...बाजार व्यवस्था...२३

- गावातच बाजार,,, गावातील लोकांनाच आपल्या निवडक माद्या पुरवा.
- त्यांची पिले, नर चांगल्या ग्राहकास विकून द्या. वाजवी किंमत द्या.
- वजन काटा पुरवा, उन्हापासुन वाचण्यासाठी मंडप घाला.
- रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी शेड बांधा.
- रात्रीच्या निवाऱ्याचे,चारापाण्याचे २० रु. प्रति शेळी.
- विकून दिल्याबद्दल २ रु कमीशन एका किलोवर ...
- किती रुपये मासीक १०,०००.? वर्षाचे १लाख ?...
- प्रशिक्षण केंद्र उघडा... वार्षिक १५ लाख... होता येते ना लक्षाधीश !

... भारतीय शेळया२४

सिरोही ..वजन ७० ते ८० किलो.



... भारतीय शेळया ... २५



उस्मानाबादी वजन ४० किलो
बंदीस्त पध्दतीने

संगमनेरी वजन ४० किलो
बंदीस्त पध्दतीने



... भारतीय शेळया... २६

- जमनापारी ,तोतापारी राजस्थान वजन ७० ते ८० किलो
बंदीस्त पध्दतीने....



भारतीय शेळया. . . . २७



सिरोही राजस्थान वजन अदाजे ७५ ते ८०
किलो बंदीस्त पध्दतीने

भारतीय शेळया.... सोजात२८



सोजात वजन ९०
किलो पर्यंत बंदीस्त
पध्दतीने

अल फ़हाद गोट
फ़र्म शहापुर

भारतीय शेळया माखी चिनी . . . २९



Makhi chini with
4months two baby
male & female
Pic on2

भारतीय शेळ्या..जमनापारी ,तोतापारी

३०



जमनापारी राजस्थान वजन ८५ किलो बंदीस्त

पध्दतीने

भारतीय शेळया...सिरोही ...३१.



सिरोही राजस्थान वजन अंदाजे
७५ ते ८० किलो बंदीस्त पध्दतीने

भारतीय शेळया ...बिटल ..३२



बिटल पंजाब, वजन अंदाजे ७५ ते ८० किलो
बंदीस्त पध्दतीने

भारतीय शेळया...जमनापारी ...३३




जमनापारी राजस्थान वजन ८५ किलो बंदीस्त पध्दतीने....

भारतीय शेळया...३४



अजमेरी राजस्थान
६५ किलो

बंदीस्त पध्दतीने



बीटल पंजाब
८० किलो.

भारतीय शेळया...उस्मानाबादी ...३५



सहा करडं देणारी उस्मानाबादी, काटकजात वजन ४० किलो बंदीस्त
पध्दतीने

भारतीय शेळया .. अजमेरी३६



अजमेरी संकरीत ६० ते ७० किलो बंदीस्त पध्दतीने

भारतीय शेळ्या...झारकरना राजस्थान...३७



देशी शेळी ५० किलो बंदीस्त पध्दतीने

भारतीय शेळया जाती ...पंजाब. ३८



कमी वजन २५ किलो
आता जास्त वजनाच्या
शेळया बाजारात आहेत.
जास्त कऱड देणारी
जात. ३ ते ४ नेहमी.

भारतीय शेळया जाती ...३९



ब्लॅक बेंगाल वजन १५
ते २० किलो लहान
शरीरयष्टी आसाम
बंगाल, मेघालय.
डोंगराळ भागात.

विदेशी शेळ्या दक्षीण आफ्रीका ,ऑस्ट्रेलिया ४०

बोअर १०० ते

१२५ किलो

बंदीस्त

पध्दतीने ात

आता सर्व

देशात,सर्व

रंगात.



विदेशी शेळ्या :: सानेन स्वित्झरलँड, इसराईल.....४९



सानेन दुध देणारी. शेळी रोज
४.५ लिटर

विदेशी शेळ्या बोअर.....४२



बोअर १०० ते १२५ किलो
बंदीस्त पध्दतीने

विदेशी शेळया बोअर संकरीत.....४३



क़ळा बोअर १०० ते १२५ क़िलो बंदीस्त पध्दतीने आता विविध रंगात उपलब्ध

शेळयांच्या जाती ...^{४४}

- शेळयांवर भारतात तरी अनेक वर्षांपासून कुठलेही संशोधन झालेले नाही.
- कुणीही, कसेही संकर केलेले आहेत, त्यामुळे भारतात तरी शुध्द जाती उरलेल्या नाहीतच. तसेच कुणीही त्याचे रेकॉर्ड तयार केलेले नाहीत.
- दक्षीण आफ्रीकेचा बोअर सुध्दा सर्वदूर इतर देशांनी आपल्या देशातील शेळयांना संकरीत करण्यासाठी वापरला आहे ,त्यामुळे त्यातही शुध्द (१००%) फर क्वचीत दिसतो. त्यातही विशिष्ट ओळखीचे रंग राहीलेले नाहीत. बोअर शेळी ही अनेक जास्त वजनाच्या जातींशी संकर करून तयार केली आहे. भारतात गेली १५ ते २० वर्षांपासून बोअर आहे.
- बोअरचे १०० % नर उपलब्ध आहेत ते संकरीकरणासाठी घ्यावे.

बंदीस्त शेळीपालनाची प्रमुख तत्वे...^{४५}

- ✓ पोषक आहार.. वयाप्रमाणे .., अवस्थेप्रमाणे.(वाढीव नर ,माद्या, गाभण शेळ्या, फळविणारे नर इ.)
- ✓ स्वच्छता... रोग प्रतिबंधक व्यवस्थापन ... (पावसाळा ,ऋतुबदलाप्रमाणे स्प्रे करणे. वेळोवेळी प्रतिजैविके, जंतनाशक देणे. पिलांना दरमहा प्रतिजैविके दर महीन्यात ,प्रत्येक आठवड्यात ...४ महीनेपर्यंत...)
- ✓ भेटी देणाऱ्यांसाठी फुट बाथचा नेहमी वापर ,,,सर्वांसाठी..
- ✓ नेहमी चिकित्सक बुध्दी वापरून उत्पन्न कसे वाढेल याकडे कटाक्ष...
- ✓ खाद्याचा खर्च कमी करण्याची तजविज... सर्व घटनांव्या वेळोवेळी नोंदी.

बंदीस्त शेळीपालन ...भाग २ ..शेळ्यांची घरे...४६



पक्की घरे, पक्क़ निवारा,
चांगले वायुविजन
एक मोठ्या शेळीला १५ ते
२० फुटापेक्षा जास्त जागा
नाही. हालचाल कमी
झाल्याने वजनात लवकर
वाढ होते. खऱ्या अर्थान
सर्वांच्या नोंदी ठेवता
येतात. चांगल्या जाती
निर्माण करता येतात..

बंदीस्त शेळीपालन साधी घरे..

४७



- मुलभुत कळप, २० प्रमाणे ६ कम्पे
- गर्भार शेळयांसाठी वेगळा कम्पा
- विण्यासाठी वेगळे कम्पे (८)
- नरांसाठी वेगळे कम्पे. (८)
- पिलांच्या वयाप्रमाणे वेगवेगळे ४ कम्पे.
- कोरडा चारा साठविण्यासाठी खोली

पक्की घरे हवामानात बराच
कळ टिकतील असे ..

छप्पर...टीनाचे ...पत्र्याचे
तळ सिमेंटचा ४ इंच जाडीचा
खरबरीत उतारासहीत..

नालीसहीत.

प्रत्येकवयाच्या शेळयांकरीता वेगळे
कम्पे. कमी पावसात २ फुट उंच
जमीनीपासुन तर जादा पावसाळी
भागात ..३ फुट उंच .ओलसरपणा
यायला नको.

बंदीस्त शेळीपालन साधी घरे..४८



पिले जन्मतःपासुन दर पंधरवाडयात वजन. किती वाढ होते याची नोंद, जात..कं वाढ जास्त होत नाही? याची नेहमी चिकित्सा.. जास्त वाढीसाठी खुराकीत नेहमी बदल करा .

गव्हाणीसाठी प्लास्टीकचा पाइप अर्धा कपलेला.
पाण्यासाठी प्लॅस्टीकचे टब,
तळ खरबरीत. कप्प्यांमध्ये भिंत ४ फुट मध्ये ग्रील लावा.. मोठ्या शेळ्यासाठी वेगळा कप्पा, पिलांसाठी वेगळा कप्पा.
.नरांसाठी वेगळा कप्पा.

बंदीस्त शेळीपालन साधी घरे.. ४९



तळापासुन ४ फुटी भित
त्यावर जाळी ,भिंतीमध्ये
हवा येण्यासाठी ग्रील्स
लावा. कवळया
चिमण्यांनी घरे बांधु नयेत
यावर कटाक्ष . तळावर व
आतबाहेर पावसाळयात
फॅरमॅलीनची फवारणी .

बंदीस्त शेळीपालन उत्तम घरे.....५०



शेळीपालन चिरकाल टिकणारा उद्योग , शेळ्याचा कळप लवकर वाढतो म्हणुन आधीच जादा जागा असलेली घरे बांधणे चांगले. नंतर खर्च फरर येतो. दोन्हीकडे शेळ्या मध्ये मोठा पॅसेज. सुरवातीला फुटबाथ बांधणे आवश्यक. कुणीही आत शिरेल त्याने फुटबाथमध्ये पाय ठेवल्याखेरीज आत शिरु नये. **कर्मचारी वा मालक कुणीही.**

बंदीस्त शेळीपालन उत्तम घरे.....५३



मातीचा तळ असु
नये औषधाचा खर्च
वाढतो. रोग
पसरण्याची शक्यता
जास्त .

शेळ्यांना मोकळी जागा (open space) देणे आवश्यक नाही. तेही
मातीवर तर नक्रेच.मातीवर ठेवल्यास रोग मातीतच मुरतो. इतर शेळ्यांना
त्याची लागण होते.शेळ्यांना खाली शहाबादी फरशी किंवा ४ इंच जाड कोबा
केलेला चालेल.पाणी वाहून जाण्यासाठी उत्तर असावा नाली असावी.

સાધી ઘરે.....૫૨




જમીનીપાસુન ડંચાવર ૩ ફુટ
પાવસાઢી ભાગાત

જમીનીપાસુન ડંચાવર ૩ ફુટ
પાવસાઢી ભાગાત



साधी घरे.....५३



असे असल्यास खुल्या
जागेत सोडु नये.

जितकी त्यांची

हालचाल कमी

तेवढीच जास्त

वजनवाढ .

माती नको, सांडपाणी

नको.स्वच्छता ठेवा.

उत्तम घरे...जास्त पावसाळी भागात.५४



जमीनीपासुन उंच लाकडी फळयांवर पावसाळी भागात.. मंलमुत्राचा उग्र वास नसतो. माशांचा डासांचा त्रास नसतो. खर्च जास्त, डागडुजीचा खर्च वाढतो.

घरांची उभारणी... .५५

- सर्वसाधारण ३ फुट खोल पाया,,,, जमीन मुरमाची असेल तर २ फुट
- ३ फुट प्लिंथ ,...त्यावर तीन फुट भिंत.. मध्येमध्ये हवेसाठी ग्रील्स.
- त्यावर छतापर्यंत जाळी. जमीनीपासुन २ फुट उंच... पावसाळ्यात पाण्याचा ओलावा राहायला नको . जमीन आखुन घ्या.
- सिमेंट पोल्स , लोखंडी पोल्स, लाकडी वासे , छतावर टीन ,तळ ४ इंच सिमेंट कोबा अथवा शहाबादी फरशी.मध्ये १० फुट पॅसेज.
- साधारणतः १२ फुट उंच मध्यभागी. ३ फुट उतार, ३.५ फुट ओव्हरहॅंग असावे.
- शेडच्या सभोवताली नेहमी हिरवी राहणारी झुडुपे लावा.शिवरी कपासंदला
- सु बाभुळ, शेवरी, लावा.उन्हाळ्यात गारवा येइल असे बघावे.इतरही झुडुपे लावा.



लाकडी तळ असणे...तोटे

५६



- लाकडी पाटया तुटतात,वाकडया होतात.
- त्या बदलाव्या लागतात.खर्च वाढतो.
- तळ समतल नसतो.खिळे वर येतात
- खुऱ्या वाढतात. **असा तळ नकोच.**

लाकडी तळ पावसाळयात
ओल धरुन ठेवते, त्यामुळे
कतडीचे रोग जास्त होतात.
लाकडाच्या फटींमध्ये उवा,
पिसवा गोचीड घर करुन
राहतात. नेहमी

किटकनाशकाचा स्प्रे मारावा
लागतो, त्यामुळे शेळयांनाही
धोक असतो. खर्च वाढतो

शेळीपालन ... Biosecurity

इतर पक्षी प्राणी यापासुन संरक्षण ,,,

- शेळीघरात कवळया चिमण्यांनी घरे बांधु नयेत याची पाहणी करावी.
- जेथे खाद्य आहे ,तेथे उंदीर राहणारच. उंदीर आले ,की साप येणारच .त्यामुळे खाद्याची कोठारे बांधतांना **Rat proof** घरे बांधावीत.
- आजुबाजुचा परिसर स्वच्छ ,कोरडा ठेवावा. डासांची ,माशांची निर्मीती होणार नाही याची कळजी घ्यावी. डासांमुळे माशांमुळे कही रोग शेळयांना होतात. जसे... अँनाप्लाज्मा ,बॅबेशिया, ब्ल्यु टंग. इत्यादि
- शेळीघरात .उंदरांच्या बंदोबस्तासाठी जरूर ते उपाय करावेत. नेहमी स्प्रे मारावा. शेतातील उंदरांचा बंदोबस्त करावा.

शेळीपालन उद्योग... भाग ३ चारा व्यवस्थापन... ५७

- हिरवा चारा... प्रामुख्याने सर्वात जादा खर्च चान्यावर होतो.
 - आपल्या पडीकजमीनी लागवडीखाली आणा ...
 - एकदल पिके..... मका , बाजरी, कडवळ , हत्ती गवत, गीन्नी गवत, दशरथ गवत, यशवंत गवत. द्विदल पिके .. लसुण गवत , बरसीम , चवळी, सोयाबीन , भुइमुंग
 - दोन्ही उपयोगाची पिके घेतल्यास चान्याचा खर्च कमी होतो.
- .भुइमुंगाच्या शेंगा तुमच्या , पाला शेळ्यांचा .शेडच्या सभोवताली सु बाभुळ, शिवरी लावा.....तुरीचे , हरभऱ्याचे कुटार , गव्हाचे, डाळींचे , शेंगबीयाच्या सुकविलेल्या वेलीचे कुटार... राईस पॉलीश, मका , सोयाबीन , तेलबीया इ.खुराकीत वापरा , वजन वाढण्यासाठी तेलबीया वापरा...हिरव्या चान्यापेक्षा सुकविलेला चारा उत्तम म्हणुन चारा सुकवुन ठेवा.पावसाळ्यात उपयोगी पडेल.

आधुनिक शेळी पालन



व्यवस्थापन चाऱ्याचे ५८

चारा.. प्रकल्पाची आवश्यक बाजु...हिरवा चारा

शेळी जिवंत प्राणी आहे, त्यापासून आपल्या उत्पादन घ्यायचे आहे

चारा पौष्टीक असावा, त्यात शेळीला पुरक आवश्यक सत्व असावे ...

व्दिदल चारा ... प्राथीने... १६ ते २० टक्के. लसुण गवत , बरसीम , चवळी , भुईमूंग , सोयाबीन इ.

○ **एकदल चारा**... लांब पाने असणारा... प्राथीने ... ७ ते ११ टक्के .

○ ... मक्का , कडवळ , मारवेल , हत्ती गवत , दशरथ गवत , संकरीत यशवंत , नेपीअर इ .

○ मोठी शेळी ..रोज चार किलो हिरवा चारा खाते. त्यामध्ये दोन किलो व्दिदल आणि दोन किलो एकदल .

○ सकळी सायंकाळी दोन वेळ हिरवा चारा विभागून द्यावा. १ किलो व्दिदल + १ किलो एकदल . सकळी तसेच सायंकाळी चारा देण्यासाठी तो एकते दिड इंचाचे तुकडे करून द्यावा. नासधुस कमी होईल . एक ठरावीक वेळ चाऱ्यासाठी ठरवलेली असावी . दुपारी केरडा चारा आणि खुराक द्यावा . खुराक शक्यतोवर भिजवून द्यावी . त्यात मक्का भरड , सोयाची , राइस पॉलीशची भुक्ती असेल तर वाया जाण्याची शक्यता कमी असते .

आधुनिक शेळी पालन... ५९



- व्यवस्थापन चान्याचे —सुका चारा
 - ✓ ओल्या चान्यापेक्षा सुका चारा उत्तम. उन्हाळ्यात सुका चारा साठवुन ठेवल्यास पावसाळ्यात उपयोगी पडतो. जास्त पावसाळी भागात आवश्यक.
 - ✓ सुका चारा खाल्ल्याने जनावरे पाणी जास्त पितात.
 - ✓ उन्हाळ्यात जादाचा लसुण गवत , बरसीम गवत, मका, कडवळ, वेली सुकवुन ठेवल्यास उत्तम. शिवरी , सु बाबुळ , कडुलिंब पाला , तुरीची टरफळे, हरभरा, सोयाबीन चुनी बाभुळ , गुलमोहर इत्यादि सुकवुन ठेवल्यास उत्तम पौष्टीक चारा मिळतो. स्टायलो , गीनी गवत सुकवुन ठेवा.
 - ✓ असे कडक पदार्थ शेळीला देऊ नयेत ज्यामध्ये कुठलाही सत्वांश नाही. जसे... कडबा, तुरीचे , कापसाचे काड. कुटार इतर. कडक खोड नको.

आधुनिक शेळी पालन...खुराक...६०

- लसुण गवत, चवळी, बरसीम इ. पौष्टीक चारा दिल्यानंतर खुराक देणे आवश्यक वाटत नाही. कारण त्यात १८ ते २२ % प्रथीने आहेत, आणि एकदल धान्यात ७ ते ११ % प्रथीने आहेत. जादा वजनासाठी तेलबिया वापराव्या. आपल्या भागात उपलब्ध, कमी खर्चाचे खाद्य वापरा... राईस पॉलीश, डाळी,
- गर्भार काळात, गर्भात करड वाढत असतात. त्यांची जोमाने वाढ होण्यासाठी विण्याच्या एक महीना अगोदर आणि विल्यानंतर एक महीनापर्यंत आपणास खुराक देणे आवश्यक आहे.
- पिले म्हणजे आपला नफाच आहे, त्यांना वाढीसाठी पाचव्या आठवड्यापासून ५० ग्रॅम ते सहा महीन्यापर्यंत ३०० ग्रॅम खुराक द्या.
- नरांना रोज २०० ग्रॅम खुराक द्या. नरांना लांब दोरीने बांधून ठेवा. व्यायाम द्या.

आधुनिक शेळी पालन...खुराक... ६१

- खुराक घरीच तयार करा... आपल्या शेतात तयार झालेल्या सोया, तेलबिया आणि तुरीच्या शेंगाची टरफळे, चुनी, राईस पॉलीश वापरा.


पदार्थ	1	2	3	4
मक्का भरड	६०० ग्रॅम	५०० ग्रॅम	५०० ग्रॅम	६०० ग्रॅम
सोयाबीन भरड	१०० ग्रॅम	१०० ग्रॅम	२०० ग्रॅम	१०० ग्रॅम
राईस पॉलीश	१००ग्रॅम	३०० ग्रॅम	२५० ग्रॅम	३०० ग्रॅम
चुनी	२०० ग्रॅम	१०० ग्रॅम	५० ग्रॅम	१०० ग्रॅम
खनीज मिश्रण	५० ग्रॅम	५० ग्रॅम	५० ग्रॅम	५० ग्रॅम

चारा व्यवस्थापन ,,,...६२

- सकळी शेड झाडुन झाल्यानंतर एक बेल वाजवा. ती चारा टाकण्याच्या वेळीच वाजवा. एक मोठी शेळी रोज चार किलो हिरवा चारा खाते, त्यामध्ये व्दिदल १ किलो आणि एकदल एक किलो असा एक ते दिड इंच कपलेला चारा घाला. चारा घालण्याआधी गव्हाण पुसुन घ्या. तो संपेपर्यंत दुसरा चारा देऊ नका.
- तेवढाच चारा सायंकाळी घाला. मध्ये कमीतकमी ३ ते ४ तासाचे अंतर ठेवा.
- दुपारी सुकलेला चारा आणि खुराक (आवश्यक त्यांनाच द्या.)
- लहान करडांना दुसऱ्या आठवड्यापासुन थोडा थोडा लसुण गवत द्या.
- वाढीव करडांना त्यांच्या वयाप्रमाणे हिरवा चारा वाढवा. त्यांना सहा महीनेपर्यंत ३०० ते ४०० ग्रॅम खुराक वाढवा. चारा रात्री कपुन ठेवा.

पाणी व्यवस्थापन

- एक मोठी शेळी दररोज ६ ते ८ लिटर पाणी पिते.
- पाण्याची भांडी दररोज धुता आली पाहिजे. लांब आकाराची मातीच्या कुंड्या वापरा... त्यांना पिलांना सोपे होईल असा उंचीवर ठेवा.
- रोज पाण्याची भांडी धुवूनच त्यात ताजे पाणी भरा. लहान पिलांसाठी पाण्याचे टब किंवा उथळ भांडी वापरा. मोठ्या शेळ्यांना ८ ते १० लिटर पाणी मावेल अशा प्लास्टिक बादल्या असाव्या.
- गर्भार शेळ्यांचे घरात, नरांचे घरात, विण्याच्या घरात चाऱ्यासाठी टब आणि पाण्यासाठी, खुराक देणेसाठी टब वापरा. लहान करड पाण्यात पडल्यास त्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घ्या.
- उन्हाळ्यात पाणी थंड असावे. पावसाळ्यात पाणी गाळून द्या



रोजची दिनचर्या...कमगारांसाठी ६३

- सकाळी ८.३० ... सर्व शेड झाडुन काढणे.आठवडयातुन एकदा धुणे
- सकाळी ९ ... पाण्याची भांडी रिकामी करुन पुसणे. नवीन स्वच्छ पाणी भरणे, गव्हाण साफकरणे.
- सकाळी १० ... कापलेला मिक्स चारा मोजुन टाकणे , चाऱ्यात खाण्याचा सोडा मिसळणे.. पिलांची वजने घेणे. पिलांना खुराक देणे .नोंद करणे.
- सर्व शेडमध्ये नजर फिरवुन आजारी असल्यास बाहेर काढणे.
- लक्षणानुरूप उपाययोजना करणे.
- दुपारी सुका चारा ,खुराक आणि सायंकाळी पुन्हा हिरवा चारा घालणे.
- सायंकाळी चारा कापणे. सर्व घटनांची नोंद करणे,संबंधीतांना कळविणे.

बंदीस्त शेळीपालनाची प्रमुख तत्वे...उपकरणे ...६४

- उद्योगामध्ये मानवी श्रम कमी करणे महत्वाचे. माणसे मिळत नाही.
- चारा कपण्याचे यंत्र ,चाफ कटर, शेतातील लसुण गवत कपण्याचे यंत्र..
- वजन करण्याचे यंत्र ३०० (डिजीटल)किलो पर्यंत चारा ,खुराक मोठ्या शेळ्यांचे वजन , नरांचे वजन करण्यासाठी.
- स्प्रिंग बॅलन्स लहान पिलांचे वजन मोजण्यासाठी ,वाढीची नोंद करण्यासाठी.. छोटी चक्की ,,, मका ,सोया भरड करण्यासाठी.
- स्प्रेअर..शेडमध्ये ,सभोवताली पावसाळ्यात स्प्रे करण्यासाठी.ग्राइंडर.
- खच्ची करण्याचे चिमटा. मेडीसीन बॉक्स. शेड धुण्यासाठी कंप्रेसर मशीन.

बंदीस्त शेळीपालनाची प्रमुख तत्वे..विज पाणी व्यवस्था.६५

- पाणी ...शेतीसाठी , पिण्यासाठी , शेड धुण्यासाठी
- साठा करा...मोठी टाकी बसवा. बोअर वेल असणे आवश्यक.
- पिण्याच्या पाण्यासाठी लांब कुंड्या मिळतात. त्या ठरावीकउंचीवर ठेवा.
- रोज जुने पाणी फेकून द्या. स्वच्छ ताजे पाणी भरा. कुंड्यांना आतुन चुना लावा. बाहेरुनही चुना लावा. पाण्याची भांडी उतार असलेल्या जागेवर ठेवा. गव्हाणही रोज साफ करा. डेटॉलच्या ओल्या कपडाने पुसुन घ्या.
- शेडमध्ये फक्त रात्री एकदोन टयुबलाईट
- लावा. पिलांना टब मध्ये पाणी ठेवा.
- टब एक विशिष्ट उंचीवर ठेवा.



बंदीस्त शेळीपालनाची प्रमुख तत्वे...

शेळया विक्रत घेणे...(honeymoon period)६६.

- चांगल्या शेळया बाजारात मिळत नाहीत. पण पर्याय नाही. जवळच्या बाजारातुन किंवा देवनार मुंबई मध्ये कत्तलखान्यात दिल्ली ,राजस्थान, हरीयाणा येथुन शेळया येतात. त्यातुन चांगल्या शेळया निवडुन घ्या.गावात तीन चार करड देणारी शेळीची मादी पिले, नर विक्रत घ्या, आधी गावाजवळीलच शेळया विक्रत घ्या. त्यांची पिले आपल्याकडे तयार झाली की पुढे भिती नसते. जमनापारी, तोतापारी, सिरोही , नागफणी, बीटल, अजमेरी.इ. माद्या घ्या.
- नर ... जमनापारी , सिरोही बिटल घ्या. जास्त घेउ नका.दोन दोनच घ्या.
- पहिला दिवस...शेळया आपल्याकडे आणल्यानंतर त्यांना चार तास फक्त गुळपाणी द्या. त्यांच्या प्रवासाचा शिण कमी करा. चार तासानंतर चारा घाला.



बंदीस्त शेळीपालनाची प्रमुख तत्वे...(honeymoon period) .६७

- नवीन शेळ्यांचे व्यवस्थापन ... प्रश्नच प्रश्न.. प्रवासाचा ताण, नाकत विषारी वायु,
- दुसरा दिवस... रोज १ किलो मक्क भरण्ड + सोया भरण्ड मिसळून द्या. एकूण ८ दिवस.
- दुसऱ्या दिवशीपासून प्रतिजैविकांचा डोज द्या. ४ दिवस (त्या शेळ्यांना तिकडे कुणीही प्रतिजैविके देत नसणार, लसीकरण केले नसणार)आपल्या प्रकल्पात रोग येण्याची पूर्ण शक्यता असते. (incubation period.मध्ये शेळ्या असणार.)एनरोसीन ,सिप्रोफ्लॉक्सीन रोज ५ मिली तोंडावाटे द्या. पी.पी.आर रोगाची लस लावा.
- आठव्या दिवशी जंतनाशकाची एक गोळी द्या. हायटेकची गोळी. Ivermectin inj.
- शेळ्या आणल्यापासून ते आठ दिवसानंतर चे निरीक्षण करा. जर समाधानकारक वाटत असेल,त्यांची वजन घ्या. तर त्या शेळ्या आपल्या प्रकल्पात सुट झाल्या असे समजावे. नंतरच त्यांना माजावर आणण्याचे प्रयत्न करावेत..
- आठ दिवसानंतर वजन घ्या वाढीची नोंद करा.निरीक्षण करा, बदल झाल्यास ठरवा.

शेळयांचे व्यवस्थापन.....भाग ४....६८

नवीन शेळयांचे व्यवस्थापन (Honeymoon period)

- सुरवातीला आणल्यावर आणि ८ दिवसानंतर वजनात किती फरक पडला याची नोंद ठेवा. किती फरक पडला याची जाणीव असु द्या.
- खुराकीत राईस पॉलीश ३०० ग्रॅम मिसळा. २ पाव मका १ पाव सोयाबीन .
- शेळयांच्या कसेवरून त्या कधी विलेल्या आहेत याचा अंदाज येईल.
- असा शेळयांना प्रत्येकी पाव किलो मोड आलेली कडधान्य ८ दिवस द्या. त्यात चमचाभर खनिज मिश्रण घाला. ७ ते ८
- दिवसात शेळी माज दाखवेल. हे देऊनही जर
- शेळी माज दाखवित नसेल तर.. पी जी एफ २ चे इंजेक्शन द्या.

तीसऱ्या चवथ्या दिवशी शेळी माज दाखविते.



शेळयांचे व्यवस्थापन...मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन ...६९

- जर एखाद्या कम्प्यामधील शेळया माज दाखवित नसतील तर त्या कम्प्यातील खच्ची नर आठ ते दहा दिवस कढुन ठेवा. आठ दिवसानंतर कम्प्यात सोडा. शेळया आपोआप माजावर येतील. शेळयांच्या कम्प्यात माजावरील शेळी ओळखण्यासाठी खच्ची केलेला नर असणे आवश्यक आहे.शेळया माणसाळलेल्या असातातच,तसेच कळपात नर असणे जरूरी
- सकळी माजावर आलेली शेळी सायंकाळी विशेष नराने फळवुन घ्या ,आणि सायंकाळी माजावर आलेली शेळी सकळी विशेष नराने फळवून घ्या .नराचे क्रमांकआणि तारीख नोंद करुन घ्या शेळयांच्या विण्याची तारीख कढता येईल.



मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन...चारा

- क्वही शेळया फक्त लसुण गवतच खातात. लसुण गवतात प्राथीनांचे प्रमाण जास्त असल्याने गव्हाणीत रोज मुठभर खाण्याचा सोडा मिसळल्यास असीडोसीस होण्याचे प्रमाण कमी होते.
- कालचे खाद्य गव्हाणीत उरलेले असल्यास, ते जास्त होते काय?
- खाण्या लायक नव्हते क्वय? वास येतो काय? इत्यादि प्रश्न मनात आले पाहीजे. त्याचा वास घेउन बघा. जर वास येत असेल तर क्वराकुंडीत टाक. नसेल तर नव्या चाऱ्यात मिसळुन द्या. मध्येमध्ये चाऱ्यात विटामिन्स घाला. खनीज विटा प्रत्येक कप्प्यात टांगुन ठेवा.खाद्य नेहमी मोजुन टाक.
- दर तीन महीन्यांनी जंतनाशक द्या. ऋतुबदलाच्या वेळी प्रतिजैविकाचा डोज द्या,

शेळयांचे व्यवस्थापन...शेडचे व्यवस्थापन ७०

- शेडचे व्यवस्थापन
- शेड नवीन आहे, सर्व भिंतींना चुना रंग लावून घ्या. दर तीन महीन्यांनी
- चुना रंग लावून घेणे आवश्यक वाटते. जाळया तपासून घ्या. शेळयांच्या घरात कवळया, चिमण्यांचे घरटे नकोत. पाण्याच्या टाक्यांना आतून चुना लावा. भिंती मातीच्या विटांच्या असतील त्यांना प्लास्टर लावा.
- पाउस नसेल त्यावेळी फुटबाथमध्ये चुना नेहमी घाला. पावसाळयात पोवीडॉन आयोडीन किंवा डेटॉल चे पाणी ठेवा. प्रत्येक कर्मचार्याने वा मालकाने शेडमध्ये शिरतांना फुटबाथमध्ये पाय बुडवूनच आत शिरणे आवश्यक आहे. पावसाळयात शेडच्या सभोवताली फॉर्मॅलीन स्प्रे १० % आठवडयातून दोनदा फवारणी करावी. जरूरी वाटल्यास शेड आठवडयातून एकदा तरी धुवून घ्या.



शेडचे व्यवस्थापन...मातीवर...?.....असे नको... ७१



व्यवस्थापन ...शेडची अस्वच्छता..?

असे नको७२



व्यवस्थापन ...शेडचे... अस्वच्छता..?

चारा वाया जातो?.....असे नको ७३




व्यवस्थापन ...शेडचे... असे नक्के७४



शेडचा तळ
मातीचा नसावा...
अनेक रोग
होतात.
ओलावा असतो.

व्यवस्थापन ...शेडचे...पावसाळा ,हिवाळा..?..७५

असे नक़े



व्यवस्थापन ...शेडचे... असे हवे. ७६



व्यवस्थापन ...शेडचे तळ..!.. असे हवे. ..७७



स्वच्छ व्यवस्थापन सिमेंटचा तळ

व्यवस्थापन ...शेडचे.....७८



असे हवे.

असे नको



व्यवस्थापन ...शेडचे तळ ? भिंती ?.....

अशा भिंतीत गोचीड ,पिसवा असतात...७९



व्यवस्थापन ... खाद्य.....८०



खनीज विटा
टांगुन ठेवा.



खाद्य वाया
जाणार नाही
याची कळजी
घ्या.

व्यवस्थापन...मोठ्या शेळ्या...८९



कनात बिल्ले लावा
ओळखीसाठी ...जातवार
ओळख होइल असे क्रमांक द्या

जात., वय, माजावर आल्याची ,
फळल्याची नोंद घ्या. चार्ट लावा.



व्यवस्थापन...मोठया शेळया...८२

- मांजावर येत नसल्यास उपाययोजना करा. आठ दिवस मोड आलेली धान्य, मक्क भरपुर प्रमाणात द्या. त्यासोबत खनीज मिश्रण २ चमचे घाला. कप्प्यातील नर कढुन टाका .आठ दिवसांनी परत सोडा. नराच्या उपस्थितीत शेळया लवकर माजावर येतात. वेगवेगळया जातीच्या शेळया वेगवेगळया कप्प्यात ठेवा.
- फळविणाऱ्या नरांना एक, एक कप्प्यात वेगळे ठेवा.मारामारी टाळा.
- शेळयांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवा. आजारी शेळी वेगळी करा , लक्षणानुरूप औषधी द्या.ताप असल्यास प्रतिजैविके चार दिवस द्या.
- शेळी घरात हगवण,लेंडया,लघवीवर लक्ष दिल्यास रोग लक्षात येइल.

शेळयांचे व्यवस्थापन.....८३

मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन

- मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन ... माद्यांचे व्यवस्थापन ...
- प्रत्येक शेळीच्या गळयात ओळखीसाठी विशेष क्रमांक द्या.
- मादी व्याल्यानंतर पिलांना एक ते दिड महीनाच दुध पाजा.
- पहीला ,दुसरा आठवडा तीन वेळा .तिसरा चवथा आठवडा दोन वेळा.
- पाचवा सहावा आठवडा दोन वेळा. पिलांना आईपासुन दुर ठेवा.

असे न केल्यास पिले किती दुध पितात याची नोंद नसते. मादी लवकर माजावर येत नाही. विल्यानंतर मादी दिड ते दोन

महीन्यात माजावर आलीच पाहीजे. १४ महीन्यात दोन वेते मिळालीच पाहीजे याचा हेक धरा.

- त्यानुसार करवाई करा.





मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन..८४

- शेळयांच्या कप्प्यात कहीवेळ तरी बसा. शेळया जवळ येतात. त्यांना कुरवाळा. त्यांच्यावर हात फिरवा. त्यांचेवर गोचीडे लिखा, उवा आहेत क? याची तपासणी करा. असल्यास उपाययोजना करा.
- लसुण गवत आणि हिरवा एकदल चारा एकते दिड इंचाचे कपुनच रोज सकळी १ +१ किलो द्या. सायंकळी तसाच द्या. दुपारी सुक्या चान्याबरोबर खुराक मिसळुन द्या. दोन्ही चारा टाकण्याच्या वेळेच्या मध्ये कमीतकमी तीन तासांचे अंतर असावे. जितक वेळ शेळी रवंथ करीत बसेल तितकी ती निरोगी आहे असे समजावे.
- एक मोठ्या वहीत प्रत्येक शेळीचे नाव क्रमांकलिहून ठेवा. तिच्या संबंधीत सर्व माहिती असावी. सर्व नोंदी टिपुन ठेवा.

मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन...८५

- जितकेदिवस शेळी पिलांना दुध पाजत राहील तेवढी ती माजावर येण्यास विलंब लावील. या घरात चाटण विटा टांगुन ठेवा.त्याने माजावर येण्यास मदत होते.
- शेळी चार महीन्याची गाभण राहीली की तीला गर्भार शेडमध्ये ठेवा.
- दरवर्षी २० % शेळ्या निकामी म्हणुन काढुन टाक. आपल्याच कळपात तयार झालेल्या मादी पिलांना त्याच्या गुणवत्तेनुसार निवड करा.
- ✓ पिलांची निवड...आईच्या पिले देण्याच्या आधारावर..बापाच्या गुणांवर.
- ✓ पिलांच्या वाढीच्या आधारावर.. ६ महीन्यात किती वजन होते यावर...
- ✓ मांज किती वयात दाखविते यावर ,माजावर येण्याच्या
- ✓ वेळी वजनावर.



व्यवस्थापन...मोठ्या शेळ्या...चारा पाणी...८६

- मादी फळल्याची तारीख नोंद करा. त्यात १५० दिवस मिळवा. विण्याची अपेक्षित तारीख येईल.
- चवथ्या महीन्या अखेर शेळीस गर्भार शेळ्यांच्या शेडमध्ये घाला.
- या शेडमध्ये रोज अर्धा तास तरी बसा. शेळ्या जवळ येतात. त्यांच्या पाठीवरून मानेवरून हात फिरवा. माणसांच्या मायेची त्यांना फ़र गरज असते.त्यांना खुराक द्या.त्यांच्या हालचालीवर कसेवर लक्ष द्या. पोटाच्या आकारावरूनही किती पिल्ले असतील याचा अंदाज बांधा .
- व्यायच्या चार दिवस आधी शेळीला विण्याच्या शेडमध्ये घाला.

मुलभुत कळपाचे व्यवस्थापन...८७

- यावरुन जुन्या विक्रत घेतलेल्या शेळ्या चार वर्षात सर्वच कढुन टाकयच्या आहेत. दरवर्षी पंचेवीस याप्रमाणे (२० निकमी +५ मरतुकीच्या) चार वर्षानंतर सर्व शेळ्या आपल्या कळपात नवीन येणार आहेत. त्यानंतर खऱ्या अर्थान आपल्या प्रकल्पास सुरवात होणार आहे.
- विशेष... आपल्या कळपातील नर कधीही निवडु नका.. आई मुलगा, बहीण भाउ यांचा संकर टाळा. दर दोन वर्षांनी नवीन नर बाहेरुन विक्रत घ्या. दोन वर्षानंतर आपल्यास असे वाटले की हा शेळी प्रकल्प आपण योग्य रितीने चालवु शक्तो तेव्हाच बोअर , जमनापारी, किंवा जादा वजन देणाऱ्या नरांच्या जातींचा कळपात सुरवात करा.



गर्भार शेळयांचे व्यवस्थापन.....८८

- फळल्यानंतर चवथ्या महीन्याच्या सुरवातीलाच शेळीस या घरात आणा.
- तिला रोज ठरल्याप्रमाणे खुराक द्या. तिच्या वाढीवर, हालचालीवर लक्ष ठेवा. शेडमध्ये आणण्याआधी आणि विण्याच्या शेडमध्ये घालण्याआधी वजन घ्या.नोंद करा.या शेडमध्ये जास्त शेळयांची गर्दी करू नका.या घरात चाटण विट अवश्य टांगून ठेवा.शेळी गाभण आहे किंवा नाही यासाठी कसेतुन कसे घट्ट दुध निघते याचा प्रयोग करून कधीच बघू नका.यामुळे कसेचे रोग टाळता येतात.या शेडमध्ये रोज अर्थातास तरी बसा... शेळयांना कुरवाळा, त्यांच्या पोटाकडे आणि कसेच्या वाढीकडे,चालण्याकडे लक्ष ठेवा. आपले निरीक्षण आणि अनुभव नेहमी आपल्यास मदतगार ठरणार आहेत.
- नोंद केलेला एखादा चार्ट कप्प्यात टांगून ठेवा.
- विण्याच्या चार दिवस आधी शेळी विण्याच्या
- कप्प्यात सोडा.



शेळीघरातील नोंदी

- शेळीपालन उद्योगात प्रत्येक शेळीचे ,घडणाऱ्या घटनांची नोंद आवश्यक आहे. शेळ्यांसाठी... आणल्याची तारीख , बिल्ला क्रमांक, जात, रंग.
.शेळीचे आणल्यानंतरचे वजन, सोबत करड असल्यास किती? नर ,मादी,
- ८ दिवसांनंतरचे वजन .. दिलेली औषधे. अंदाजे खर्च ,माजावर आल्याचा दिनांक,फळविल्याचा दिनांक, नराचा क्रमांक,जात,अपेक्षित विण्याची तारीख.(फळविल्याचा दिनांक +१५० दिवस) विण्याच्या घरात नेण्याची तारीख (फळविल्याचा दिनांक +१२० दिवस).
- सवयी. आजारी अवस्था, औषधोपचार, एकंदर लसीकरण ,जंतनाशक, प्रतिजैविके इत्यादि.

विण्याच्या शेडचे व्यवस्थापन... ८९

- विण्याच्या शेडमध्ये प्रत्येक शेळीसाठी एक कम्पा निर्जंतुक केलेला असावा. त्यात खाली गव्हाचे वा तणसाचे आच्छादन असावे.
- नेहमीप्रमाणे या शेडमध्येही शेळीला खुराक आणि चारा द्यावा. तिच्या विण्याच्या तारखेवर लक्ष द्या. तिला नेहमीप्रमाणे नैसर्गीकरित्या विउ द्या.
- शेळ्या सहसा दिवसाच वितात. त्यांना मानवी मदतीची गरज नसते..
- परंतु आपल्या निवडीमध्ये तीन, चार पिले होणार असतील, एखादे पिले अडकले असेल .बराच वेळ वित नसेल तरच मदतीची आवश्यकता असते..असा वेळी शेळीला सोडवितांना हातात हँडग्लोव्हज घालूनच हात घालावा. पिले आडवे, किंवा मृत असेल तर बाहेर काढावे.पुर्ण विल्यानंतर गर्भाशयात फ्युरिया बोलसच्या दोन गोळ्या ठेवून द्याव्या. म्हणजे गर्भाशय स्वच्छ होईल.



विण्याच्या शेडचे व्यवस्थापन...१०

- विल्यानंतर शेळी आपल्या पिलांना चाटुन स्वच्छ करते. पिलांची नाळ काही अंतरावर स्वच्छ करूनीने कापुन त्यावर टिंकचर आयोडीन लावा. त्यामुळे त्यांना बेंबीचे रोग होणार नाहीत. जादा पिले झाले असतील तर त्यातील अशक्त पिलांना शेळीच्या कासेजवळ न्यायला ,उभे राहायला मदत करा. विल्यानंतर एक तासाच्या आत पिलांनी आईचा चिकपुर्णपणे पिलाच पाहीजे.याकडे लक्ष द्या. शेळीचे दुध काढु नका. आठ तासांनी शेळी दुसऱ्या विण्याच्या काप्प्यात हलवा. विलेल्या शेळीचा काप्पा त्वरीत निर्जंतुक करून घ्या
- या नवीन काप्प्यात शेळी चार दिवस ठेवा.
- चार दिवसांनी शेळी मुलभुत शेळीच्या काप्प्यात
- आणि पिले नवीन जन्मलेल्या पिलांच्या काप्प्यात हलवा



विण्याच्या शेडचे व्यवस्थापन...९१

- नोंदी ...शेळीच्या वहीत जन्माची तारीख ,नरांचा क्रमांक,जात, पिलांची संख्या, नर मादी, जन्मतः वजन इत्यादींची नोंद करा.
- पिलांना दुध पाजण्यासाठी आईस पहील्या दोन आठवडयात तीन वेळा दुध पाजण्यासाठी आणा.तिसऱ्या चवथ्या आठवडयात दोन वेळा आणा.
- दोन आठवडयानंतर पिले थोड थोडे हिरवे लसुण गवत खायला सुरवात करतात. ते त्यांना हवे तेवढे खाऊ द्या.
- चवथ्या आठवडयाअखेर वजनाची नोंद घ्या. पाचव्या आठवडयापासुन त्यांना ५० ग्रॅम पासुन खुराकसुरु करा. ती वयाप्रमाणे
- आणि वजनाप्रमाणे वाढवत चला.दर महीना अखेर
- वाढीची नोंद ठेवा. खुराकओली करुन द्या.



विण्याचे घरातील नोंदी

- विण्याचे घरात आणल्याची तारीख, फळल्याची, विण्याची तारीख.
- प्रत्यक्ष विल्याची तारीख. आईचे वजन अडचणी, पिलांची संख्या, नर , मादी, पिले. पिलांची जात,,, (आईची जात ,बापाची जात ,पिलांची रक्ताचे बापाच्या रक्ताचे प्रमाण)
- जन्मतः वजन, एकंदर अवस्था....
- पिलांना पिलांच्या घरात टाकण्याची तारीख. आईला मुलभुत कळपात घालण्याची तारीख.

पिलांचे व्यवस्थापन ९२

- नवजात पिलांना विण्याच्या शेडमध्ये चार दिवस आईसोबत ठेवल्यानंतर आईस मुलभुत कळपात ,तर पिलांना नवजात पिलांच्या कळपात ठेवावे.
- नवजात पिलांच्या घरात मउ तळासाठी तणीस अथवा गव्हाचे कड वापरावे.
- त्यांना थंडीपासुन बचाव करण्यासाठी वर २०० वॅटचे बल्ब लावावे आणि कप्प्याबाहेर हिटर लावावे . त्यांना थंडी लागणार नाही याची सतत पाहणी करावी आणि त्यानुसार बदल करावे. थंडीमध्ये जाळीस प्लास्टीकचे पडदे लावावेत, जास्त थंडीत शेडमध्ये लाकडी कोळसे पेटवुन उष्णता निर्माण करावी. दोन महीन्याची पिले झाल्यावर त्यांना वातावरणाशी समरस होतात. त्यामुळे प्रकल्पात पिले जगविणे ही फ़र महत्वाची बाब आहे. कारण बाहेरील राज्यातील जाती आणल्यास, त्यांची पिलेच आपल्या वातावरणात तग धरली पाहीजे.



पिलांचे व्यवस्थापन.....९३

- वयानुसार पिलांना वेगवेगळ्या कप्प्यात ठेवा. कारण मोठी पिले लहान पिलांना खाऊ देत नाहीत. मारतात.या सर्व वाढत्या पिलांना आपणास खुराकद्यायचा असल्याने त्यांना वयानुसार वेगळ्या कप्प्यात ठेवणे आवश्यक आहे.
- वितांना आई मृत झाल्यास पिलांना दुसऱ्या शेळीचे दुध पाजावे अश्या वेळी दुसऱ्या शेळीचे मागचे पाय उंच धरून ठेवावे.
- सुरवातीचा चिकपाजणे आवश्यक. किंवा गाईचे दुध
- बाटलीने पाजावे. वजनाच्या १० %. रोज
- पिलांना दुसऱ्या महीन्यात खच्ची करून घ्या.



पिलांचे घरातील नोंदी

- पिलांची जात, लिंग, जन्मतः वजन , एक आठवड्यानंतर वजन . एक महीन्यानंतरचे वजन, दोन ,तीन,चार ते सहा महीन्यापर्यंत दरमहा वजन.
- दरमहा वाढीचा तक्ता. प्रतिदिन वाढीचा दर ... वजन /३० दिवस
- दुध तोडण्याची तारीख. खुराकीचे प्रमाण .
- सहा महीन्यात येणारे वजन , एकंदर खर्च,
- खच्चीकरण केल्याची तारीख, दरमहा प्रतिजैविके,औषधे दिल्याची , जंतनाशक दिल्याच्या तारखा. एकंदरीत वाढ. वाढीचा दर इत्यादि. इतर काही विशेष नमुद करण्यासारखे.
- शेरा,,, निवड ,,,

कच्च्याचे व्यवस्थापन ९४



दर चार महीन्यात खत तयार होते. दुसरा खडडा भरेपर्यंत पहील्या खडड्यातील खत विक्रीस लावावे.

कचरा पेटी शेळीघराच्या दुर असावी. त्यात रोजचे लेंडया, उरलेला वापरण्या योग्य नसलेला चारा, तळावरील तणीस इत्यादि घालावे. पावसाळ्यात त्यावर चुन्याची फक्की घालावी. कचरा पेटीत दोन कप्पे असावेत. एक भरल्यावर त्यात गांडुळ सोडावे. गांडुळ खत तयार करावे. सदर उत्कृष्ट खत उत्तम दरात विकता येते.

मलमुत्राचे व्यवस्थापन९५

- शेडमध्ये कढलेल्या नाल्यातुन मुत्र एक मोठ्या टाक्यात जमा होईल.
- त्यापासुन एक छोटा सिमेंटच्या टाक्यातुन शेडच्या सभोवताली असलेल्या झाडाझुडपांना पाणी घाला. सदर मुत्रात गाईच्या शेणखतापेक्षा तीन पट जास्त शक्ती असल्याने ते पाण्यात मिश्रण करूनच वापरावयाचे आहे. अन्यथा झाडे जळुन जातील. सदर मुत्र पाईपच्या सहाय्याने दुरवर झाडाझुडपा पर्यंत पोचण्यासाठी रबरी पाईपचे सहाय्य घ्यावे.
- लेंड्या पुर्ण सुकल्यानंतर त्याची पावडर करून शेतात टाकल्यास तीन वर्षे खत देण्याची जरूर भासत नाही.
- त्याचे चांगल्या पाक्रीटात खत म्हणुन विकल्यास शहरात चांगला दर मिळतो. बंगल्यात किचन गार्डन मध्ये वापरण्यास उत्तम.

मृत जनावरांची विल्हेवाट

९६

- जनावरे ,लहान करडं मृत झाल्यास ..गर्भपात झाल्यास .
- गर्भ.शेडच्या दुर एकछोटा २ X २ फुटाचा खड्डा घ्या. त्यात खाली चुना फक्की घाला. त्यावर शव ठेउन त्यास चुन्याने झाकुन घ्या नंतर मातीने झाका.
- शव कवळे ,कुत्री यांनी फाडु नयेत. असेच उघडयावर टाकुनका.त्यामुळे आपल्याच परिसरात रोग पसरण्याची भिती टाळता येते.
- शेडमध्ये नेहमी चुन्याचा वापर करा. चुना आद्रता शोषक आहे. चुन्यामुळे सर्व जिवजंतु मरुन जातात.पावसाळयात तळावर चुना फक्की मारावी.
- पावसाळयात एक प्लास्टीकच्या कपडावर शव ठेउन त्यावर चुना घालावा आणि त्यावर चुना फक्की घाला.

शेळीपालनातील महत्वाचे वापरण्यात येणारे घटक ..९७

- चुना... फक्की ,,, याने १) आर्द्रता शोषली जाते.२) सर्व जीव जंतु मरतात.
३) शव लवकर मुरते. पावसाळ्यात तळावर पसरावे . शेडच्या भिंती दर तीन महीन्यात चुन्याने सारवाव्या. क्वरा घरात नेहमी चुना घालावा. मृत जनावरे पुरतांना चुना खालीवर घालावा. खाद्याच्या , पाण्याच्या भांडयांना आतुन चुना लावावा.
- खाण्याचा सोडा...हिरव्या चान्यात लसुण गवत असल्यास ते आवडीचे खाणे म्हणुन क्वही शेळ्या लसुण गवतच खातात. त्यामुळे जादा प्राथीने पोटात गेल्यावर अँसीड तयार होउ शक्ते. या अँसीडला निकामी करण्यासाठी हिरवा चारा गव्हाणीत टाकल्यावर त्यावर मुठभर खाण्याचा सोडा रोज मिसळावा.
- व्हाईट सिमेंट... ब्रॅक, चीरा, फटीमध्ये तत्कळ लावणेसाठी.

शेळीपालनातील महत्वाचे वापरण्यात येणारे घटक ..९९

- **स्प्रे...खारसोलीन** .. हा स्प्रे शेडच्या आत आणि शेडच्या बाहेरही मारता येतो. रोगाची लक्षणे दिसल्यास आणि पावसाळ्यात , पुर्वीही हा स्प्रे शेडमध्ये मारावा. ह्या मुळे शेडमधील जिवाणु आणि विषाणु मारले जातात . शेळ्यांना याची इजा पोचत नाही.
- **फॉर्मॅलीन** ...हा स्प्रे शेडच्या आत बाहेर मारता येतो.याचा उग्र वासामुळे नाक व डोळे जळजळ करतात. हा १०% इतक़ वापरावा.
- डैटॉल,फिनाॅल ,पोविडॉन आयोडीन . शेड धुणे करीता पाण्यात मिसळुन .
- फूल्बाथ मध्ये पावसाळ्यात स्प्रे करणेसाठी ...किंवा नेहमी वापरणेसाठी.

शेळयांमधील लसीकरण...९८

- आपला प्रकल्प बंदीस्त असल्याने , रोग प्रतिबंधकसर्व कळजी घेतल्याने , स्वच्छ पाणी , पौष्टीकचारा दिल्याने , सर्व ऋतुत हवामानाच्या बदलानुसार कळजी घेतल्याने कुठलाही रोग होण्याचा संभव नसतो.
- हवामान बदलाचा कडांतर मोठ्या शेळयांवर परीणाम होतो. अशा वेळी म्हणजे माहे **ऑक्टोबर** (थंडी सुरु होते) माहे **जानेवारी** (थंडी कमी होउन उन्हाळा सुरु होतो आणि माहे मे अखेर (पावसाळ्याच्या सुरवातीला हवामानातील बदलाने ताण येतो.) सर्व जनावरांना ४ दिवस प्रतिजैविके दिल्यास कुठलाही रोग होण्याची , पसरण्याची चिंता राहात नाही. **प्रकल्पाच्या सुरवातीला दोन वर्षे पी.पी.आर ची लस प्राथमीकतेने सर्वाना टोचुन घ्यावी.**

नेहमी वापरावयाच्या औषधी १००

- **जंतनाशक** ... आयव्हरमेक्टीन ..इं. १ मिली कतडीखाली दर तीन महीन्यातुन एकदा. गोळ्या हायटेक सिंगल डोज.
- क्लोक्सेल... वरीलप्रमाणे
- **प्रतिजैविके** .. जिवाणु ,विषाणु मारणेकरीता...४ दिवसांचा कोर्स
- एनरोसीन, सिप्रोफ्लॉक्सीन , अॅम्पीसीलीन , अॅम्पीसीलीन + क्लॉसीसिलीन , टेद्रासायक्लीन , जेंटामायसीन इत्यादि.
- एकदा कुठल्याही रोगाची लक्षणे दिसणे सुरवात झाल्याबरोबर चार दिवस.
- किंवा रोग होउ नये म्हणुन पावसाळ्याच्या ,हिवाळ्याच्या सुरवातीला.
- लहान करडांना दरमहा ४ महीनेपर्यंत. ४ दिवस वेगवेगळे प्र. वापरा.

मेडीसीन किट१०१

- जखमांना बरे करण्यासाठी स्प्रे. जखमांना लावण्यासाठी हिमॅक्स, लोरेक्झीन मलम ,टॉपीक्युअर स्प्रे. कसेच्या रोगासाठी पेंडीस्ट्रीन. फ्युरीया बोलस.
- गोळ्या ... ऑक्सीटेट्रासायक्लीन , सल्फाडायमीडीन ,ओरीप्रीम.
- फ्युरीया बोलस गर्भाशयात घालणेसाठी.
- लोमोटील ,लोमोफेन गोळ्या ...हगवणीसाठी , सल्फाडायमीडीन .
- एक्झोरा..मलम ... कतडीच्या रोगांसाठी.
- ग्लुकोज सलाईन ,,, हगवणीसाठी पाण्याची भरपाई म्हणुन.
- टरपेंटाईन, जखमा साफ करणेसाठी. जखमेवर मारण्याचा टॉपीक्युअर स्प्रे.
- चिमटे, कत्र्या, कपुस, टीक्चर आयोडीन बँडेज पट्टी इ.
- बेबी कॅस्ट्रेटर ... जादाचे करडं खच्ची करणेसाठी .

रोग आणि नियंत्रण१०२

- रोग होण्याची कारणे
- अस्वच्छता, गर्दी ,दमट वातावरण , वातावरणात होणारे अचानक बदल.
- जास्त चारा... पोटफुगी. ओले होणे ,मातीमुरमाचा तळ.लाकडी तळ.
- रोगट शेळया न ओळखणे. त्यांना दुर्लक्षित ठेवणे.औषधोपचार न करणे.
- शेळी गाभुळल्यास तीची तत्काळ स्वच्छता न करणे ,गर्भाची विल्हेवाट व्यवस्थित न लावणे. शेड न धुणे , पावसाळयात शेडमध्ये आणि बाहेर १० फुट पर्यंत स्प्रे न मारणे .
- हिवाळयात पिलांची कळजी न घेणे.थंडीपासुन बचाव न करणे .

रोगाची कारणे १०३

- खुल्या जागेवर सोडल्याने शेळ्यांना रोग होण्याचा जास्त संभव असतो.
- कारणे ,,, रोगट शेळ्यांच्या संपर्क.
- मलमुत्रातुन रोगाच्या जिवाणुचा संसर्ग ,त्याची जमीनीत वाढ होणे.
- लागण झाल्यावर सर्व शेळ्यांमध्ये पसरणे .
- क्वही शेळ्या रोग दाखवित नाही पण त्या रोग बरेच दिवस शरीरातच साठवतात. त्यामुळे अशा शेळ्याया मलमुत्रातुन रोगाच्या जिवाणुचा संसर्ग होतो. संपर्कनेही रोग फैलावतो. म्हणुन त्या बंदीस्त कराव्या. गोठ्याचा तळ नेहमी फरशी अथवा कँक्रीटचा असावा. धुता येण्यासारखा असावा. त्यावर पाचसाळ्यात खारसोलीनचा स्प्रे दिवसाआड मारावा.

रोग प्रतिबंधक उपाय १०४

बंदीस्त शेळीपालन ..

बंदीस्त शेळीपालनात बहुतेक सर्व रोगांवर आपण नियंत्रण ठेऊ शकतो..स्वच्छता., पावसाळ्यात स्वच्छता अधिक ठेवावी. शेडमध्ये आणि शेडच्या बाहेर १० फुट खारसोलीनचा स्प्रे आठवड्यातून तीनदा करावा. पावसाळ्याआधीच त्यांना जंताचे औषध द्यावे, सुरवातीला दोन वर्षे तरी पी.पी.आर लसीकरण करावे. पावसाळ्यात भेटी देणाऱ्या लोकांवर नियंत्रण असावे. फुटबाथ मध्ये पोवीडॉन आयोडीन नेहमी असावे. त्यात पाय बुडवूनच सर्वांनी आत प्रवेश करावा.

..... विशेष ::::१०५

- शेळयांना सर्व रोगांची कारणे म्हणजे ... रानात फिरावयास नेणे होय.
- शेडमध्ये स्वच्छतेची काळजी घेतल्यास , कोणतेही रोग येण्याची सोय नाही.पिलांची योग्य वेळी योग्य ती काळजी घेतल्यास पिलांची मरतुकही रोखता येते.
- कलामानाप्रमाणे सर्व रोगांची लक्षणे कमी प्रतिची दिसुन येत आहेत.
- ज्या प्रमाणात पुर्वी शेळयांची मर होत असे, त्या प्रमाणात सध्या बरीच घट झालेली आहे. त्यामुळे शेळीपालनातील रोगराईची भीती कमी झालेली आहे. पौष्टीक चारा , गर्भार शेळयांची देखभाल , स्वच्छ चारा ,पाणी स्वच्छता इ. नियमीत ठेवल्यास रोगापासुन मुक्ती मिळविता येते.

..... विशेष ::::१०६

- आपण कहीतरी नवीन करतो आहोत , तांत्रिक पद्धतीने करतो आहोत . हे विसरु नका . आपल्यास सल्ला देणारे खुप लोक सापडतील . प्रत्येक सल्ला चांगला वाटला, तरी तो दहा वेळा मनाला विचारुन विस्तृत सत्यतेत उतरवावा याची धारणा पक्की करा नंतरच अमलात आणा . तो आपल्या अनुभवावर तपासुन बघा .
- कोणताही बदल करतांना तपासुन , त्यामागचे शास्त्रीय कारण तपासल्या नंतरच अमलात आणा . आजकल मोफत सल्ला देणारे अमाप सापडतात .
- अभ्यास करा . नंतरच निर्णय घ्या .

GOAT DISEASES१०७

शेळ्यांचे रोग..प्रतिबंधकउपाय...

- बंदीस्त शेळीपालनात बहुतेक सर्व रोगांवर आपण नियंत्रण ठेऊ शकतो.
- स्वच्छता. पावसाळ्यात स्वच्छता अधिक ठेवावी. शेडमध्ये आणि शेडच्या बाहेर १० फुट खारसोलीनचा स्प्रे आठवड्यातून तीनदा करावा.
- शेड लाकडी असेल तर सर्व ठिकणी चुना मारावा. सुकलेल्या चान्याचा जादा वापर करावा. खुराक वाढवावा. शेडमध्ये पावसाचे पाणी येणार नाही असे बघावे.
- पावसाळ्या आधीच त्यांना जंताचे औषध द्यावे,
- मे अखेर मान्सूनपूर्व सर्व जनावरांना पी.पी.आर लसीकरण करावे.
- पावसाळ्यात भेटी देणाऱ्या लोकांवर नियंत्रण असावे.
- फुटबाथ मध्ये पोवीडॉन आयोडीन नेहमी असावे. त्यात पाय बुडवूनच आत प्रवेश करावा.

शेळयांची पावसाळयात घ्यावयाची कळजी ..१०८

- शेळया पावसात भिजु देउ नये. त्यांना लगेच निमोनिया होतो.पावसाचे पाणी आत येणार नाही यासाठी प्लास्टीकचा पडदा लावा.
- पावसाळयात हवामान बदलते शेळयांवर ताण येतो. मे अखेर त्यांना जंतनाशकचा डोज देणे आवश्यक ..
- मान्सूनपुर्व त्यांना पी.पी.आर लसीकरण सुरवातीला करणे आवश्यक.
- पावसाळा सुरु झाल्याबरोबर सर्व जनावरांना चार दिवसाचा प्रतिजैविकचा डोज देणे आवश्यक .विशेषतः ४ महीनेपर्यंच्या पिलांना.दरमहा सुक चान्याचा साठा आधीच करणे आवश्यक . हवामानातील बदलास साजेल असा थोडा खुराकदेणे आवश्यक.

शेळयांची पावसाळयात घ्यावयाची कळजी ..१०९

- उन्हाळयात जादाचा लसुण घास सुकवुन ठेवा.साठा करुन ठेवा.
पावसाळयात ओल्या गवतापेक्षा पुर्णतः सुका चारा देणे अधीकचांगले.
चारा नेहमी तपासुन घ्या. त्यात बुरशीचा वास यायला नक्रे.
- हवामानातील जादा आद्रतेमुळे तळावर न सुकलेल्या मलमुत्राचा वास
त्यांच्या नाकत खवखवतो , त्यांना सर्दी होण्याचे संभव जास्त असतो.
- तळावर पावसाळयात शेडमध्ये ओलावा असु नये यासाठी उपाय करावेत.
- गव्हाचे ,धानाचे ,तणीसाचे आवरण घालावे. दर आठवडयात /पंधरा
दिवसात बदलावे. गोठयात जादा हवा खेळती राहिल यासाठी मोठे
एक्सॉस्ट फॅन बसवावे. मचान बनवावे, त्यामुळे उग्र वासाचा त्रास होणार
नाही.

शेळयांची पावसाळ्यात घ्यावयाची कळजी ..११०

- पाणी ...पावसाळ्यात गढुळ पाणी असणे आलेच. पिण्याचे पाणी स्वच्छ असणे आवश्यक . असा गढुळ पाण्यात तुरटी फिरवुन घेणे आवश्यक .
- सकाळी रात्रीचे पाणी फेकून द्या. ताजे पाणी भरा. आवश्यक वाटल्यास थोडे पोटॅशियम परमँगनेट घाला.
- पिलांची विशेष कळजी घ्या. त्यांच्या हालचालीकडे लक्ष द्या. पिलांना लवकर रोग होतो. तो पसरु नये याची कळजी घ्या.त्यांना प्रतिजैविकाचा चार दिवसाचा डोज द्या.पावसापासुन बचाव करा. तळ नेहमी ओला राहणार नाही असा उपाययोजना करा.शेडमध्ये कही वेळ बसा. निरीक्षण करा.आजारी पिलांना वेगळे ठेवा. औषधोपचार करा.

शेळयांची पावसाळ्यात घ्यावयाची कळजी ..१११

- शेळयांच्या , पिलांच्या आजारपणाची करणे शोधा. शोधुन पक्क़ विश्वास करा. तशी उपाययोजना करा. ती करणे पुन्हा पुन्हा चुका होणार नाहीत याची कात्री करा. एक्सॉष्ट फॅन बसवा. उग्र वासाची कळजी घ्या.
- मंरतुक , शवांची , कवऱ्याची अचुक विल्हेवाट लावा. कवरा शेडपासुन दुर असलेल्या खड्ड्यातच टाका. त्यावर नेहमी चुना घाला.मृत्यु झाल्यास खोलवर पुर्ण चुन्याने माखुन पुरा.
- थोडीशीही टाळाटाळ जादा फटक़ देउ शक़ते. आपण जीव पाळतो आहोत याची जाण ठेवा.

शेळयांची हिवाळयात घ्यावयाची कळजी ..११२

- हा ऋतु उत्तम असतो. जादा थंडीत पिलांची कळजी आवश्यक.
- हिवाळयात शारीरीक वाढ वेगाने होते. त्यामुळे या कळात चांगला चारा , चांगला खुराक देणे महात्वाचे. चान्याचे चार पाच वेगळे प्रमाण करून खाउ घालावे सर्वांची नोंद करून वाढीचा वेग तपासावा. आपले रेकॉर्ड तयार करावे. पिलांना दरमहा प्रतिजैविके ४ दिवस द्यावी. ४ महीनेपर्यंत.
- या ऋतुत जास्तीत जास्त शेळया फळवाव्या. त्या फळतील अशी उपाययोजना करावी. त्यांना यासाठी जादाचा खुराक, खनीज मिश्रण द्यावी. पौष्टीक चारा द्यावा.


આજારી શેઠયા ઓઠખણે . . . ૧૧૩



કોપન્યાત શાંત બસુન રાહતે, ચારા ખાત
નાહી ,પાણી પિત નાહી, શેપટી ખાલી
અસતે,હગવણ લાગલેલી અસેલ તર
શેપટીખાલીલ ભાગાસ પાતઠ વિષ્ટા
ચિકટલી અસેલ.

રક્તમિશ્રીત અસેલ તર
તઢાવર દિસતે.

નિરીક્ષણ કરા..ઉપાય શોધા.



आजारी शेळ्या ११४



चित्रातील शेळीची तब्येत बघा.
अशी शेळी तत्काळ काढून टाका.

शेळी काटकप्रवृत्तीची आहे.ती सहज रोग दाखवित नाही ,अंगावर काढते. त्यामुळे रोगाच्या लक्षणाची वेळीच दखल घेणे आवश्यक आहे.

चारा पाणी ,रोग प्रतिबंधक उपाय वेळोवेळी बरोबर असल्यास रोग होणार नाहीत. आपल्या प्रकल्पात चांगल्या शेळ्या नसल्यास काढून टाका. त्यामुळे रोग पसरतो

शेडमधील स्वच्छता... ११५



शेडमध्ये अशी घाण साचली
असेल तर खरेच रोगराईला
निमंत्रण मिळणार नाही काय?
शेडमध्ये असे काही होऊ देऊ
नका. नेहमी स्वच्छता
ठेवा. स्वच्छतेमुळेच रोगराईची
भिती नष्ट होते.
खारसोलीनचा फवारा मारा.

अशुद्ध पाण्यामुळे होणारे रोग... ११६

- ब्रुसेल्ला... अँबॉरशन..गर्भपात.
- ई क्रेलायटीस ..सतत हगवण ...लिव्हर डॅमेज.
- जंत ...चपटे जंत ...पाण्यात असलेल्या गोगलगाईमुळे
- अनेक रोग... रोगट जनावरांनी एकरच ठिकणी पाणी पिल्यामुळे
- फैलावणारे सांसर्गीक रोग...ब्ल्यु टंग , पी.पी.आर . देवी,एक्थायमा.
- पावसाळ्यात पायांना चिखल्या, फुट रॉट , निमोनिया.आंत्रविषार. हगवण.
- तळ मातीमुरुमाचा असल्याने कॉक्सीडीओसीस. कासेचे रोग.
- पिलांची मरतुक जास्त.

शेळयांचे रोग.....११७

..... आंत्रविषार **ENTEROTOXEMIA**.....

शेळयांना चार पोट असतात ,रवंथ करण्याची देणगी निसर्गाने दिल्याने खुप खाउन नंतर त्या चावत असतात. हा रोग पावसाळयात जास्त होतो. मुबलक हिरवा चारा एकाच वेळी जास्त खाल्ल्याने पोटपुर्ण भरते . साधारणतः पोटात असलेले या रोगाचे जंतु (*clostridium perfringens*) हे विना ऑक्सीजनने वाढतात. पोट गच्च भरल्यामुळे त्यात हवासुध्दा नसते आणि हे हवेशिवाय जगणारे जंतु भरमसाठ वाढीला लागतात. ते विष सोडतात.या विषामुळे शरीरातील कीडनी निक्रमी होते, हगवण लागते , आणि कधी तासातच शेळी मरते. या रोगामध्ये उत्तम तब्येत असलेली जनावरेच जास्त ४ तासात मरतात.

शेळयांचे रोग..... ११८

..... आंत्रविषार **ENTEROTOXEMIA**.....

पावसाळयात जिकडे तिकडे हिरवे गवत उगवते. उत्तम बांध्यांच्या शेळया दुसऱ्या शेळयांना ते खाण्यास जवळ येऊ देत नाहीत त्यामुळे जमेल तेवढे पोट गच्च भरेपर्यंत त्या खातात. पोटात जागा नसल्याने आंत्रविषार रोग तयार करणारे जंतु विष सोडतात. आणि चार तासात हगवण लागल्याने जनावर मरते.

❖ बंदीस्त शेळीपालनात आपण चारा दोन वेळा विभागून दिल्याने गच्च पोट भरून हा रोग होण्याचा संभव नाही. त्यामुळे बंदीस्त शेळीपालनात या रोगाचे लसीकरण करून घेण्याची आवश्यकता नाही.

शेळयांचे रोग... पी.पी.आर.....११९

- हवामानातील बदल,चाऱ्यातील बदल , मोकळ्या सोडल्याने इतर लागण झालेल्या शेळयातील संसर्गामुळे हा रोग होतो.
- बंदीस्त शेळीपालनात इतर रोगट फर्ममध्ये भेट देउन आलेल्या लोकांमुळेही हा रोग फैलावु शकतो. सहसा या रोगाची शक्यता जास्त. परंतु पावसाळ्याआधी आपल्या फर्मवर पी.पी.आर या रोगाची लस लावा जंतनाशकचे औषध दिल्यानंतर लावावी. ही लस पहाटे किंवा सुर्या स्तानंतर थंड वातावरणात ,बर्फाच्या आवरणातच असावी. तीन महीन्याच्या वरील सर्व जनावरांना सदरहु लस लावण्यात यावी.
- सध्या या रोगाची तिब्रता फर कमी झालेली आहे. त्यामुळे जादा जनावरे दगावण्याची शक्यता कमी आहे.

पी.पी.आर क्वही रोगग्रस्त जनावरांची चित्रे... १२०



तोंडात, ओठावर, वरच्या जबड्यावर फोड येणे
हगवणीने त्रस्त होणे. लाळ गळणे. डिहायड्रेशन
होणे.



शेळ्यांचे रोग...कातडीचे रोग लाकडी घरांमध्ये...१२१



→ पिसवा ,
कातडीचे
रोग



शेळयांचे रोग...कतडीचे रोग ...१२२



लाकडी घरांमध्ये नेहमी
जंतुनाशकाचे फवारणी न
केल्यास उवा , लिखा,
गोचीडयांचे जास्त
प्रमाण वाढते.हे सर्व
शेळयांचे रक्त पितात.
लाकडाच्या फटींमध्ये
लपुन बसतात. .

शेळयांचे रोग... देवी, तोंडावर कळया पुटकुळया येणे १२३



तोंडावर फोड येणे
Contagious
ecthyma ,
pox

शेळयांमधील सर्वसाधारण रोग १२४

- जिवाणुंनी होणारे रोग... आंत्रविषार.. Enterotoxemia
पावसाळ्यात जास्त हिरवे गवत खाल्ल्याने. पोटफुगी झाल्याने.
- धनुर्वात...tetanusजखमा असल्यावरच ..जखमा मधुनच हा रोग पसरतो.
- रक्ती हगवण ... Coccidiosis.मातीचा तळ असल्याने
- घटसर्प...तीवा.... Haemorrhagic septicaemia.
- गर्भपात...अॅबॉरशन. Abortion.
- ... फुप्फुसदाह ..निमोनिया...
- स्तनदाह ... mastitis, Metritis..गर्भाशयाचे रोग

शेळयांमधील सर्वसाधारण रोग ... १२५

- विषाणुंमुळे होणारे रोग...पी.पी.आर. गर्भपात.
- निलजिह्वा... Blue tongue
- देवी ...Goat Pox.
- तोंडखुरी पायखुरी ...Foot & mouth disease.
- Contageous Ecthyma. देवीसारखाच फक्त तोंडावर
- चयापचयामुळे होणारे रोग.. अपचनाचे रोग...
- हगवण ,निमोनिया, ताप येणे. खोकणे जंतामुळे.

सर्वसाधारण होणारे.... १२६

- बाह्य किटक .. कतडीवरील बाह्यकिटक ... लिखा, पिसवा ,उवा. गोचीड
- फटी ,चिरा,भेगा बुजवणे, त्यास नेहमी चुना मारणे. म्हणजे होणार नाहीत.
- रक्तातील कृमी ... कॉक्सीडीौसीस. एनाप्लाझ्मा, बॅबेशिया.इ.
- स्वच्छता, रोग प्रतिबंधकउपाय करून हे रोग टाळता येतात.
- पोटाच्या आतील कृमी
- गोल कृमी ..Round worms ..चपटे जंत..flat worms
- यकृत जंत.. Liver fluiks..फुफ्फुसातील , किडनीतील जंत .
- स्वच्छ पाणी आणि बाहेर न सोडल्याने आजारी जनावरांचा संसर्ग टाळल्याने हे रोग टाळता येतात.

शेळयांचे रोग ... क्लामेडिओसीस क्वचीत होतो.१२७



पायाचे गुडघे सुजतात, डोळे बाहेर येतात कधीकधी निकामी होतात.

शेळयांचे रोग...अँथ्रक्स , घटसर्प , धनुर्वात...१२८

- हे सर्व जिवाणुंचे रोग रानात चरणाऱ्या जनावरांना होतात.
- एकाच तळ्यातील वर्षोनवर्षे साचलेल्या अशुध्द पाण्यामुळे प्रचंड ई कोलाय , त्यामुळे हगवण जंत, तलावात, शेजारी असणाऱ्या गोगलगाईमुळे लिव्हरफ्ल्युक, चपटे जंत फिरणाऱ्या जनावरांमध्ये जास्त होतात. शेणावाटे , लघवीतुन हे सर्व बाहेर फेकली जातात , त्याची लागण सर्वांना होते.
- बंदीस्त शेळीपालनात स्वच्छता , शुध्द पाणी , उत्कृष्ट पौष्टीक चारा , ऋतुबदलाप्रमाणे व्यवस्थापन यामुळे बंदीस्त शेळीपालनात रोग होण्याची शक्यताच नसते.

शेळ्यांचे रोग...करडांमधील मरतुक ...१२९

- शेळीपालनात सर्वात जास्त मरतुक ही करडांमध्ये होते.
- करडांना शारीरीक क्षमता, रोग निवारकशक्ती कमी असल्याने त्यांना रोग लवकर होतात.
- कारणे ,,, कमी दुध मिळाल्याने , कमी पौष्टीकचारा मिळाल्याने , रानात चरणान्या शेळ्यांनी अस्वच्छ पाणी पिल्याने, तेच पाणी दुधात रुपांतरीत झाल्याने , हवामानात झालेल्या बदलाने , जास्त वेळ हाताळल्याने , रोग होण्याची शक्यता बळावते,
- बंदीस्त शेळीपालनात या सर्व बाबी कटाक्षाने पाळल्यास , थंडीपासुन बचाव केल्यास , पावसापासुन बचाव केल्यास, योग्य खुराक दिल्यास. दरमहा चार दिवस प्रतिजैविके दिल्याने कुठल्याही रोगाची भीती नसते .

शेळयांचे रोग... सर्वसाधारण लक्षणे हगवण ...१३०

- **कारणे** ...हवामानातील बदलामुळे , जंताचा प्रादुर्भाव वाढल्याने
- ज्यादा हिरवे गवत खाल्ल्यामुळे. बुरशीयुक्त चारा खाल्ल्यामुळे .
- पिल्लांमध्ये ... दुध जादा पिल्यामुळे , हिरवे गवत जादा खाल्ल्याने.
- रोग.. **हगवण**...पी.पी.आर , आंत्रविषार रोगांमध्ये., ब्लु टंग रोगामध्ये, निमोनिया आणि हगवण साधारणतः होते.जंत झाल्याने शेळयांची कतडी निस्तेज दिसते. **डिहायड्रेशन** ,,,कतडी ओढुन पाहील्यास ती पुर्ववत होण्यास वेळ लागतो.
- शेळी ,करडं आजारी असल्याने खात ,पित नाहीत . एकर कोपऱ्यात शांत बसुन असतात, त्यामुळे डिहायड्रेशन होते.आणि दगावते.पाणी द्या.

हगवणीवर उपायडिहायड्रेशन....१३१

- ✓ शेळयांना ,करडांना पाणी देणे.साध्या सिरींजने पाणी पाजल्यास बराच वेळ लागतो. अशा वेळी ... एका छोट्या बादलीत लिटर पाणी घ्या . त्यात मुठभर साखर घाला. त्यात एनरोसीन २० मिली घाला, त्यात थोडे मिठ घाला. (किंवा रिहायड्रेशन मिक्चर पुडे घाला.)साधी स्वच्छ धुतलेली आय व्ही टयुब बादलीत पाण्यात घाला. बादली उंचावर धरा. आय व्ही टयुबचे दुसरे टोक शेळीच्या तोंडात जबड्याच्या बाजुला ठेवा. पाणी आय व्ही टयुब चा बल्ब दाबुन सुरु करा. (यासाठी माउथ मास्क वापरा.) पाणी सुरु केल्यानंतर शेळीस ठसकर लागणार नाही याची काळजी घ्या.ठसकर लागत असेल तर आय व्ही टयुब काही वेळेपुरती काढुन घ्या नंतर पुन्हा सुरु करा. पुर्ण पाणी पोटात गेल्यास शेळी पाच मिनिटात उभी राहते. तीला बेलामिल इं .५ मिली द्या. मकर सोया भरड द्या.लोमोटील च्या दोन गोळ्या ४ दिवस द्या.

आरोग्याची तपासणी...१३२

- शेळीला आजार झाल्याची चिन्हे दिसताच , ताप आला असल्यास चटकन कोणतीही प्रतिजैविके ४ दिवस तोंडावाटे किंवा मासात द्यावी.
- कनाच्या बूडाला गरम लागल्यास शेळीला ताप आला आहे हे ओळखा.
- खोकणे ... म्हणजे जंत किंवा श्वसनाच्या प्रक्रियेतील अडथडा.
- लक्षणे दिसल्यास हे कशापायी घडले असावे याची माहीती घ्यावी ते दुर करण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व कप्प्यात स्प्रे मारुन घ्या.
- तत्काळ उपाययोजना केल्यास रोग बळावत नाही फैलावत नाही.
- पी.पी.आर लस सुरवातीला दोन वर्षे लावावी. चांगली स्वच्छता असल्यास ,रोग प्रतिबंधक व्यवस्थापन असल्यास लस लावण्याची गरज नसते.

निकमी शेळया , . . . १३३

- वयस्क, आजारातुन बऱ्या झालेल्या , ४ वर्षे पेक्षा जास्त कळपात असलेल्या शेळया, नेहमी कळपातुन कऱुन टाकणे गरजेचे आहे.
- आजारातुन बऱ्या झालेल्या शेळया पुन्हा तेवढेच उत्पादन देतील याची शक्यता कमीच असते.
- कमी करडं देणाऱ्या , वारंवार उलटणाऱ्या , न फळणाऱ्या , अंगात न भरणाऱ्या , दोन वेतातील अंतर जास्त असणाऱ्या शेळया दरसाल कऱुन टाकव्या. दरवर्षी २० % निकमी शेळया कऱुन टाका.
- दर दोन वर्षांनी फळविणारे नर कऱुन टाकावे ,नवीन उत्तम नर घ्यावे.
- आई मुलाचा , बहीण भावाचा संकर कधीच होउ देउ नका.

नवीन मादी पिलांची निवड... १३४

- उत्तम वाढ झालेली, वजनात असलेली, करड मुलभुत कळप म्हणुन घ्या.
- ज्यांच्या आईने तीन चार करड दिलेली आहेत अशीच मादी पिले निवडा.
- आपल्या प्रकल्पात होणाऱ्या नरामधुन नर निवडायचा नाहीच.
- आपल्याकडे उपलब्ध नोंदीमधुनच जी मादी प्रमाणात बसत असेल अशीच निवडा. चांगली वाढ
- आजारीपणा नसलेली.६ महीनाअखेर २० ते २२ किलो वजन असणारी.
- उत्तम बांध्याची मादी पिले आपल्या मुलभुत कळपासाठी राखुन ठेवा.

प्रकल्प ... अहवाल...१३५

- प्रकल्प ... अहवाल तयार करतांना ...हव्या असलेल्या बाबी...
- १) शेळीपालनाचा सविस्तर समजण्याजोगा अहवाल.
- २) तांत्रिक ... १० वर्षांचा वाढीचा तक्ता, यात होणारी करडे ,मरतुक, विक्रीस येणारी करडे , त्याचा तांत्रिक बाबींनी केलेल्या अभ्यासासह.
- ३) प्रकल्पात दरसाल होणाऱ्या पिलांसह होणारा खाद्याचा खर्च .
- ४) होणारा विमा , दर दोन वर्षांनी बदलणारे नर , व्यवस्थापनाचा खर्च.
- ५) विक्री ..जादाची पिले विक्री, निक्कमी माद्या विक्री, खत विक्री.
- ६) जमा आणि वजातीचा तक्ता. बँक कर्ज , परतफेडीचा तक्ता
- ७) .,चाऱ्यासाठी लागणाऱ्या जमीनीचा तक्ता., शेडचा खर्च एकुण खर्च ,, त्यात उपकरणे , पगार, खाद्याचे अग्रीम इत्यादि.

प्रकल्प ... अहवाल... १३६

बांधकामे Fix Assets	चालु खर्च current assets
पाण्याचा खर्च व्यवस्थापन मुख्य टाकी	शेळ्या खरेदी ,नर खरेदी
कर्मचाऱ्यांसाठी घरे.शेडचे बांधकाम	खाद्य ..फिरवा चारा, कोरडा चारा ,खुराक
कार्यालय,विजेचा खर्च	व्यवस्थापनाचा खर्च पगार.
खाद्याची ,पाण्याची भांडी	विज,पाणी बिले.
उपकरणे कार्यालयाचा खर्च टेबल,खुच्या	औषधी, खुराक साठवण
औषधी रोज लागणारी	शेळ्या नर विकत घेणे
खुराक साठवीणे वर्षासाठी मक्क,सोया	डागडुजी खर्च चुना, स्पे करण्यासाठी द्रव
हिरवा चारा लागवड खर्च	पेट्रोल , प्रवास,
खाद्याचे कोठार	इतर आनुशंगिक खर्च रनींग कॅपीटल

:::: प्रशिक्षण ::::१३८

- शेळी हा जिवंत प्राणी आहे. त्यास सर्वप्रथम माणसाळलेले आहे. त्यास उद्योगाचे स्वरूप देतांना त्यातील सर्व बाबींची खोलवर माहीती जाणुन घेतल्याखेरीज नफ़ मिळविता येत नाही. छोटया छोटया चुक़ तुम्हास मोठा फ़टक़ देउ शक़्तात. त्याचे तंत्र पुर्णतः शिकुन घेण्यासाठी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. एकर दिवसाचे शिबीर.

• प्रशिक्षणासाठी दुरध्वनी संपर्क .

- डॉ. गोविंदराव लोखंडे , माजी उपआयुक्त पशुसंवर्धन
- जी ६०६ आक़शगंगा ,शिवराज नगर ,रहाटणी पुणे १७
- फ़ोन ... ९८५०२४०८१४ , ९५६११२४३३०.



धन्यवाद!!!