

शेळीपालनाची दिशा बदला

शेळी हा प्राणी छोटा दिसत असला तरीही 'मूर्ती लहान, कीर्ती महान' या उक्तीप्रमाणे शेळीकडून आलेल्या संधीचा फायदा करून घ्यावा लागेल. त्यासाठी शेळीपालनाला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. या व्यवसायातील कमकुवत बाजू समजावून घेऊन तेथे योग्य तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य, शासकीय धोरण आणि विक्री व्यवस्था यांचा मेळ घातला तर शेळी सर्वानाच श्रीमंत करेल.

डॉ. भास्कर गायकवाड

ज्याप्रमाणे १९७० नंतर संकरीकरण आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुग्ध व्यवसायामध्ये धवलक्रांती झाली. अशाप्रकारे शेळी व्यवसायाला पुढे घेऊन जाणारे एकात्मिक पद्धतीचे अभियान राबविण्याची गरज आहे. शेळीपालनाकडे आजपर्यंत व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघितले जात नव्हते. मागील काही वर्षांपासून ठराविक संस्था किंवा शेतकरी त्यांच्या पातळीवर या व्यवसायाचे कार्य करत आहेत; परंतु दुसऱ्या व्यवसायामध्ये झालेल्या क्रांतीप्रमाणे शेळी व्यवसायासाठी संघटित प्रयत्न दिसून येत नाही. शेळीपालन व्यवसायातील मुख्य प्रश्न म्हणजे शेळ्यांच्या जाती आणि त्यांची गुणवत्ता, शेळ्यांचा गोठा व्यवस्थापन, चारा व्यवस्थापन, प्रजनन आणि विक्री व्यवस्था, यामुळे या व्यवसायातून पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना अर्थार्जन होत नसल्यामुळे या व्यवसायाची व्यापारी तत्त्वावर प्रगती झाली नाही. आजही शेळीपालनाकडे अनेक शेतकरी, तरुण आकर्षित होत आहेत; परंतु या आकर्षणामागील कारण म्हणजे त्यांना शेळीपालन व्यवसायाची वस्तुस्थिती माहिती नसून या व्यवसायाचे अनेकांना तयार केलेले मृगजळ आहे. या मृगजळामागे धावणारा आणि वस्तुस्थितीचा विचार न करणारा शेतकरी यातून चांगले-वाईट धडे घेईल. अज्ञानातून आणि घाईने या व्यवसायाकडे वळलेल्या समाजाकडे आलेल्या वाईट अनुभवाचा बोलबाला झाल्यानंतर शेळी बदनाम होऊ शकते याकडेही काणाडोळा करून चालणार नाही. म्हणूनच या शेळीकडे बघताना डोळसपणे, विचाराने आणि विज्ञानाने बघितले आणि भावनिक न होता व्यावहारिक पद्धतीने या व्यवसायाचा अवलंब केला तरच या व्यवसायात यश निश्चित आहे.

शेळ्यांच्या जाती निवडीबद्दल अनेक मतप्रवाह आहेत. शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्या विचारामध्ये कधी-कधी तफावत दिसते; परंतु आजही आपल्या देशामध्ये - राज्यामध्ये चांगल्या जातीच्या शेळ्या आहेत, ज्या तेथील वातावरणाला चांगल्या पद्धतीने टिकून राहिलेल्या आहेत; परंतु या शेळ्यांची उत्पादकता कमी आहे. त्यासाठी व्यवस्थापन करून उत्पादकता वाढविता येईल. महाराष्ट्रामध्ये उस्मानाबादी, संगमनेरी, सुरती आणि कोकण कल्याळ या जाती स्थानिक हवामानानुसार प्रस्थापित झालेल्या आहेत. अर्थात या जातींचे उपजत गुणधर्म अयोग्य पद्धतीच्या संकरीकरणामुळे कमी झालेले दिसतात. अनेक ठिकाणी उपजत जातीच्या शेळ्या मिळणेही शक्य होत नाही. शेळीपालन व्यवसायाकडे वळताना बाहेरून शेळ्या विकत न घेता जिल्ह्यातूनच किंवा जवळपास शेळ्या घेऊन त्यानंतर चांगल्या प्रकारच्या जातीचा बोकड घेऊन नंतर शेळ्यांचा स्वतःचा कळप स्वतः केला तरच या व्यवसायाला स्थैर्य मिळते. म्हणूनच शेळीपालन व्यवसायाची पहिली एक ते दोन वर्षे हे शिकण्याचे आणि स्वतःचा कळप तयार

करण्याचा कालावधी असतो; परंतु अनेक शेतकरी येथेच अयशस्वी होतात आणि परत दुसरा व्यवसाय शोधायला लागतात.

शेळीपालनासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे गोठा व्यवस्थापन. शेळ्यांना फिरायला आवडते आणि फिरता-फिरता खायला आवडते. म्हणून पूर्णपणे बंदिस्त शेळीपालन नको. अर्धबंदिस्त शेळीपालनासाठी मुक्त संचार पद्धतीचा गोठा तयार करणे, गोठा सतत कोरडा राहिल, हवेशीर राहिल आणि बदलत्या हवामानानुसार शेळ्यांना योग्य वातावरण राहिल असा गोठा असावा. फार मोठ्या प्रमाणात गोठ्यासाठी खर्च करण्याऐवजी कमी खर्चाचा, परंतु हवेशीर, ऊबदार आणि कोरडा गोठा कसा राहिल याकडे लक्ष द्यावे. शेळ्यांना ओलावा चालत नाही. गोठ्यामध्ये ओलावा राहिला तर न्यूमोनिया तसेच इतर आजार होतात. म्हणून कोरडा आणि स्वच्छ गोठा असावा. अनेकदा शेळ्यांच्या नवनवीन जातींचे पालन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो; परंतु त्याप्रमाणात त्यांच्या आहार व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष दिले जात नाही. म्हणून शेळीपालन व्यवसायाकडे वळताना त्यांच्या आहार व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला पाहिजे. 'घर की मुर्गी दाल बराबर' या म्हणीप्रमाणे आपल्याकडील शेळीला काहीही खाऊ घालतो आणि वजन वाढत नाही, दूध वाढत नाही किंवा बकऱ्यांची वाढ होत नाही असे म्हणतो. बाहेरून आणलेल्या शेळ्यांना मात्र चांगला आहार देतो आणि मग तुलना सुरू होते. म्हणूनच शेळीच्या वजनात किंवा दुधात वाढ करण्यासाठी सकस, संतुलित आणि विविध प्रकारचा चारा असावा. एकदल, द्विदल चान्याबरोबरच वाळलेला चारा देणे गरजेचे असते. शेळ्यांना झाडाचा पाला जास्त आवडतो. शेळ्यांना विविध प्रकारचा चारा उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा उत्पादनवाढीवर चांगला परिणाम होतो. तसेच जास्तीचे उत्पादन घेण्यासाठी खाद्य देणे गरजेचे आहे. मूरघास, हायड्रोपोनिक पद्धतीने पिकविलेला चारा, अँझोला या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही चान्याच्या खर्चात बचत करता येईल. शेतकरी शेळ्यांचा व्यवसाय करताना फार मोठ्या प्रमाणात सुरवात करतात; परंतु व्यवस्थापनाअभावी शेळ्यांची निगा राखता येत नाही. विशेषतः अशा गोठ्यात लहान बकऱ्यांची जास्त मर होते. म्हणूनच शेळ्यांची सुरवात २० ते ५० शेळ्यांपासून करून आलेल्या अनुभवावरून शेळ्यांची संख्या वाढवावी. प्रत्येक वयोगटानुसार शेळ्यांना वेगळे कप्पे केले तर त्यांचे संगोपन, चारा व्यवस्थापन, हवामानाचे व्यवस्थापन तसेच आजाराचे नियंत्रण करणे सोपे जाते. गोठ्यामध्ये शेळ्या आजारी पडू नयेत यासाठी विशेष काळजी घेणे, तसेच योग्य वेळी शेळ्यांची गर्भधारणा राहणे, कळपातील बोकड दोन वर्षांच्या आत बदलणे यासारख्या बाबींवर विशेष भर दिला तर उत्पादक शेळ्यांचा कळप चांगला तयार करता येतो. कारण हा पाया भक्कम असेल तरच त्यांच्या व्यवस्थापनावर केलेल्या खर्चाची परतफेड होऊन जास्तीचा आर्थिक फायदा होतो. म्हणूनच शेळीपालन व्यवसायामध्ये चांगल्या प्रकारचे रेकॉर्ड ठेवण्याला महत्त्व आहे. भविष्यातील वाढत असलेल्या गरजेनुसार मांस उत्पादन तसेच शेळीच्या दुधाकडे बघण्याचा बदलता दृष्टिकोन लक्षात घेता शेळीपालनाची दिशा बदलली तर निश्चितच शेतकऱ्यांच्या दारात असलेली शेळी घरात जास्त लक्ष्मी आणेल, यात शंका नाही.

➤ अडचणींवर मात करून

शेळीपालन करा फायदेशीर :--

अवास्तव माहिती मिळवून, भांडवली खर्च वाढवून शेळीपालन न करता शेळीपालकांशी चर्चा करून यश वा अपयशामागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करावा.

शेळीपालन व्यवसायाची संपूर्ण काटेकोर माहिती विविध शासकीय संस्थांकडूनच करून घ्यावी.

त्यामुळे येणाऱ्या अडचणींवर मात करून शेळीपालन व्यवसाय अधिक फायदेशीर करता येईल.

शेळी हा अत्यंत काटक व कमीत कमी खर्चात जगणारा प्राणी आहे.

आधुनिकतेच्या नावाखाली शेळी संगोपनावरचा खर्च वाढत आहे.

शेळी व्यवसायाबाबत होणाऱ्या अवास्तव जाहिरातींकडे आकर्षित होऊन सुशिक्षित बेरोजगार,

गुंतवणूकदार, व्यवसायाभिमुख उच्च शिक्षित तरुण वर्ग या व्यवसायाकडे वळत आहे.

त्याचबरोबर शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांना शेळीपालनाकडे आकर्षित करीत आहेत.

मात्र या सर्व बाबींचा अवलंब योग्य मार्गाने होत नाही.

अपुऱ्या ज्ञानावर, भांडवल आहे म्हणून शेळीपालन व्यवसाय करणे टाळावे.

शेळीपालनातील अडचणी:---

शेळीपालनाबाबत असणारी अपुरी व अवास्तव माहिती.

शेळीपालनाकडे वळणाऱ्या भांडवलदार तरुण वर्गाची फसवणूक करणाऱ्या संस्था.

शेळी पैदास व आहार व्यवस्थापनावर होणारा अतोनात व अनावश्यक खर्च.

शेळ्यांच्या गोठ्याबद्दल अवास्तव माहिती मिळवून भांडवली खर्चात होणारी अनावश्यक वाढ.

शेळ्यांची अकार्यक्षम पणन व्यवस्था.

शेळ्यांचे आरोग्य व्यवस्थापनाकडे होणारे दुर्लक्ष.

अनियंत्रित शेळी पैदास तसेच वाहतूक.

शेळ्यांचे किफायतशीर व्यवस्थापनावर वास्तववादी प्रशिक्षण देणाऱ्या घटकांचा अभाव.

शेळीचे दूध उत्तम औषधीयुक्त असूनही त्याच्या वापराकडे होणारे दुर्लक्ष.

पुरेशी माहिती न घेता शेळ्यांच्या गोठ्यावर केला जाणारा नाहक खर्च.

शेळ्यांची नैसर्गिक बलस्थाने कोणती व त्याचा वापर आहारावरील खर्चात बचत करण्यासाठी कसा करावा याबाबत अनभिज्ञता.

शेळ्यांपासून प्रचंड उत्पन्न मिळवता येते असे दाखवणाऱ्या यशोगाथा.

शेळ्यांमध्ये येणारे नवीन आजार व शेळ्यांच्या नवीन जातींची ओढ.

*चुकीच्या शेळीपालन पद्धतीचा अवलंब

किफायतशीर शेळीपालनासाठी उपाय:--

शेळीपालन करण्यापूर्वी:--

या व्यवसायाची संपूर्ण काटेकोर माहिती कृषी विद्यापीठे, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, शेळी-मेंढी विकास महामंडळे अशा शासकीय संस्थांकडूनच करून घ्यावी.

शेळ्यांच्या विविध जाती उपलब्ध असल्या तरी सर्व जाती ज्या त्या वातावरणात चांगल्या वाढतात. त्यामुळे नवीन जातींच्या नावाखाली वारेमाप पैसे खर्च करून नवीन जाती न आणता महाराष्ट्रात प्रभागनिहाय शिफारस केलेल्या जातींच्या शेळ्यांचेच संगोपन करावे.

1. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा:-- उस्मानाबादी

2. नगर, पुणे, नाशिक:--संगमनेरी

3. विदर्भ:--बेरारी

4. कोकण:--कोकण कण्याळ

शेळी ७० ते ८० टक्के भूक झाडपाला खाऊनच भागवतो.

त्यासाठी शेताच्या कडेला, बांधावर दुहेरी उद्देशाच्या,

उदा. शेवगा. हादगा, लिंब, बाभूळ, शेवरी, सुबाभूळ, बकान, हिरडा, बेहडा, वड, पिंपळ, उंबर अशा झाडांची लागवड करावी व चान्यावरचा खर्च कमी करावा.

शेतातून मिळणारे दुय्यम पदार्थ,

उदा. हरभरा, तूर, सोयाबीन यांचा भुसा, गहू, मका, भात, कडबा, ताटांचा वापर कोरडा चारा म्हणून करावा.

शेळ्यांची खरेदी बाजारातून न करता शेतकऱ्यांकडून करावी.

खरेदीपूर्वी अंत्रविषार, पीपीआर या आजारावर शेळ्यांचे प्रतिबंधक लसीकरण झाले असल्याची खात्री करून घ्यावी.

शक्यतो जुळे, तीळे करडे देणाऱ्या शेळ्यांचीच निवड करावी.

शासनाच्या योजनांतून शेळ्या खरेदी करताना आपल्या भागातील शेळ्यांचीच खरेदी करावी.

गोठा बांधण्यावर वारेमाप खर्च न करता गोठ्यात गव्हाणीचा वापर प्राधान्याने करावा.

शेळ्यांना खुराक देण्यासाठी घरगुती धान्य, गहू, मका यांचा जास्त वापर करावा.

शेळ्यांचे वेळेवर लसीकरण करावे.

वर्षातून चार वेळा जंत निर्मूलन, गोचीड, पिसवा या बाह्य कृमींचा बंदोबस्त पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे.

शेळीपालन व्यवसायात नव्यानेच पदार्पण करत असाल तर एकदम १००-२०० शेळ्यांचा प्रकल्प न करता

२० शेळ्यास १ नर अशा छोट्या युनिटपासून

सुरुवात करावी.

करडाची विक्री पैदाशीसाठी नर, ईदसाठी नर, गाभणपाठी विक्री व सर्वात शेवटी स्थानिक बाजारपेठेत विक्री अशा विविध टप्प्यांत करावी.

शेळीपालनातून अधिक नफा मिळविण्यासाठी मूल्यवर्धित पदार्थांची निर्मिती करावी.

उदा. लेंडीखत, गांडूळखत, शेळीचे दूध व दुग्ध पदार्थ यासाठी प्रचार प्रसार करून बाजारपेठ तयार करावी.

शेळीपालन स्वबळावर करण्याचा प्रयत्न करावा.

बँक लोन करणे शक्यतो टोळावे, म्हणजे नफ्याचे प्रमाण वाढेल.

शासनाची सबसिडी मिळवून व्यवसाय करणार असाल तर जातिवंत जनावरे खरेदी करण्यावर भर द्यावा.

व्यवसायातील नफा वाढविण्यासाठी नवीन जाहिरात तंत्रांचा अवलंब करावा.

शक्य असल्यास मटण विक्री स्वतःच करावी.

अंजना गोट फार्म पाथर्डी जि अहमदनगर 9922865555

➤ शेळी पालन एक उत्कृष्ट व्यवसाय

अलीकडे शेळीपालन व्यवसायास बरेच महत्त्व येत असून तो एक स्वतंत्र व्यवसाय झाला आहे हा व्यवसाय करणा-या पशुपालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. त्याचप्रमाणे इतर व्यावसायिक मंडळी देखील या व्यवसायात पडू पाहत आहेत शासनही या व्यवसायाला आर्थिक सहाय देत आहे त्याचप्रमाणे शेळीच्या मांसाची मागणीही दिवसेंदिवस वाढतच आहे काही ठराविक जातीच्या शेळ्या दर दिवशी सरासरी दोन ते अडीच लिटर दूध देतात त्यामुळे हा व्यवसाय अधिकच लोकप्रिय होत चालला आहे.

शेळी पालनाचे फायदे :--

अल्प गुंतवणुकीने हा व्यवसाय केल्या जाऊ शकतो

शेळ्या या शेतक-यांसाठी बचत बँकेचे कार्य करीत असतात आवश्यकता पडल्यास त्वरीत काही शेळ्या विकून पैसा उभा केला जाऊ शकतो.

शेतक-यास दूध विकत घेणे शक्य नसल्यामुळे शेळीचा दुधाचा वापर करणारे ग्रामीण लोक मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.

शेळ्या काटक असून विपरीत हवामानाशी जुळवून घेतात.

शेळ्या निकृष्ट प्रतिच्या चा-याचे मांसात किंवा दुधात रूपांतर करतात.

शेळ्यांचे दोन पिढीतील अंतर कमी असून लवकर उत्पादन मिळते.

त्यांना जागा कमी लागते यामुळे निवा-याकरिता खर्च कमी होतो.

काही जातीच्या शेळ्यापासून लोकर (मोहोर) मिळते.

शेळ्यांचे खत उत्तम असते.

आपल्या देशात गोमांस कुणी खात नाही म्हणून शेळीच्या मांसाला जास्त मागणी आहे.

शेळ्यांच्या शिंगापासून डिकयुक्त पदार्थ बनवितात.

शाकाहारी अन्नात कमी असणारे अमिनो आम्ल उदा लायसिन, मिथिओन व ट्रिप्टोफॅन शेळीच्या मासांत अधिक असते.

शेळीपालन व्यवसाय हा महिलांमार्फत सहज केल्या जावू शकतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेळ्यांचे महत्त्व जगात एकंदर 620 दशलक्ष शेळ्या असून त्यापैकी 123दशलक्ष शेळ्या भारतात आहे शेळ्यांच्या संख्येने जरी भारत प्रथम क्रमांकावर असला तरी त्यापासून मिळणारे उत्पन्न फार कमी आहे देशातील दुध, मांस, व कातडीच्या एकंदर उत्पादनापैकी 3 टक्के दुध 45 ते 50 टक्के मांस तर 45 टक्के कातडी शेळ्यापासून मिळते. भारतात शेळ्यांचे 50 टक्के मांस तर 45 टक्के कातडी शेळ्यापासून मिळते भारतात शेळ्यांचे सरासरी वार्षिक दूध उत्पादन फक्त 58 लिटर आहे व शेळीच्या दुधाला मागणी नाही खरं तर शेळीचा विकास दुध उत्पादनाकरीता झालाच नाही आपल्या कडील निवडक जातीच्या शेळ्या एका वेतात 200 ते 250 लिटर दुध देतात तर विदेशी जातीच्या शेळ्या 1200 ते 1700 लिटर दुध देतात. आपल्या देशात शेळ्यापासून वर्षाकाठी 2.2 दशलक्ष टन मांस मिळते तर पश्चिमा जातीच्या शेळीपासून लोकरही मिळते.

शेळ्यांच्या जाती भारतात शेळ्यांच्या प्रमुख 25 जाती आढळतात आपल्याकडील जमनापरी बिल्ल सुर्ती, मारवाडी, बारबेरी इत्यादी जाती दुध उत्पादनाकरिता तर बिल्ल, उस्मानाबादी, सुर्ती, अजमेरी, इत्यादी जाती लोकर उत्पादनाकरीता बिल्ल, उस्मानाबादी, सुर्ती अजमेरी इत्यादी जाती लोकर किंवा मोहेर उत्पादनाकरीता वापरतात. या सर्व जातींची वाढ मंद गतीने होते साधारणपणे एका वर्षात सरासरी वजन 20 किलो होते या उलट विदेशी जातीच्या शेळ्या उदा सानेन, टोने, बर्ग, अल्पाईन, एम्लोन्यूबियन, अंगोरा इत्यादी सुधारित जाती फारच झपाट्याने वाढतात अफ्रिकेतील बोयर जातीच्या शेळ्या वजनदार जाती फारच झपाट्याने वाढतात. अफ्रिकेतील बोयर जातीच्या शेळ्या वजनदार असून नराचे सरासरी वजन 100 ते 125 किलो तर मादीचे सरासरी वजन 90 ते 100 किलो असते आपल्याकडे शुध्द जातीच्या शेळ्या वापरावयाच्या असल्यास उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी शेळ्या वापराव्या संकरित शेळ्या वापरल्यास अधिक उत्पन्न मिळते.

बंदीस्त शेळीपालनाची आवश्यकता :--

शेळ्यांची चरण्याची पध्दत इतर गुरांप्रमाणे म्हणजे गाय, म्हैस मेंढी, यापेक्षा वेगळी असून त्या प्रत्येक झाडाचे झुडपाचे कोवळे शेंडे खातात त्यामुळे झाडांची वाढ खुंटते या प्राण्यामुळे जंगलांचा -हास होत आहे असा सर्व साधारण समज आहे व तो काही प्रमाणात खराही आहे जर आपण शेळ्यांना जंगलात चरण्याकरीता न सोडता त्यांचे बंदिस्त संगोपन केले तर त्यांची झपाट्याने वाढ होते.

बंदीस्त शेळीचे व्यवस्थापन :--

शेळीकरीता कमी गुंतवणुकीचे वाडे (गाळे) असावे हेवाडे बास, बल्ली, तट्टे तु-हाटया प-हाटया यांच्या सहायाने करावे

प्रती शेळी किमान 100 ग्रॅम खुराक दयावा प्रत्येक शेळीला किमान दिड ते 2 किलो हिरवा चारा दयावा झाडांची पाने दिल्यास उत्तम विविध झाडांची पाने उदा चिंच, बाभूळ, बोर, पिंपळ, सुबाभूळ, कंदब, निंब इत्यादी

कळपात 20 ते 25 शेळयामागे एक नर असावा

गाभळ शेळयाची व दुभत्या शेळयाची विशेष काळजी घ्यावी

करडांची जोपासना काळजीपूर्वक करावी

दिवसभरात किमान एक वेळा तरी शेळयांचे निरीक्षण करावे आजारी शेळयांना अगक करून पशुवैद्यकांच्या सल्यानुसार औषधे दयावीत.

शेळयाबांबत नोंदी ठेवाव्या व्याल्याची तारीख, शेळया फळल्याची तारीख मृत्यूच्या नोंदी इत्यादी उत्ताम जातीच्यान शेळ्यां व मांसासाठी व दूधासाठी उत्तम जातीच्या शेळ्या खालीलप्रमाणे उस्मासनाबादी- अर्धबंदीस्त शेळीपालनासाठी उपयुक्तम[मांसासाठी] संगमनेरी – अर्धबंदीस्तश शेळीपालनासाठी उपयुक्तप[मांसासाठी व दूधासाठी] सिरोंही – अर्धबंदीस्तश शेळीपालनासाठी उपयुक्तप[मांसासाठी व दूधासाठी] बोएर – बंदीस्तध शेळीपालनासाठी उपयुक्तप[मांसासाठी] सानेन- बंदीस्तध शेळीपालनासाठी उपयुक्तप[दूधासाठी] कोकण कन्यावळ: अर्धबंदीस्तस शेळीपालनासाठी उपयुक्तम[मांसासाठी कोकणामध्येव] उस्मानाबादी

शेळया मूखेड[नांदेड], रेणापूर[लातूर], कोण[कल्याण], लोणंद[सातारा], म्हतसवड[सातारा], च्या[आठवडी बाजारात या शेळया विकत मिळू शकतात.

दुर्लक्ष नको शेळयांच्या आरोग्याकडे...

शेळयांचे कमी खर्चात चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करता येते. शेळी व्यवस्थापन करताना सकस चारा, गाभण शेळयांची – करडांची काळजी घ्यावी. आरोग्याच्यादृष्टीने वेळच्या वेळी लसीकरण केल्यास संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण होऊन अपेक्षित फायदा शेळीपालकाला मिळू शकतो.

साधारणपणे शेळयांनादररोज तीन ते चार किलो हिरवा चारा व एक किलो वाळलेला चारा लागतो. त्याचप्रमाणे शेळयांच्या खाद्यामध्ये झाडपाला आवश्यक आहे. यामध्ये मुख्यतः शेवरी, बोर, बाभूळ, आंबा, चिंच, तुती, केळीच्या पानांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर गाभण शेळी, दूध देणारी शेळी, पैदाशीच्या बोकडासाठी पूरक आहाराची आवश्यकता असते. शेळयांचे ऊन – पावसापासून संरक्षण करता येईल, अशा पद्धतीने गोठा बांधावा. शेळयांचे गोठे नेहमी स्वच्छ ठेवावेत. मल-मूत्राची रोजच्या रोज विल्हेवाट लावावी. गोठ्यात स्वच्छ पाणी उपलब्ध असावे. गोठ्यात हवा खेळती असावी.

.....मुक्त गोठा पद्धतीने शेळीपालनात शेळ्या दिवसभर चरण्यासाठी सोडल्यामुळे अतिरिक्त आहाराची तितकीशी आवश्यकता भासत नाही; मात्र बंदिस्त शेळीपालनासाठी चाऱ्याचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. कडवळ, गजराज, बरसीम, लसूणघास, मका इ. एकदल व द्विदल पिकांची लागवड करावी. त्याचप्रमाणे वाळलेल्या चाऱ्याकरिता कडबा, गहू, सोयाबीन, तांदळाचा कोंडा, उडदाच्या भुश्याय चा वापर करावा.

शेळ्यांची जोपासना

गाभण शेळीची जोपासना :--

गाभण शेळीची व्यवस्था स्वतंत्ररीत्या करावी. तिला ओला व सुका चारा आणि मुबलक स्वच्छ पाणी यांची योग्य प्रमाणात व्यवस्था करावी. शेवटच्या दोन – तीन महिन्यांत 200 ते 250 ग्रॅम पोषण आहार द्यावा. शेळी नैसर्गिकपणे विते; मात्र काही घटनांमध्ये वैद्यकीय मदत आवश्यक असते.

दुभत्या शेळीची जोपासना :--

दुभत्या शेळ्यांना शारीरिक गरजेसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा अतिरिक्त ऊर्जेची आवश्यकता भासते. म्हणून त्यांना ओल्या व सुक्याचे चान्यासोबतच 100 ग्रॅम खुराक प्रति लिटर दुधामागे जास्त द्यावा. चारा देताना त्यामध्ये योग्य प्रमाणात मीठ व खनिजद्रव्ये मिसळून द्यावीत.

करडांची जोपासना :--

करडाच्या जन्मानंतर शेळी त्या पिल्लाला चाटू लागते; मात्र असे न घडल्यास कपड्याने करडास स्वच्छ पुसून घ्यावे. नाका-तोंडातील चिकट द्रव स्वच्छ करून घ्यावा. नाळ स्वच्छ ब्लेडने कापून टिंकच र आयोडीन लावावे. करडास एक – दोन तासांतच शेळीचा चीक पाजावा. करडाने नैसर्गिकरीत्या चीक न प्यायल्यास त्याला तो काढून पाजावा. दोन – तीन आठवड्यांनंतर त्याला कोवळा पाला द्यावा. पहिले तीन – चार महिने दूध पाजावे. त्यानंतर मात्र त्याला शेळीपासून तोडून चरण्यास सोडावे.

पैदाशीच्या बोकडाची जोपासना :--

पैदाशीकरिता योग्य शारीरिक व वांशिक गुण असणाऱ्या निरोगी बोकडाची निवड करावी. निवड करताना त्याचे वय एक वर्षापेक्षा जास्त असावे, तो मारका नसावा. अशा बोकडास योग्य प्रमाणात हिरवा, वाळलेला चारा, खुराक व मुबलक पाण्याची व्यवस्था करावी. शेळी ही निसर्गतः काटक व रोगांना कमी बळी पडते; मात्र अनेक कारणांमुळे विविध रोगांचे संक्रमण होऊन शेळीपालन व्यवसायाचे व्यवस्थापन बिघडण्याची दाट शक्यता असते.

घटसर्प :--

– हा अतिशय वेगाने पसरणारा साथीचा रोग आहे. सांसर्गिक प्राण्याची विष्टा, लाळ, चारा, पाणी यांच्याशी संपर्कात आल्याने या रोगाची लागण होते. या रोगात जनावराचे तापमान अचानक खूप वाढते. शेळी चारा खाणे बंद करते. रवंथ न करता नाक व तोंडातून स्राव बाहेर पडतो.

संसर्गजन्य फुफ्फुसदाह :-

हा संसर्गजन्य रोग आहे. या रोगाचे लक्षण म्हणजे कोरडा खोकला, नाकातून पाण्यासारखा द्रव येतो. फऱ्या –

हा रोग तीव्रपणे पसरणारा संसर्गजन्य रोग आहे. या रोगामध्ये खूप ताप येतो, पाय व सांधे यांना सूज येते, या सुजेवर दाबले असता दुखते व गरम लागते. या रोगामुळे जनावरास नीट चालवतही नाही, त्यामुळे ते लंगडते, म्हणूनच या रोगास “एकटांग्या” असेही म्हणतात.

लाळ्या खुरकूत :-

हा एक झपाट्याने वाढणारा संसर्गजन्य रोग आहे. याचा प्रसार हवा, पाणी व रोगी प्राण्याच्या संपर्कात आलेला चारा यामुळे होतो. यामध्ये शेळ्यांची भूक मंदावून त्या अशक्त बनतात. दुभत्या शेळ्यांचे दूध कमी होते, खूप ताप येतो व तोंडातून स्राव वाहतो. तोंडात पांढऱ्या रंगाचे फोड येतात, खुरांतही फोड येऊन जखमा होतात, त्यामुळे खाणे आणि चालणे अशक्यय होते. शेळ्या दगावण्याचीही शक्यशता असते.

धनुर्वात :-

या रोगामुळे शेळ्यांचे स्नायू ताठरतात, सर्वांगाला कंप सुटतो, शेळ्यांना चालताना त्रास होतो. त्यासाठी वेळेवर लसीकरण, वैद्यकीय सल्ला व निदान करून घ्यावे.

शेळ्या आणि बोकडांची निवड शेळ्या विकत घेताना पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार खरेदी कराव्यात. एकदा वेत झालेली (व्यायलेली) शेळी विकत घेणे चांगले असते. तिची आई जुळी करडे देणारी शेळी मिळत असेल, तर अशा शेळीची पैदास विकत घेणे चांगले असते. दुभती शेळी निवडताना तिचे वय, करडांची संख्या, दुधाचे प्रमाण इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष द्यावे. दुभती शेळी लड्ड व मंद नसावी, टवटवीत व चपळ असावी. शेळीपालनाचे यश पैदाशीसाठी वापरलेली शेळी व बोकड यांवर अवलंबून आहे, म्हणून उत्पादनाच्या उद्दिष्टांसाठी योग्य शेळी व बोकडांची निवड करावी. शेळी आकाराने मोठी असावी. तिची मान लांब असावी. तोंडापासून शेपटीपर्यंत असणारा लांबपणा हेही महत्त्वाचे लक्षण आहे. केस मऊ व चमकदार दिसणारे असावेत. भरपूर छाती असावी. बांधा मोठा असावा, जेणेकरून दोन किंवा अधिक करडांना शेळी आपल्या गर्भाशयात जोपासू शकेल. शेळीचे सर्व दात बळकट व सुस्थितीत असावेत. शक्यशतो एक ते दोन वर्षे वयाचीच (दोन ते चार दाती) शेळी विकत घ्यावी. पाय सरळ, पिळदार व खूर (टाचा) उंच असावेत. शेळी विकत घेताना तिची कास नीट पारखून घ्यावी. तिला कासदाह तर नाही ना, याची तपासणी करावी. दुभत्या शेळीची धार काढून पाहावी. दुधाचे प्रमाण, दुधाचा रंग, कासेवर सूज या गोष्टी पारखून घ्याव्यात. निरोगी व भरपूर दूध देणाऱ्या शेळीचे करडू खरेदी करावे. करडे रोगमुक्त, तसेच परोपजीवी कीटकांपासून मुक्त असावीत.

बोकडाची निवड कळपात जन्मणाऱ्या शेळ्यांचे 50 टक्के गुणधर्म बोकडांवर अवलंबून असतात, म्हणून

कळपाची सुधारणा बऱ्याच प्रमाणात पैदाशीच्या बोकडांवर अवलंबून असते. शुद्ध जातीचाच बोकड शक्यपतो विकत घ्यावा. ते न जमल्यास निदान सुधारित जातीचा बोकड घ्यावा. विकायला आलेल्या बोकडांपैकी सर्वात मोठा डोलदार व निरोगी बोकड निवडावा. त्याची छाती भरदार असावी व पायांत भरपूर अंतर असावे. शरीराचा मागील भाग जास्त मोठा व उंच असावा. पाय मजबूत व खूर उंच असावेत. बोकड मारका नसावा. तो चपळ व माजावर आलेल्या शेळीकडे चटकन आकर्षित होणारा असावा. डोके व खांद्याचा भाग दणकट, थोराड व नराची लक्षणे दाखवणारा असावा. या लक्षणांवरून पुढील पिढीत चांगले गुणधर्म संक्रमित होण्याची शक्यता कळते. शेळ्या, मेंढ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या..

आंत्रविषार :--

प्रामुख्याने हा आजार चांगल्या पोषित, पौष्टिक चान्यावर चरणान्या, मांसाने भरीव असणाऱ्या मेंढ्यांना व शेळ्यांना बाधित करतो. कोकरांनी आजारास बळी पडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जास्त प्रमाणात प्यायलेले दूध होय. प्रादुर्भाव झालेली नवजात कोकरे हवेमध्ये उडी घेऊन जमिनीवर कोसळतात, थरथर कापतात व काही मिनिटांतच गतप्राण होतात.

उपाययोजना – शेळ्या, मेंढ्यांना पावसाळ्याच्या सुरवातीला लस टोचून घ्यावी. कोकरांना लस दिल्यानंतर तीन आठवड्यांनी बूस्टर डोस द्यावा. लस टोचल्यानंतर रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होण्याकरिता 21 दिवसांचा कालावधी लागतो. प्रादुर्भावादरम्यान दीर्घक्रियाशील प्रतिजैविके योग्य मात्रेत द्यावीत.

फाशी :--

हवामानातील अचानक बदल, मुसळधार पाऊस व दुष्काळ परिस्थितीमुळे फाशीचा रोग पसरतो. यात खूप ताप येतो, जनावर थरथरते, तोल जातो, नाकातोंडातून काळपट रक्तस्राव होतो. श्वासेस घेण्यास त्रास होतो व शेळी-मेंढी ताबडतोब मरते. उपाययोजना – पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रतिबंधक लसीकरण करावे. मेलेल्या शेळ्या-मेंढ्या वर-खाली चुनखडी (चुना) टाकून खोल खड्ड्यात पुराव्यात. त्यांची कातडी विकू नये. शवचिकित्सा करून नये.

जरबा :--

याचा प्रसार चावणाऱ्या चिलटांपासून म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या होतो. जास्त पाऊस व ढगाळ वातावरणामध्ये चिलटांची उत्पत्ती डबक्याजत पाणी साठल्यामुळे अधिक प्रमाणात होते. याची लक्षणे म्हणजे तोंडाला गरे पडतात, तोंडातील आतील भाग लालसर पडतो, काही वेळा लाळ येते, शेळ्या-मेंढ्या कुचंबतात, डोळे लाल होतात, जनावर लंगडू लागते, छातीला व जबड्याखाली जखमा होतात.

उपाययोजना :--

पावसाळ्यात सायंकाळी वाडग्यात करंज, कडुनिंब, निरगुडीच्या पाल्याची धुरी करावी. डबकी व साचलेल्या पाण्यावर रॉकेल फवारणी करावी. असे केल्याने चिलटांचे प्रजनन कमी होऊन संख्या वाढत नाही. बाधित मेंढीस पशुवैद्यकाच्या सल्ल्यानुसार प्रतिजैविके योग्य मात्रेत द्यावीत. कोमट पाण्यात मीठ टाकून तोंड धुवावे.

बुळकांडी :-

या आजारात शेळ्या-मेंढ्यांमध्ये ताप येणे, नाकातून पाणी येणे, चिकट व रक्तमिश्रित जुलाब होणे इत्यादी प्रमुख लक्षणे दिसून येतात.

उपाययोजना :-

पशुतज्ज्ञांकडून नियमित पी.पी.आर. लस टोचून घेणे. वाडग्यात स्वच्छता पाळावी. आजारी शेळ्या, मेंढ्यांना वेगळे ठेवावे.

दुष्काळी परिस्थितीत शेळ्या- मेंढ्यांची घ्यावयाची काळजी

वाढते तापमान आणि कमी पर्जन्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष अशा दुहेरी संकटात सध्या शेळी- मेंढी पालक आहेत. या बदलत्या हवामानाचा शेळ्या- मेंढ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. सर्वसाधारणपणे शेळ्या- मेंढ्यांचा पैदासकाळ हा पावसाळ्याच्या सुरवातीला येतो; मात्र पैदाशीसाठी सक्षम शरीर यंत्रणा तयार होण्यासाठी उन्हाळी हंगामातच त्यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

या वर्षी दुष्काळजन्य स्थिती फारच गंभीर असून, सतत दोन वर्षे कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळाची झळ शेळ्या- मेंढ्यांनाही बसत आहे. कधी नव्हे ते शेळ्या- मेंढ्यांसाठीही छावण्यांची मागणी होत आहे. दुष्काळ आणि त्याचबरोबर वाढते तापमान यामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांचा व त्यावर करावयाच्या उपचारांचा आढावा सदर लेखात घेत आहोत. या परिस्थितीत उद्भवणाऱ्या आरोग्याच्या प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे आहेत.

उष्माघात :-

शेळ्या जर जास्त काळापर्यंत तीव्र उन्हात राहिल्या किंवा बाहेर सोडल्या, तर ही समस्या उद्भवण्याची शक्यता अधिक असते. त्यांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, त्या मलूल दिसतात. चारा-पाणी घेण्याचे थांबते अथवा शरीराचे तापमान सामान्य तापमानाच्याही वर साधारणतः 105-106 फॅ.पर्यंत पोचते. कधीकधी शेळ्या मूर्च्छित होऊन पडतात. उपचाराला प्रतिसाद देण्याच्या आधी दगावतात.

उन्हाळी हगवण :--

एकंदरीत अशा हगवणीसाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. जसे उष्माघात, गरम व दूषित पाणी, साचलेल्या दूषित पाण्याद्वारे जंतबाधा, जिवाणूबाधा किंवा अपचन अशा अनेक घटकांचा समावेश करता येईल. हगवणीची बाधा झाल्यास जनावरांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण व इलेक्ट्रो लाइटचे प्रमाण फार कमी होते, त्यामुळे शेळ्या अगदी अशक्त होतात व जमिनीवर पडून राहतात. जंतबाधेची हगवण असल्यास शेणाला विशिष्ट वास येतो.

आम्लीय अपचन :--

उन्हाळ्यात जनावरांची पचनशक्ती मंदावलेली असते. बाह्य तापमानाचे नियंत्रण करण्यासाठी शेळ्या पाणी जास्त पितात. शेळ्यांच्या खाद्यामध्ये जर कोरडा चारा जास्त प्रमाणात असला, तर पचनशक्तीवर परिणाम होतो. उन्हाच्या तीव्रतेने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन रक्तामध्ये आम्ल वाढते व आम्लीय अपचन होते. कधीकधी समारंभातील उरलेले तेलकट, पिष्टमय, दूषित अन्न खाल्ल्यामुळे सुद्धा असे अपचन होते.

जंतबाधेमुळे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम :--

खरे तर उन्हाळ्यामध्ये जंतांची वाढीची अवस्था म्हणजे अंडी, अंड्यांपासून विषारी अवस्था व वयस्क अवस्था ही थांबलेली असते; परंतु शरीराच्या आत असलेले जंत जसे यकृत, आतडी व पोटाचे कप्पे यांतील जंत क्रियाशील असतात. सामान्यतः यकृतातील जंत जास्त क्रियाशील असतात. अशा जंतांची शरीरातील संख्या वाढली, की शेळ्यांमध्ये रक्ताल्पता वाढते व शेळ्यांची रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होते. शेळ्यांची हाडे व बरगड्या दिसायला लागतात. केस राठ झालेले व चकाकी नसलेले, तसेच कातडी निस्तेज झालेली दिसते. डोळ्यांची श्लेष्मा निस्तेज, फिकट दिसते आणि यकृतावर व पचनक्रियेवर परिणाम झालेले दिसतात. काही प्रसंगी शेवटी शेळ्यांना हगवणीचा तीव्र त्रास होऊन शेळ्या अगदी अशक्त होतात व उपचाराला प्रतिसाद न देता दगावतात.

उपचार व प्रतिबंध :--

उष्माघाताचा त्रास होऊ नये, म्हणून शेळ्यांना दिवसातील थंड काळ जसे सकाळी लवकर (सहा ते दहा वाजेपर्यंत) आणि संध्याकाळी उशिरा (तीन ते सात वाजेपर्यंत) या काळातच चरावयास सोडावे. स्वच्छ, ताजे व थंड पाणी शेळ्यांना उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी. हगवणीला कारणीभूत घटकांचा योग्य तो उपचार अथवा प्रतिबंध करावा. जसे की हगवण थांबविणाऱ्या औषधांचा उपयोग, प्रतिजैविक गोळ्या (पेसुलिन, फॅजाल, पॅबाडीन इ.) सोबत इलेक्ट्रो लाइटची पावडर हे सर्व एकत्र करून स्वच्छ पाण्यातून दोन ते तीन वेळा पाजावे.

तीव्र हगवणीच्या प्रकारात शिरेतून इलेक्ट्रो लाइट व ऊर्जेचे द्रावण द्यावे.

जास्त पिष्टमय खाल्ल्याने आम्लीय अपचन होऊन तीव्र हगवण लागते. शेळ्या दूषित, टाकलेले, उरलेले अन्न खाणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अचानक अशी समस्या आली तर पाण्यातून खाण्याचा सोडा पाजावा अथवा तीव्रता जास्त असल्यास शिरेद्वारे सोडाबायाकार्बचे द्रावण द्यावे, सोबत जीवनसत्त्वे व कोणतेही एक प्रतिजैविक द्यावे.

जंतबाधा ही शेळ्यांमधील प्रमुख समस्या आहे. उन्हाळ्यात जंतांची अंडी सुप्तावस्थेत असतात, अशा काळात गोठ्यातील जंतयुक्ती माती काढून घ्यावी व त्याठिकाणी जंतरहित माती टाकावी. या मातीमध्ये चुना व कॉस्टिक सोडा मिसळल्यास जमीन निर्जंतुक होण्यास मदत होईल, याशिवाय शरीरातील क्रियाशील जंत मारणे अति आवश्यक असते, त्यासाठी सर्व प्रकारच्या जंतांवर प्रभावी असलेले जंतुनाशक जसे फेनबेन्डॅझल, डिस्टोडीन, बॅनमिन्थसारखी जंतुनाशक औषधे वापरून जंतनिर्मूलन करून घ्यावे, जेणेकरून उत्पादनक्षम काळात शेळ्यांचे आरोग्य चांगले राहील व गर्भाची योग्य वाढ होईल.

शरीरावर वाढणारे परोपजीवीसुद्धा या काळात सुप्तावस्थेत असतात. मात्र, त्याआधी योग्य ते औषध फवारणी करून शरीरावरील परोपजीवींचा बंदोबस्त करावा. अशाप्रकारे उन्हाळ्यात घेतलेली आरोग्याची काळजी पुढील काळात विशेषतः पावसाळ्यातील संक्रमण काळात प्रतिबंधक म्हणून आणि उद्भवणाऱ्या समस्येवर उपाय ठरते.

नवजात करडांचे संगोपन :--

नवजात करडास शेळी स्वतः चाटून स्वच्छ करते, त्याचे दोन फायदे असतात. त्यामुळे करडांचे रक्ताभिसरण वाढत असते; शेळीने चाटून स्वच्छ न केल्यास पिल्लांचे अंग स्वच्छ, खरखरीत कापडाने स्वच्छ करावे. नाकातील व तोंडातील चिकट स्राव काढावा, त्यामुळे करडांना श्वास घेण्यास सोपे जाते. खुरांवर वाढलेला पिवळा भाग हळूच खरडून काढावा, जेणेकरून करडांना ताठ उभे राहता येईल.

करडांना उभे राहण्यास मदत करावी. करडे उभे राहिल्यानंतर शेळीच्या सडाला तोंड लावून दूध पिण्याचे प्रयत्न करते की नाही ते पाहावे. नाही तर दूध पिण्यास शिकवावे. पिल्लू जन्मल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत शेळीचे दूध म्हणजे चीक पाजणे आवश्यक असते, यामुळे करडांची रोगप्रतिकारक्षमता वाढत असते आणि करडांची पचनसंस्था व पचनमार्ग साफ होतो.

पहिल्या आठवड्यात करडाच्या वजनाच्या दहा टक्के एवढे दूध चार- पाच वेळेस विभागून पाजावे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त दूध पाजू नये, नाही तर अपचन होऊन हगवण वाढते. करडे जन्मल्यानंतर त्याचे वजन करून नोंद करून घ्यावी.

जन्मल्यानंतर पाच- सात दिवस शेळी व करडे एकत्र ठेवावीत व रोज त्यांना वजनाच्या दहा टक्के दूध तीन- चार वेळा विभागून पाजावे. शेळीच्या पाण्याची व्यवस्था/ भांडे उंचीवर असावे, जेणेकरून करडे पाण्यात पडणार नाहीत, याची काळजी घेता येते.

जन्मल्यानंतर पाच- सात दिवस शेळी व करडे एकत्र ठेवावीत व रोज त्यांना वजनाच्या दहा टक्के दूध तीन- चार वेळा विभागून पाजावे. शेळीच्या पाण्याची व्यवस्था/ भांडे उंचीवर असावे, जेणेकरून करडे पाण्यात पडणार नाहीत, याची काळजी घेता येते.

साधारणपणे 65- 70 दिवसांपासून करडांचे दूध कमी करत 90 दिवसांपर्यंत पूर्णपणे बंद करावे आणि शेळीपासून पूर्णपणे वेगळे करावे. करडांना वयाच्या 30 ते 40 दिवसांपासून मऊ, लुसलुशीत चारा देण्यास सुरवात करावी, जेणेकरून चारा खाण्याची सवय होऊ लागते.

करडांची निरोगी व झपाट्याने वाढ करण्यासाठी त्यांना आवश्यक औषधी, सकस आहार इ.कडे बारकाईने लक्ष देण्यात यावे. खनिज क्षारांचा पुरवठा करण्यासाठी खनिज विटा टांगून ठेवाव्यात.

करडे पाच महिन्यांच्या नंतरच विक्रीसाठी काढावीत, कारण या वयानंतर करडांची वाढ झपाट्याने होते व जास्त नफा मिळतो.

तीन महिन्यांनंतर करडांना आंत्रविषार, लाळ्या खुरकूत व घटसर्प आणि फर रोगांविरुद्धचे लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे

रोखा शेळ्यांतील जीवाणूजन्य आजार

बदलत्या हवामानामुळे कळपातील शेळ्या मेंढ्यांना साथीच्या व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी आजाराचे गांभीर्य पाहून ताबडतोब पशुवैद्यकाकडून कळपातील आजारी शेळ्यांवर उपचार करून घ्यावेत.

डॉ. मृणालिनी पावडे, डॉ. प्रज्वलिनी मेहेरे

शेळ्या मेंढ्यांमध्ये प्रामुख्याने जीवाणू व विषाणूमुळे आजार होतात. या आजारावर लक्षणे तपासून योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

अ) जीवाणूमुळे होणारे आजार :-

१) घटसर्प :-

- हा रोग पाश्चुरेला मल्टोसीडा या जीवाणूच्या प्रादुर्भावामुळे होतो.

- बदललेल्या हवामानामुळे शेळ्यांमध्यांवर ताण येतो. त्यामुळे जनावरांची प्रतिकार शक्ती कमी होते.

- या रोगाचे जंतू अशुद्ध पाणी, चाऱ्याद्वारे शरीरात प्रवेश करतात. प्रादुर्भाव झाल्यावर जनावरास तीव्र ताप येतो. प्रामुख्याने फुप्फुसाला प्रादुर्भाव होऊन श्वसनाचा त्रास होतो. नाकातोंडातून स्राव येतो.

गळ्यावर व मानेखाली सूज येते.

उपचार :-

- लक्षणे दिसून आल्यास ताबडतोब पशुवैद्यकाकडून उपचार करून घ्यावेत. बाधित जनावरे निरोगी

जनावरांपासून वेगळी ठेवावीत.

- शेळ्यांना पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक लस टोचून घ्यावी.

२) आंत्र विषार :-

- क्लोस्ट्रीडिअम परप्रिंजन्स या जीवाणूमुळे हा आजार होतो. साधारणतः जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो.

- पाऊस पडल्यावर जे कोवळे लुसलुशीत गवत उगवते त्यावर शेळ्या-मेंढ्या खाण्यासाठी तुटून पडतात. या अतिखाण्यामुळे शेळ्या-मेंढ्यांचा आतड्यांत जीवाणूंच्या वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते आणि त्या जंतूंचे विष शरीरात पसरून शेळ्या-मेंढ्यांना विषबाधा होते.

- १ ते ४ महिन्यांच्या कोवळ्या कोकरामध्ये रोगाचे प्रमाण जास्त असते.

- पातळ शेण, रक्तमिश्रीत आव, वारंवार जुलाब होणे, उठबस करणे, पाय झटकणे, पोट फुगणे इत्यादी महत्त्वाची लक्षणे दिसतात. शेळ्या २-८ तासांत मरण्याची शक्यता असते.

उपचार :-

- आंत्रविषाराची लस मे महिन्यात २१ दिवसांच्या अंतराने कातडीखाली दोनदा टोचून घ्यावी.

- करडे-कोकरांना ३ महिने वयाच्या आधीच लस टोचून घ्यावी.

३) फज्या : (ब्लॅक क्वार्टर) :-

- क्लोस्ट्रीडियम चेव्हॉय या जीवाणूमुळे हा आजार होतो.

- खूप ताप येतो. शेळ्या लंगडताना दिसतात.

- मागील पायाचा फरा किंवा पुढील पायाचा खांदा यावर सूज येते. सूज आलेला भाग हाताने दाबल्यास करकर असा आवाज ऐकू येतो.

उपचार :-

- आजारी जनावरे कळपातून वेगळी ठेवून त्यांच्या चारा व पाण्याची वेगळी व्यवस्था करावी.

- नियमितपणे दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरवातीला रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून घ्यावे.

४) शेळीतील सांसर्गिक फुप्फुसदाह :-

- हा रोग मायकोप्लाझमा या जीवाणूमुळे होतो. या रोगाचा प्रादुर्भाव दूषित हवेमुळे किंवा प्रादुर्भाव झालेली शेळी कळपामध्ये मिसळल्यामुळे होतो.

- साधारणतः प्रादुर्भावानंतर ६ ते १० दिवसांनंतर लक्षणे दिसतात. प्रादुर्भाव १०० टक्के शेळ्यांमध्ये दिसून येतो.

- खोकला येणे, श्वासोच्छ्वासास त्रास होणे, कळपाच्या मागे राहणे, पडून राहणे इ. लक्षणे आढळतात.

- शेळी उभी राहू शकते, थोडी चालू शकते. शरीराचे तापमान साधारणतः १०५ अंश फॅरनहाइट ते १०६ अंश फॅरनहाइट राहते.

- शेवटच्या काळात तोंडाने श्वासोच्छ्वास घेतात. जीभ बाहेर येते. तोंडातून फेस, लाळ येणे अशी लक्षणे दिसून येतात.

उपचार :

१) प्रादुर्भाव झालेल्या शेळ्या स्वतंत्र ठेवाव्यात.

२) मायकोप्लाझमा एफ ३८ चे लसीकरण करून घ्यावे व दुसरी मात्रा ६ महिन्यांनंतर द्यावी.

संपर्क : डॉ. मृणालिनी पावडे, ९९२२६१५२५८

(क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा)

➤ शेळीपालन सल्ला -

बंदिस्त शेळ्यासाठी शेड(गोठा) बांधताना खालील मुद्दे लक्षात ठेवा

मनुष्या प्रामाणे शेळीला सुद्धा घराची आवश्यकता असते.

शेळी ही काटुक जातीचा प्राणी आहे त्यामुळे तिला फक्त रात्रि आणि प्रतिकूल वातावरणा पासून बचावा साठीच शेड ची किंवा गोठ्याची आवश्यकता असते.

परंतु जर आपण बंदिस्त शेळी पालन करत आहात तर आपल्याला आपल्या शेडची बांधणी करताना विशेष लक्ष द्यावे लागते

कारण बंदिस्त शेळी पालन प्रकारात शेळी ही 24 तास त्याच शेड मध्ये असते करिता शेडची रचना करताना खालील बाबींचा विचार करावा.

- 1) शेड साठी कोरडी आणि उंच ठिकाण असलेलीच जागेची निवड करावी. कारण पावसाच्या किंवा पुराच्या पाण्याची पासून त्यांचा बचाव झाला पाहिजे.
- 2) शेड मध्ये पर्याप्त मात्रेत उजेड आणि हवा असायला हवी
- 3) शेड या प्रकारे बांधावे की जेणेकरून वातावरण व आद्रता यांच्यावर नियंत्रण करता आले पाहिजे.
- 4) शेड नेहमी कोरडे असावे कारण ओलसर शेड मध्ये शेळ्यांना अनेक आजार होण्याची शक्यता असते.
- 5) पावसाचे पानी शेड मध्ये येता कामा नये अशी शेडची उभारणी करावी.
- 6) शेड मध्ये शेळ्यांना आराम करण्यासाठी पर्याप्त जागा पाहिजे.
- 7) शेड मध्ये साफ सफाई ची व्यवस्था करण्याची सोय पाहिजे.
- 8) शेळ्यां ह्या ठंडी आणि पाण्याला घाबरतात म्हणून हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात त्यांची जास्त काळजी घेतली पाहिजे नाहीतर त्यांना निमोनिया होण्याची भीति असते.

प्रती शेड मध्ये शेळ्यांना लागनारी जागा

शेळ्यांची शारीरिक वाढ आणि वजन लक्ष्यात घेता त्यांना जास्त जागा हवी असते.

1.8 Mtr x 1.8Mtr x 2.5 Mtr म्हणजेच (5.5 ft x 5.5 ft x 8.5 ft) एवढी जागा ही 10 करडासाठी पुरेसी आहे.

एका व्ययस्क शेळी साठी 0.75 Mtr x 4.5 Mtr x 4.5 Mtr एवढी जागा लागते.

खालील तक्ता शेळ्यांना त्याच्या वया नुसार कीती जागा लागते हे दर्शवितो. (Squire Meter मध्ये)
करड 0.3

व्ययस्क शेळी 1.5

गाभन शेळी 1.9

वरील सर्व माहिती ही बंदिस्त शेळी पालन साठी लागणाऱ्या शेड संबंधी आहे

➤ शेळी व जनावरांसाठी काही आयुर्वेदीक औषधे

पाण्यात शेवाळ होऊ नये म्हणुन त्यात १ टाकावे(काँपर सल्फेट)मोरचुद%

गोठ्यात चुनाकडुनिंब पाला पावडर एकत्र करुन टाकावी+वावडींग+वेखंड+

जखमेवर कडुनिंबजखमेत आळ्या पडल्या असतील तर त्यात.वेखंड पावडर लावावी+महारुख+ टरपेंटाईनचा बोळा ठेवावा थोडी आग होते पण आळ्या रहात नाहीत

पोट फुलेतर थोडे टरपेंटाईन पाजावे किंवा पांढरे मिरे चावुन बारीक करुन त्याची पिचकारी डोळ्यात मारावी किंवा १ लिटर गोडेतेलात १२ मिली टरपेंटाईन व प्रत्येकी ५ग्रॅम हिंग,सुंठ,लसुण,ओवा,काळे मिठ पाजावेफरक . पडला नाही तर वेळ न घालवता डॉक्टरला दाखवणे

जंता साठी लहान जनावरांना २ लाल सुपारी चुर्ण व मोठ्यांना ४ पाण्यातुन दर आठवड्यास पाजावे दुध तापकाळी मिरी प्रत्येकी+आळशी+कॅलशियम कमि झाल्याने होते त्या साठी सुंठ-- १० ग्रॅम व ५ ग्रॅम नवसागर गुळात कालवुन द्यावेशेवग्य.ाचा पाला नियमित खाऊ घालावा कॅलशियम साठी आंड्याची टरफले . डीक कुटून पाण्यातुन पाजावे/

पान्हा चोरणे वासरु मेल्यावर असे होते तेंव्हा मेथी,ओवा,धने,अळीव,लसुण,बाळंत शोपा,हळीव समभाग एकत्र करुन २०दिवस गुळात मिकस करुन लाडु करुन खाणेस २५/दयावे

गर्भाशय बाहेर येत असेल तर साखरेचे पाणि करुन टाका.

जार पडुन गर्भाशय साफ होण्यासाठी गुळातुन ५० ग्रॅम प्रत्येकी जीरे,मिठ सुंठ,वेखंड प्रत्येकी २० ग्रॅम एकत्र करुन जनल्यावर लगेच सुरु करुन ८दिवस १०/दयावे

नवप्रसुत जनावरांचा थकवा जाऊन पुन्हा ताकद व उत्साह वाढी साठी ५००ग्रॅम गुळ,२००ग्रॅम हळीव,२००ग्रॅमबाळंतशोपा५०ग्रॅम सुंठ १ लिटर पाण्यात चांगले उकळुन ८दिवस रोज पाजावे१०/

कासेची सुज येऊ नये म्हणुन जनल्यावर ८दिवसांनी गुळवेल सत्व १०/कोरफड,सुंठ ताकातुन पाजावे परत

परत रिपीट करावे १०दिवसांनी १२/

दुध वाढी साठी आश्वगंधा,शतावरी,गुळवेल,हळीव,मेथी,जीरा,नारळ,गुळ,नागरमोथा,हळद प्रत्येकी २० ग्रॅम एकत्र करून रोज लाडू करून द्यावा ह्यात जर तुपातील बेरी मिळाली तर एकत्र करून द्यावीडेरिवाले तुप करून बेरी) .बाँयलर मध्ये जाळतात

अंजना गोट फार्म पाथर्डी जि अहमदनगर 9922865555

➤ चारा उत्पादन

*लसूनघास/लुसर्न घास/मेथी घास :--

लसूनघास हे द्विदल वर्गीय चारापिकांपैकी एक अतिशय महत्वाचे चारा पीक आहे, हे पीक वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीत व हवामानात येते.

यामध्ये हंगामी व बहुवार्षिक जातीची लागवड करता येते. हंगामी पिकापासून 5ते6 कापण्या मिळतात व बहुवार्षिक पासून 1 वर्षात 12 ते 15 कापण्या मिळतात.

जमीन व मशागत :--

हे पीक 3 वर्षे टिकणारे असल्यामुळे जमिनीची चांगली मशागत करणे गरजेचे आहे. जमीन पाण्याची निचरा होणारी असावी. जमिनीची खोल नांगरट करावी व त्यानंतर कुळवाच्या दोन पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत व मऊ करून घ्यावी, शेवटच्या पाळी पूर्वी जमिनीमध्ये एकरी 5 ते 6 टन चांगले कुजलेले शेणखत टाकून घ्यावे व 50 किलो रासायनिक खत वापरून मशागत करावी,

बियाणे व पेरणी :--

बियाणे जातिवंत व शुद्ध असणे गरजेचे आहे. हलक्या बियाण्या त *अमरवेल* वाढतो. पेरणी 2 प्रकारे करता येते, 1. बियाणे फोकून 2.ओळीत.

फोकून पेरणी केल्याने बियाणे जास्त एकरी 20 किलो लागते व ओळीत पेरणी केल्याने एकरी 10 ते 12 किलो लागते.

पेरणी करण्या अगोदर जमिनीत 5 मीटर x 10 मीटर चे वाफे करून घ्यावेत. त्यामुळे पाणी देण्यास सोयीच होते.

सुधारित जाती :--

आर एल 88, आनंद 2, को 1, व टी 9, बायफ लुसर्न 1.

पाणी व्यवस्थापन :--

बी पेरल्यानंतर पहिले पाणी हळुवार द्यावे कारण हे बी वजनास हलके असल्याने वाहून जाते, एका वेळेस 3 ते 4 वाफ्यात पाणी सोडावे. किंवा आपल्याकडे व्यवस्था असेल तर sprinkler ने पाणी द्यावे.

आंतरमशागत :--

तणांच्या बंदोबस्तासाठी खुरपणी करणे गरजेचे, ओळीत पेरणी केली असेल तर हात कोळपी यंत्राने तन नियंत्रित करता येते.

चाऱ्याची कापणी :--

गवताची कापणी फुलकळ्या लागल्यावर करावी म्हणजे पहिली कापणी 55 ते 60 दिवसांनी व नंतर च्या कापण्या 22 ते 25 दिवसात.

चारा उत्पादन :--

हे पीक 2 ते 3 फूट उंच वाढते, त्यामुळे वर्षभरातील 12 ते 15 कापण्या तुन एकरी 40 टन चारा मिळतो.

चाऱ्याची पौष्टिकता :--

लसूण घासास *चारा पिकाचा राजा* म्हणतात, यामध्ये फायबर, कर्बोदके, सूक्ष्म अन्न द्रव्ये , अ व ड जीवन सत्व आणि महत्वाचे 18 ते 20% प्रोटीन आहेत.

【लसूण घास अतिशय पौष्टिक असलेने हे चारा पीक आपल्या शेतामध्ये अवश्य करावे】

गोट फार्मिंग ला लागनारी औषधांची लिस्ट आहे सर्व इंग्लिश आहे फक्त कोनत्या रोगाला चालते ते मराठित टाईप करुन टाकत आहे औषध हि मेडिकल स्टोअर्स चालकाला दाखउन वापरा .

गोट फार्मिंग मधिल उपयोगी औषधे

Sl No Name of Medicine Type Containts Usage

- 1) OflokinD OZ Bolus Ofloxacin and ornidazole Diarrhoea(डरगळने /हगवण)
- 2) Replenta Powder Combination of power Uterine stimulant and Ecboolic(झार अडकने)
- 3) MelonEx IP 5 Mg Injection Meloxicam IP Temperature,lameness. Painkiller(तापनाशक व वेदनानाशक)
- 4) Zobid M Injection Meloxicam IP Temperature,lameness. Painkiller(तापनाशक व वेदनानाशक)
- 5) Intacef 1 Injection Higher Antibiotic, pneumonia,diarrhoea,wound, abscess,joint infection,mastitis(अँटिबायोटिक आहे ,सर्व इंफेक्शन व रोगास चालते)
- 6) Neuroxin M Inection Methyl cobalamin, Vitamin B6 AND Nicotinamide Steroid for nervous system, debilty,to increase hunger
- 7) Enrogil LA Inection Enrofloxacin Higher Antibiotic, pneumonia, diarrhoea, wound, abscess,joint infection. (single shot)
सर्व रोगावर चालते लॉग अँक्टिव आहे .
- 8) Atropin Sulphate Injection Atropin Sulphate Diarrhoea, poisoning
विषबाधा व डायरियावर चालते .
- 9) Sulphadimidine Sodium Injection Sulphadimidine Sodium Diarrhoea,
डायरियावर चालते
- 10) Cadistin Injection Chlorpheniramine IP Allergy,shock,to avoid reaction to drugs
अँलर्जी,शॉक,रिअॅक्शन येउ नये म्हनुन वापरतात
- 11) Bloatosil Suspension Simethicone Suspension Anti bloat
पोट फुगीत वापरतात
- 12) Vetalgin Injection Analgin Colic,pain,temperature
वेदना,ताप यासाठी वापरतात

13) Oriprim V Injection Co-trimoxazole Diarrhoea

हागवण साठी वापरतात

14) Hitek Injection Ivermectine IP, Benzyl Alcohol IP, Propylene Glycol IP, Internal and External Parasites

शरिरातील जंत व शरिरावरील किटका साठी वापरतात

15) Lornitas Suspension Levofloxacin Hemihydrate and Ornidazole Anti Diarrhoeal

हागवण साठी

16) Abazole Injection Metronidazole IP Anti Diarrhoeal

हागवण साठी

17) Mikacine Injection Amikacin Sulphate Higher Antibiotic, pneumonia,diarrhoea,wound, abscess,joint infection,mastitis

ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया साठी वापरतात/सर्व रोगात

18) Tamik Injection Amikacin Sulphate, Methyl Parabon, Propyl Paraben Higher Antibiotic, pneumonia,diarrhoea,wound, abscess,joint infection,mastitis

ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया साठी वापरतात/सर्व रोगात

19) Vetade Injection Vitamin A D3 E General weakness,genital problems,muscular weakness

अशक्तपणा/प्रजनन रोग

20) Isoflud Injection Isoflupredone Acetate Shock, lameness,ketosis

स्टिरॉइड आहे शॉक/वेदना /सुज

21) Synkomet Injection Butaphosphan and Cyanocobalmin General weakness,bone development,weak heat,

अशक्तपणा/हाडाच्या वाढीसाठी/अपक्व माजासाठी

22) Flunimeg Injection Flunixin Meglumine Inj USP Colic,pain,temperature

पोटातील कळ ,वेदना व ताप

23) Floxidin Injection Enrofloxacin Mycoplasma ,H S. PNEUMONIA

24) Megapen 500 Mg Injection Ampicilin and Cloxacilin wound, abscess,joint infection,mastitis

जखम ,पु होने,सांध्याचे इंफेक्षन ,दगडी

25) Ampoxin 500 Mg Injection Ampicilin and Cloxacilin wound, abscess,joint infection,mastitis

जखम ,पु होने,सांध्याचे इंफेक्षन ,दगडी

26) Biostrim DS Bolus Trimethoprim and Sulphadiazine Diarrhoea

हागवन

27) Oxal Forte Bolus Nimesulide, Paracetamol and Serratiopeptidase TEMPERATURE,,SWELLING JOINT PAIN

ताप,सुज,दुखने

28) Serakind Bolus Serratiopeptidase Abscess, mastitis

सुज व जखम

29) Cflox Bolus Ciprofoxacin Hydrochloride Diarrhoea

हागवन

30) Tetracycline Hydrocholride Water soluble Powder Tetracycline Hydrocholride Water soluble as an antibiotic,

पान्यातून देण्याचे अँटिबायोटिक

31) Metro F Bolus Furazolidone and Metronidazole Diarrhoea

हागवन

32) Neblon Powder Aurvedic combination Anti Diarrhoeal

हागवण

33) Diaroack Powder Aurvedic combination Anti Diarrhoeal

हागवण

34 Sulphamethoxazole and trimethoprim Bolus Sulphamethoxazole and trimethoprim Anti Diarrhoeal

हागवण

35 Genta Injection cough, nasal discharge, diarrhoea, mastitis
कफ,सर्दि,हागवण,कासेचे आजार .

शेळीपालनात नोंदवहीचे महत्त्व

नोंदवहीचे महत्त्व व प्रमुख कारणे -

विक्री नोंदवही -

करडांच्या वजनांची नोंदवही -

शेळ्यांच्या वजनांची नोंदवही -

शेळी विण्याची नोंदवही -

प्रत्येक शेळीबद्दलच्या माहितीची नोंदवही -

कळपातील एकूण शेळ्यांची संख्या दर्शविणारी नोंदवही -

रोजचा औषधोपचार नोंदवही -

मरतूक नोंदवही -

शेळीपालन हा व्यवसाय नफ्यात करावयाचा असेल, तर गोठाबांधणीसाठी कमीत कमी खर्च व स्वतःचा चारा तयार केल्यास हा व्यवसाय उत्तम आहे. शेळीपालनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्या नोंदीसाठी विशेष महत्त्व आहे. शेळीपालनामध्ये तक्त्यांनुसार विविध नोंदी ठेवणे खूप आवश्यक आहे. जर शेळीपालकांनी नोंदी ठेवल्या तर तो शेळीपालन व्यवसाय नफ्यात आल्याशिवाय राहत नाही. भारतात शेळीला गरिबांची गाय म्हणतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील ७० टक्के गरीब महिला, सुशिक्षित बेरोजगार, अल्पभूधारक, मजूर व भूमिहीन लोक हा व्यवसाय किफायतशीरपणे करतात. भारतात शेळीच्या जवळपास २० जाती आहेत. त्यामध्ये जमुनापारी, सिरोही, सुरती आणि महाराष्ट्रातील उस्मानाबादी व संगमनेरी शेळ्या या जातींना विशेष महत्त्व आहे.

शेळीपालनामध्ये चांगला व सकस चारा उपलब्ध झाल्यास शेळी २ वर्षात ३ वेळा विते. २ करडे देणाऱ्या शेळ्यांना विशेष महत्त्व आहे. बोकडाच्या मटणासाठी धार्मिक बंधने नाहीत. चांगल्या प्रतीचे मटण, दूध, खत (लेंडीखत) व कातडी इत्यादी उत्पन्न मिळते. शेळीला १२-१५ चौ. फूट जागा व करडास ७-८ चौ. फूट बंदिस्त जागा व २५ चौ. फूट मोकळी जागा आवश्यक असते.

आपल्याला जर शेळीपालन हा व्यवसाय नफ्यात करावयाचा असेल, तर गोठाबांधणीसाठी कमीत कमी खर्च व स्वतःचा चारा तयार केल्यास हा व्यवसाय उत्तम आहे. शेळीपालनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्या नोंदीसाठी विशेष महत्त्व आहे. जर आहाराच्या नोंदी, पिलांच्या नोंदी, गाभणकाळाच्या नोंदी

व इतर नोंदी जर आपण ठेवू शकलो नाही तर हे शेळीपालन व्यवसाय तोट्यात नेणारे प्रमुख कारण मानले जाते.

शेळीपालनामध्ये किंवा कोणत्याही पशुपालन व्यवसायामध्ये नोंदवही नसणे ही एक चिंतेची बाब म्हणण्यास काहीही हरकत नाही.

नोंदवहीचे महत्त्व व प्रमुख कारणे -

१) अपेक्षित वंशावळीची मादी व नर ओळखण्याकरिता.

२) शेळी व्यवस्थापनेमध्ये -

- शेळीची उत्पादनक्षमता चाचणी.

- अनुवंश व पैदाशीसाठी नर व मादी निवड.

- औषधोपचार नोंदी.

- शास्त्रोक्त शेळीपालन व प्रक्षेत्र व्यवस्थापन.

३) शेळीपालनातील उत्तम व निकृष्ट शेळ्या निवडून निकृष्ट प्रक्षेत्रामधून काढून टाकणे.

४) जर सर्व नोंदी असतील तर एखाद्या अडचणीवर मात करून शेळीचे उत्पादन वाढविण्यासंबंधी त्वरित निर्णय घेता येतो.

५) शेळीपालनामध्ये पुढे दिलेल्या वेगवेगळ्या तक्त्यांनुसार विविध नोंदी ठेवणे खूप आवश्यक आहे.

जर पुढे दिल्याप्रमाणे शेळीपालकांनी नोंदी ठेवल्या, तर तो शेळीपालन व्यवसाय नफ्यात आल्याशिवाय राहत नाही.

विक्री नोंदवही :-

विक्रीची तारीख	जनावराचा बिल्ला क्रमांक	विक्री वेळेस वय	विक्री वेळेसचे वजन	विक्री किंमत	कोणाला विकले	कापण्यासाठी/पैदाशीसाठी
----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	--------------	--------------	------------------------

करडांच्या वजनांची नोंदवही :-

करडाचा बिल्ला क्रमांक	नर/मादी	करडाची जन्मतारीख	जन्मतः वजन	वजनाची तारीख	वजन (कि.ग्रॅ.)	शेरा
-----------------------	---------	------------------	------------	--------------	----------------	------

शेळ्यांच्या वजनांची नोंदवही :-

शेळीचा बिल्ला क्रमांक	वजनाची तारीख	वजन (कि.ग्रॅ.)	वजन वाढ/घट	शेरा
-----------------------	--------------	----------------	------------	------

शेळी विण्याची नोंदवही :-

शेळीचा बिल्ला क्रमांक ---- संकराची तारीख ---- वापरलेला बोकड बिल्ला क्र./नाव ---- शेळी गाभ
गेली का? होय/नाही ---- शेळी व्यायल्याची तारीख ---- करडांची संख्या ---- करडांचा बिल्ला ----
करडाचे वजन ---- शेरा

----- नर ---- मादी ---- एकूण ---- क्रमांक/नाव/वर्णन ---- जन्मतः ---- ३ रा महिना --
-- ६ वा महिना ---- १ वर्ष ----

प्रत्येक शेळीबद्दलच्या माहितीची नोंदवही :-

शेळीचा बिल्ला क्रमांक ---- शेळीचे वर्णन ---- जन्मतारीख/ विकत घेतेवेळचे (अंदाजे) वय ---- खरेदी
तारीख (खरेदी केली असल्यास) ---- शेळीचा जन्मप्रकार एक/ जुळे/ तिळे ---- शेळीची जात ---- शेळी
वंशावळ ---- शेळीच्या विण्याच्या तारखा ---- शेरा

----- आई ---- बाप ---- दिनांक ---- शेळी व्यायली गाभाडली ---- एकूण करडांची
संख्या

----- नर ---- मादी ---- एकूण ----

कळपातील एकूण शेळ्यांची संख्या दर्शविणारी नोंदवही :-

सुरवातीची संख्या ---- संख्येत वाढ व कारणे ---- संख्येत घट व कारणे ---- दिवसअखेर जनावरे
प्रौढ ---- करडे ---- एकूण ---- नवीन जन्मलेली करडे ---- नवीन खरेदी ---- प्रौढ ---- करडे ---
- एकूण

नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या
---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या ---- नर ---- माद्या

रोजचा औषधोपचार नोंदवही :-

तारीख	बिल्ला क्रमांक	लक्षणे	उपचार
-------	----------------	--------	-------

मरतूक नोंदवही :-

जनावराचा बिल्ला क्रमांक	मृत्यूची तारीख	मृत्यूचे कारण
-------------------------	----------------	---------------