

शेळीपालन मार्गदर्शिका

शेळी पालन

शेळीपालन कसे करावे ?

शेळीला भारतात 'गरीबाची गाय' म्हणतात आणि कोरड्या जमिनीवर शेती करणाऱ्यांसाठी हा एक फार महत्वाचा घटक आहे. किरकोळ किंवा चढउतार असलेल्या पृष्ठभागाच्या जमिनी ह्या गाय किंवा इतर प्रकारच्या जनावरांसाठी चांगल्या नसतील, पण शेळी हा उत्तम पर्याय आहे. फार थोडी गुंतवणूक करून शेळी पालन हा किरकोळ आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी एक फायदेशीर उद्यम ठरू शकतो.

महाराष्ट्रातील शेळ्याच्या जाती

महाराष्ट्रातील शेळ्याच्या जाती, उस्मानाबादी शेळी, संगमनेरी शेळी, सुरती (खानदेशी/निवानी)

महाराष्ट्र राज्यातील शेळी मेंढीपालन व्यवसाय

राज्यात शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय हा शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून किफायतशीर ठरलेला आहे

शेळी-मेंढी प्रश्नावली

शेळी-मेंढी पालना विषयी विचारले जाणारे सर्व साधारण प्रश्न

...अशा आहेत शेळ्यांच्या जाती

शेळीपासून मांस, शिंगे व खुरे यांपासून डिंकासारखे पदार्थ, लहान आतड्यापासून शस्त्रक्रियेत टाके घालण्यासाठी दोरा (कॅट गट), हाडांपासून खत, खनिज मिश्रण, कातडीपासून उच्च प्रतीचे चामडे मिळते. काश्मिरी जातीच्या शेळ्यांकडून "पश्मिना" नावाची मऊसूत लोकर मिळते. अंगोरा जातीच्या शेळ्यांपासून "मोहेर" नावाची लोकर मिळते.

असे ठेवा करडांचे व्यवस्थापन

करडांच्या शरीरस्वास्थ्य सुयोग्य राखण्यासाठी सकस आहार, भरपूर व्यायाम आणि काटेकोर सांभाळ महत्वाचा आहे. करडांसाठी कप्पे मोकळे, हवेशीर, उबदार, कोरडे असणे गरजेचे असते. पशूज्जांच्याकडून करडांची तपासमीकरून घ्यावी.

शेळीपालनातील नोंदवहीचे अनन्यसाधारण महत्त्व

शेळीपालन हा व्यवसाय नफ्यात करावयाचा असेल, तर गोठाबांधणीसाठी कमीत कमी खर्च व स्वतःचा चारा तयार केल्यास हा व्यवसाय उत्तम आहे.

जगभरातून शेळीच्या स्थानिक प्रजाती होताहेत लुप्त

जगभरातील स्थानिक पातळीवर आढळणाऱ्या शेळीच्या अनेक प्रजातींची संख्या वेगाने कमी होत असल्याचे ऑस्ट्रिया (स्पेन) येथील संशोधकांनी केलेल्या सर्वेक्षण आणि संशोधनात आढळून आले आहे. रवंथ करणाऱ्या लहान प्राण्यांतील जैवविविधता कमी होण्याचा धोका असून या संवेदनशील प्रजाती वाचविण्यासाठी प्रयत्नांचा वेग वाढवणे गरजेचे ठरणार आहे.

थंडीत करडांची काळजी कशी घ्यावी?

जन्मानंतर लगेच शरीर वजनाच्या नोंदीवरून करडे अशक्त आहेत का सशक्त आहेत, याचा अंदाज बांधता येतो.

जोडधंद्यासाठी शेळी व मेंढीची कोणती जात निवडावी? नरांचे नियोजन कसे करावे?

राज्यातील शेळ्या व मेंढ्यांच्या जातींचा विचार करता उस्मानाबादी ही मांसासाठी उपयुक्त असलेली आणि संगमनेरी ही मांस व दुधासाठी उपयुक्त असलेली शेळीची जात आहे.

शेळ्या-मेंढ्यांतील आंत्रविषार रोगाचे नियंत्रण कसे करावे?

कोवळे गवत शेळ्या-मेंढ्यांनी भरपूर खाल्ल्यामुळे आंत्रविषार आजार होतो.

शेळीपालन कसे करावे ?

1. [हे कोण सुरू करू शकते?](#)
2. [सुरू करण्याची कारणे](#)
3. [तुमच्यासाठी कोणती प्रजाति चांगली आहे?](#)
4. [प्रजोत्पादन प्रबंधन](#)
5. [लसीकरण](#)
6. [शेळ्यांसाठी गोठा \(मेषगृहे\)](#)
7. [संगोपनाच्या पध्दती](#)
8. [शेळ्यांचा विमा](#)
9. [भारतामध्ये शेळ्यांचे फार्म](#)

शेळीला भारतात 'गरीबाची गाय' म्हणतात आणि कोरड्या जमिनीवर शेती करणाऱ्यांसाठी हा एक फार महत्वाचा घटक आहे. किरकोळ किंवा चढउतार असलेल्या पृष्ठभागाच्या जमिनी ह्या गाय किंवा इतर प्रकारच्या जनावरांसाठी चांगल्या नसतील, पण शेळी हा उत्तम पर्याय आहे. फार थोडी गुंतवणूक करून शेळी पालन हा किरकोळ आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी एक फायदेशीर उद्यम ठरू शकतो.

हे कोण सुरु करू शकते?

लघु आणि मध्यम शेतकरी
ज्यांच्याकडे जमीन नाही असे श्रमिक
सामान्य कुरणांची उपलब्धता

सुरु करण्याची कारणे

कमी भांडवल निवेश आणि लवकर प्राप्ती होणे
साधे आणि लहान शेड पुरेसे आहे
स्टॉल (एका जनावरास बांधण्याची जागा) फेड स्थितीत ठेवल्यास नफा देणारे
शेळ्यांचा उच्च प्रजोत्पादन दर
वर्षभराचे काम
चर्बी नसलेले मांस आणि कमी वसा असलेले व सर्व लोकांना आवडणारे
केव्हां ही विकून पैसे मिळविता येतात

तुमच्यासाठी कोणती प्रजाति चांगली आहे?

जमनापरी



चांगली उंची असलेले जनावर प्रौढ जमनापरीमध्ये चांगले सुबक बाकदार रोमन नाक आणि किमान 12 इंच लांबीचे हेलकावे घेणारे कान बोकडाचे वजन सुमारे 65 ते 85 किलोग्राम असते व शेळ्यांचे वजन 45 ते 60 किलोग्राम असते
प्रत्येक विण्याच्या वेळी एकच करडू सहा महिन्यांच्या करड्याचे वजन सुमारे 15 किलोग्राम असते
दर रोज किमान 2-2.5 लिटर दुधाचे उत्पादन

तेलीचेरी



शेळ्यांचा रंग पांढरा, भुरा किंवा काळा असतो एका विण्यात 2-3 करडी बोकडाचे वजन सुमारे 40 ते 50 किलोग्राम असते व
शेळ्यांचे वजन 30 किलोग्राम असते

बोअर



संपूर्ण विश्वभरात मांसाकरीता पाळतात वाढीचा दर तीव्र आहे बोकडाचे वजन सुमारे 110 ते 135 किलोग्राम असते व शेव वजन 90 ते 100 किलोग्राम असते 90 दिवसांच्या करड्याचे वजन 20-30 किलोग्राम असते

आहार प्रबंधन

चरण्याच्या जोडीला घन आहार दिल्यास उच्चतम वाढ दर मिळतो

प्रोटीनयुक्त हिरवा चारा जसे अकेसिया, ल्यूसर्न आणि कसावा तसेच आहारात नायट्रोजन स्रोत असणे महत्वपूर्ण आहे. शेतकरी शेताच्या कडेने अगाथी, सबाबुल आणि ग्लॅरिसिडियाची झाडे लावू शकतात आणि हिरवा चारा म्हणून देऊ शकत एक एकराच्या जमिनीच्या क्षेत्रात उगविलेली झाडे आणि चारा 15 ते 30 शेळ्यांना पोसण्यासाठी पुरेसा आहे.

घन आहार खाली दिल्याप्रमाणे तयार करता येऊ शकतो:

घटक	करड्याचा आहार	वृद्धि आहार	स्तनपान देणाऱ्या शेळीचा आहार	गर्भारशेळीचा आहार
ज्वारी	37	15	52	35
डाळी	15	37	---	---
तेलवड्या	25	10	8	20
गवताचा भुसा	20	35	37	42
खनिज मिश्रण	2.5	2	2	2
सामान्य मीठ	0.5	1	1	1
एकूण	100	100	100	100

करड्यांना पहिल्या 10 आठवड्यांत 50-100 ग्राम घन/सांद्रित आहार द्यायला पाहिजे.

वाढत्या वयाच्या करड्यांना 3-10 महिन्यांपर्यंत दररोज 100-150 ग्राम घन/सांद्रित आहार देण्यात आला पाहिजे.

गाभण असलेल्या शेळीला दररोज 200 ग्राम घन/सांद्रित आहार देण्यात आला पाहिजे.

1 लिटर दूध देणाऱ्या दुधारू शेळ्यांना दररोज 300 ग्राम घन/सांद्रित आहार देण्यात आला पाहिजे.

शेळ्यांच्या स्टॉलमध्ये उत्तम प्रकारच्या तांब्याने युक्त (950-1250 पीपीएम) असलेले मिनरल ब्लॉक्स पुरविण्यात यायला हवे.

प्रजोत्पादन प्रबंधन

लाभदायक शेळी पालनासाठी 2 वर्षांमध्ये शेळीने 3 वेळा व्यायला (किडिंग) हवे.

तीव्र वाढीच्या व मोठ्या आकाराच्या शेळ्यांचा वापर प्रजोत्पादनासाठी करावा.

प्रजोत्पादनासाठी एक वर्ष वयाच्या मादीचा उपयोग करावा.

मार्दीनी एका किडिंग नंतर 3 महिन्यांतच पुन्हा गर्भ धारण केल्यासच 2 वर्षांत 3 वेळा प्रजोत्पादन होऊ शकते.

शेळ्या सुमारे 18 ते 21 दिवसांच्या अंतराने माजावर येतात आणि ही अवस्था 24-72 तास टिकते.

माद्या माजावर आल्यावर काहीतरी दुखत असल्यासारखे जोराने ओरडतात. माजावर आल्याचे आणखी एक लक्षण म्हणजे शेषटी जोर-जोराने इकडे-तिकडे हलविणे. त्याच्या जोडीला, त्यांचे बाह्य जननेंद्रिय थोडे-से सुजल्यासारखे आणि योनिमार्गातील स्त्रावामुळे ओले व घाणेरडे दिसते. त्यांची भूक मंदावते आणि मूत्रत्यागाची वारंवारता वाढते. माजावर आलेली मादी स्वतः नर असल्यासारखी इतर मादीच्या अंगावर चढण्याचा प्रयत्न करते किंवा इतर मादीस अंगावर चढू देते.

माजावर येण्याची लक्षणे सुरु झाल्यावर 12 ते 18 तासांच्या काळांत मादीचा समागम घडविण्यात येतो.

काही माद्यांमध्ये माज 2-3 दिवस टिकतो. त्यामुळे त्यांचा समागम पुन्हा दुसऱ्या दिवशी घडवायला हवा.

गर्भावस्था काळ सुमारे 145 ते 150 दिवसांचा असतो, पण एक आठवडा पुढे-मागे होऊ शकतो. आधीच तयार राहिलेले बरे.

कृमि नष्ट करणे (पोटातील जंत नष्ट करणे)

समागमाच्या आधी माद्यांचे डीवर्मिंग करून पोटातील कृमि नष्ट करायला पाहिजे. ज्या शेळ्यांना जंत असतील त्या कमकुवत आणि संथ असतात. करड्यांचे डीवर्मिंग ते एक महिन्याचे झाल्यावर करावे. कृमि किंवा जंतांचे जीवनचक्र तीन आठवड्यांचे असते, म्हणून करडी दोन महिन्यांची झाल्यावर पुन्हा एकदा डीवर्मिंग करण्याची शिफारस केलेली आहे. विण्यापूर्वी 2 ते 3 आठवडे गाभण माद्यांचे डीवर्मिंग करण्यात यायला हवे. गर्भारपणाच्या आरंभिक काळात (2 ते 3 महिने गर्भपात होवू नये म्हणून माद्यांचे डीवर्मिंग करू नये.

लसीकरण

करड्यांना एन्टरोटॉक्सिमिया आणि धनुर्वाताच्या लसीकरणाचा प्रथम डोज 8 महिन्यांच्या वयात आणि पुन्हा 12 आठवड्यां झाल्यावर द्यावा. माद्यांना एन्टरोटॉक्सिमिया आणि धनुर्वाताच्या लसीकरणाचा डोज समागम काळाच्या 4 ते 6 आठवडे आधी आणि विण्याच्या 4 ते 6 आठवडे आधी द्यावा. नरांना वर्षातून एकदा एन्टरोटॉक्सिमिया आणि धनुर्वाताच्या लसीकरणाचा डोज द्यावा.

शेळ्यांसाठी गोठा (मेषगृहे)

1. डीप लिटर सिस्टम (जनावरांसाठी तृण शय्या)०



लहानसा कळप ठेवण्यासाठी पुरेशा आकाराचे शेड ज्यांमध्ये चांगले वातायन (Cross ventilation) असावे.

लिटरची (गवताच्या गादीची) उंची कमीत कमी 6 सें.मी. असावी.

लिटर तयार करण्यासाठी लाकडाचा भुगा, धान्याचा भुसा आणि शेंगांच्या सालपटांचा वापर करावा.

लिटरला थोड्या दिवसांनी वरखाली आलट-पालट करीत राहावे ज्याने घाण वास येत नाही.

दर दोन आठवड्यांनी लिटर सामग्री बदलावी.

प्रत्येक शेळीला सुमारे 15 चौरस फुट जागा हवी असते.

बाह्य-परान्नपुष्ट उपद्रव कमी होईल ह्याबाबत काळजी घेण्यात यायला हवी.

एक प्रौढ शेळी एका वर्षात सुमारे एक टन खत टाकते.

2. रेड्ड प्लॅटफॉर्म सिस्टम (उंचीवर असलेला मंच)



जमिनीपासून 3 ते 4 फुटांवर लाकडी तखत किंवा तारांची जाळी यांचा वापर ह्या पध्दतीत केला जातो.

ह्या पध्दतीत बाह्य-परान्नपुष्ट उपद्रव पुष्कळ कमी होण्याची शक्यता असते.

संगोपनाच्या पध्दती

सेमी इंटेन्सिव्ह सिस्टम (अर्ध-गहन पध्दती)

कमी कुरणे असतील अशा जागा, शेळ्यांना मुबलक हिरवा चारा देणे शक्य असेल आणि चरल्या नंतर घन आहार देता येईल.

इंटेन्सिव्ह सिस्टम

शेडमध्ये शेळ्यांना हिरवा चारा आणि घन आहार देण्यात येतो.

कुरणात चारणे नाही.

शेळ्यांसाठी गोठा (किंवा आश्रयस्थाने) डीप लिटर किंवा रेड्ड प्लॅटफॉर्म सिस्टमची असावीत.

शेळ्यांचा विमा

4 महिने वयापासून शेळ्यांचा विमा जनरल इन्शुरन्स कंपनीज् मार्फत काढला जाऊ शकतो.
अपघात किंवा रोगामुळे शेळीला मरण आल्यास विम्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

भारतामध्ये शेळ्यांचे फार्म

नादूर शेळी फार्म

शिवाजी पार्क शेळी फार्म

महाराष्ट्रातील शेळ्याच्या जाती

1. [उस्मानाबादी शेळी](#)
2. [संगमनेरी शेळी](#)
3. [सुरती \(खानदेशी/ निवानी\)](#)
4. [कोकण कन्याल बोकड](#)
5. [कोकण कन्याल शेळी](#)

उस्मानाबादी शेळी

उस्मानाबादी शेळी

शारिरीक गुणधर्म :

रंग : प्रामुख्याने काळा

कान : लोंबकळणारे

शिंंगे : मागे वळलेली

कपाळ : बर्हिचक्र

उंची : ६५ ते ७० सें.मी.

छाती : ६५ ते ७० सें. मी.

लांबी : ६० ते ६५ सें.मी.

वजन :

जन्मतः वजन : २.५ किलो

पूर्ण वाढ झालेल्या शेळीचे वजन. : ३० ते ३५ किलो

पूर्ण वाढ झालेल्या बोकडाचे वजन : ४५ ते ५० किलो

पैदाशीचे गुणवैशिष्ट्ये :

वयात येण्याचा काळ : ७ ते ८ महिने

प्रथम गाभण राहतांनाचे वय : ८ ते ९ महिने

प्रथम विण्याचे वय : १३ ते १४ महिने

दोन वितामधील अंतर : ८ ते ९ महिने

नर-मादी करडांचे जन्माचे प्रमाण. : १ : १

ऋतुचक्र (पुन्हा माजावर येण्याचा काळ) : २० ते २१ दिवस

संगमनेरी शेळी

शारिरीक गुणधर्म :

रंग - संगमनेरी शेळ्यामध्ये पांढरा (६६%) पांढरट तांबडा आणि तांबडा (१६%) रंग आढळतो.

नाक - तांबडे, काळा रंग आढळतो.

पाय - काळे, तांबडा रंग आढळतो.

शिंग - अंदाजे ८ ते १२% शेळ्या हया बिनशिंगी (भुंड्या) आढळतात, उर्व शेळ्यांमध्ये शिंगे आढळतात. शिंगाचा आकार, सरळ, मागे वळलेली आढळतात.

कान - कान प्रामुख्याने लोंबकळणारे परंतु काही शेळ्यामध्ये उभे किंवा समांतर आढळतात.

कपाळ - प्रामुख्याने बर्हिक्क आणि सपाट.

दाढी- संगमनेरी शेळ्यांमध्ये अगदी तुरळक प्रमाणात दाढी आढळते.

शेपटी - शेपटी बाकदार आणि सरासरी लांबी १८.४६+०.२५ सेमी आढळते.

स्तन - गोलाकार (४२%), वाडग्यासारखे (२५%), लोंबकळणारे (२२%) आढळतात. स्तनाचे गोलाकार आणि टोकदार आढळतात.

वजने :

वय	नर	मादी
अ) जन्मतः	२.४३+०.११	२.०८ ०.०९२
ब) ३ महिने	९.२० ०.३५	८.७२ ०.२८
क) ६ महिने	१६.२४ ०.९८	१३.८६ ०.२९
ड) १ वर्ष	२३.७२ ०.७१	२४.२१ ०.३७

पैदाशीचे गुणवैशिष्ट्ये :

वयात येणे (दिवस)- २४५.१९+७.४२

प्रथम माजावर येण्याचे वय (दिवस)- २४८.२३ १३.५६

प्रथम गाभण जाण्याचे वय (दिवस)-२८७.०९ १०.१६

प्रथम विताचे वय (दिवस) - ४३२.१८ १२.७७

माजाचा कालावधी (तास) - ४१.७३ ०.८०

दोन माजांमधील अंतर- २३.८८ ०.४४

दोन वेतांमधील अंतर (दिवस)-२३.८८ ३.५७

जन्मणा-या करडांची टक्केवारी-१.६२ ०.०४९

जन्मणा-या करडांची टक्केवारी १. एक- ४२.२५% २. जुळे- ५४.२३% ३. तिळे- २.८१% ४. चार- ०.७०%

दूध- ८० लिटर्स दूध उत्पादन ९० दिवसाच्या वेतामध्ये आढळते.

सुरती (खानदेशी/ निवानी)

सुरती (खानदेशी/ निवानी)

शारिरीक गुणधर्म :

रंग: पांढरा

कान: लांबट आणि रुंद

कास: चांगली मोठी

दुध उत्पादन : दररोज एक ते दिड केलो आणि एका विताच्या हंगामात एकूण १२० ते १५० किलो

वास्तव्य : गुजरातमध्ये आणि धुळे ,जळगांव जिल्ह्यांमध्ये

वजने :

जन्मतः वजन : २.५ किलो

पूर्ण वाढ झालेल्या शेळीचे वजन. : २५ ते ३०किलो

पैदाशीचे गुणवैशिष्ट्ये :

कोकण कन्याल बोकड

कोकण कन्याल शेळी

कोकण कन्याल

स्थान :कन्याल जातीच्या शेळ्या ह्या कोकणातील(मुंबई विभाग) समुद्र किनारी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आढळतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, सावंतवाडी, दोडामार्ग, लिह्या म्हणून ह्या प्रसिध्द आहे. आणि त्या भौगोलिक हवामानामध्ये ह्या शेळ्या वा

हे त्यांचे खास वैशिष्ट्ये आहे. कोकण कन्याल शेळी हे कोकणाचे भुषण आहे. कोकण कन्याल शेळीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे

शारीरिक गुणधर्म :

रंग:- वरच्या जबड्यावर पांढरा रंगचे पट्टे आढळतात.

पाय:- लांब, पायावर काळा पांढरा रंग आढळतो. पाय लांब आणि मजबूत असल्यामुळे शेळ्या चारा खाण्यासाठी टेकड्यावर चढू शक

कातडी:- कातडी मुलायम आणि गुळगुळीत असल्यामुळे शरीरावर पडणा-या पावसाच्या पाण्याचा चटकन निचरा होतो. शरीरावर केस आढळतात.

डोक :- नाकापासून कानापर्यंत दोन्ही बाजूस पांढरे पट्टे आढळून येतात.

कपाळ:- काळ्या रंगाचे, चपटे आणि रुंद असते.

कान:- काळा रंग आणि पांढ-या रंगाच्या कडा, चपटे लांब आणि लोंबणारे असतात.

शिंगे:- टोकदार, सरळ आणि मागे वळलेली आढळतात.

नाक:- स्वच्छ आणि रुंद आढळतात.

वजन :

जन्मतः वजन १.७६ ते २.१९ सरासरी १.१९ कि.

लिंग	शारीरिक वजन (कि)	उंची (सेमी)	छातीचा घेर (सेमी)	लांबी (सेमी)
बोकड	५२.५७	८३.००	९०.००	८४.००
शेळी	३२.८३	६८.६	७४.००	७१.००

पैदाशीचे गुणवैशिष्ट्ये :

ह्या शेळ्या नियमित आणि वर्षभर माजावर येतात. जुळ्याचे प्रमाण ६६% आढळते उन्हाळ्यामध्ये विणा-या शेळ्यामध्ये जुळ्याचे ५ जास्त आढळते.

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत

: https://ahd.maharashtra.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=138&lang=mr

महाराष्ट्र राज्यातील शेळी मेंढीपालन व्यवसाय

1. महाराष्ट्रातील शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या:-
2. महाराष्ट्रातील शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय :-
3. महाराष्ट्र राज्यातील वधगृहे
4. शेळ्या-मेंढ्यापासून मिळणा-या मांसाची निर्यात:-
5. राज्यातील लोकरीचे प्रमुख बाजार खालीलप्रमाणे

6. शेळीपासून मिळणा-या दुधाचे उत्पादन:-
7. महाराष्ट्र राज्यातील शेळ्या-मेंढयांचे प्रमुख बाजार
8. बाजार गावांचे नाव
9. राज्यातील शेळी-मेंढी पालन करणा-या सहकारी संस्था:-

राज्यात शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय हा शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून किफायतशीर ठरलेला आहे.पशुपालन व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा भाग आहे कारण राज्यातील ७० टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय दुष्काळी व निमदुष्काळी भागात मेंढपाळांकडून विशेषतः धनगर समाजाकडून केला जातो. शेळ्यांपासून मांस, दुध, कातडी, लेंडीखत आणि याबरोबरच मेंढयापासून लोकर उत्पादन मिळते.

हा व्यवसाय अत्यंत कष्टमय असून मेंढपाळ ऊन, वारा, पाऊस यांचा विचार न करता आणि सर्व सुखसोयी न उपभोगता दिवस रात्र मेंढयांच्या कळपात राहून हा व्यवसाय करतात.अतिपाऊस, रोगराई यामुळे हजारो मेंढया मृत्युमुखी पडतात. हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने केला जात असल्यामुळे मेंढपाळ विमा वैगेरे उतरवित नाहीत. मेंढपाळांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. वाढते शहरीकरण व दिवसेंदिवस कमी होत जाणारी गायरान क्षेत्रे त्यामुळे हा व्यवसाय पुढे टिकून राहणे कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यात लोकरीची कुठलीही संघटित बाजारपेठ नाही.

महाराष्ट्रातील शेळ्या-मेंढयांची संख्या:-

अ.क्र.	विभाग	मेंढयांची संख्या	लोकर उत्पादन (मे.टन) सन २००८-२००९	शेळ्यांची संख्या	दुध उत्पादन सन २००८-२००९
१	मुंबई (कोकण)	३१२६	१२.९५९	३५२११२	१०.१८६
२	नाशिक	१३७७३७६	५६६.२२५	३१७३५५५	७७.६९२
३	पुणे	१६२६९७६	७७७.११२	२३६९०३७	६३.७७८
४	औरंगाबाद	२३५५०९	१५८.३९२	११८५१६५	४६.७९५
५	लातूर	१६५९१०	८१.५०८	९१९३९५	१९.७९५
६	अमरावती	१९८५४४	७४.२९८	१४४०८१०	३९.१६३
७	नागपूर	६९८९०	३६.७७३	१५४११०७	२०.२६९

		३२५७५६२	१७०७.२८७	१०९८११८१	२७७.२५०
--	--	---------	----------	----------	---------

महाराष्ट्रातील शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय :-

राज्यातील मेषपालन व्यवसाय जवळपास एक लाख कुटुंबांकडून केला जातो, तर ९५ टक्के खेड्यामध्ये ४८ लाख कुटुंबांकडून शेळीपालन केले जाते. महाराष्ट्रातील मांसाचे उत्पादन:- महाराष्ट्र राज्याच्या सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार सन २००८-२००९ मध्ये शेळ्या-मेंढयापासून मिळणा-या मांसाचे उत्पादन हे एकूण मांस उत्पादनाच्या ३४.५२ टक्के (मेंढी ११.३४ टक्के आणि शेळी २३.१८ टक्के) आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात शेळ्या-मेंढयापासून मिळणारे सरासरी उत्पादन हे ११ कि.ग्रॅ एवढे आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सन २००८-२००९ मधील मांस उत्पादनाचा तक्ता खालिलप्रामाणे आहे.

अ.क्र.	प्रकार	कत्तल केलेल्या प्राण्यांची संख्या	सरासरी मांस उत्पादन/ प्राणी	एकूण मांस उत्पादन	टक्केवारी
१	बैल	५११.४२१	१२६.२२३	६४.५५३	२५.२१
२	म्हशी	७०३.११५	१३८.७३८	९७.५४९	३८.१०
३	मेंढया	२४६६.१८३	११.७७२	२९.०३३	११.३४
४	शेळ्या	५११२.८३८	११.६११	५९.३६६	२३.१८
५	वराह	२१८.४०४	२५.२७४	५.५२०	२.१५

महाराष्ट्र राज्यातील वधगृहे

अ.क्र.	जिल्हा	वधगृहाची संख्या	अ.क्र.	जिल्हा	वधगृहाची संख्या
१	बृहन्मुंबई	१	१७	बीड	११
२	ठाणे	३	१८	औरंगाबाद	११
३	रायगड	१	१९	जालना	५
४	सिंधुदुर्ग	२	२०	बुलढाणा	४७

५	नाशिक	१०	२१	परभणी	६
६	धुळे	४	२२	नांदेड	१७
७	नंदुरबार	५	२३	हिंगोली	११
८	जळगांव	१९	२४	अकोला	२८
९	अहमदनगर	७	२५	वाशिम	१४
१०	पुणे	८	२६	अमरावती	२६
११	सातारा	१२	२७	यवतमाळ	३०
१२	सांगली	२	२८	वर्धा	६
१३	कोल्हापूर	१३	२९	नागपूर	१४
१४	सोलापूर	४	३०	भंडारा	१
१५	लातूर	६	३१	गडचिरोली	३
१६	उस्मानाबाद	४	३२	चंद्रपूर	७
			एकूण		३३८

शेळ्या-मेंढयापासून मिळणा-या मांसाची निर्यात:-

जगातील सन २००७ मध्ये मेंढयापासून मिळणा-या मांसाचे उत्पादन ८.८९ दशलक्ष टन तर शेळ्यापासून मिळणा-या मांसाचे उत्पादन ५.१४ दशलक्ष टन होते. भारताचा शेळ्यांपासून मिळणा-या मांसाच्या उत्पादनामध्ये दुसरा तर मेंढयांपासून मिळणा-या मांसाच्या उत्पादनामध्ये सातवा क्रमांक लागतो. सन २००६-२००७ मध्ये शेळ्या-मेंढयाच्या मांसाचे निर्यात शुल्क ६५.८७ कोटी होते. हे आता सन २००७-०८ मध्ये वाढून १३४.१० कोटी एवढे झालेले आहे. लोकर उत्पादन:-

राज्यातील लोकर प्रामुख्याने काळी-पांढरी-मिश्र रंगाची आहे. लोकर कातरणी ही वर्षातून दोनदा केली जाते. पहिली जून-जुलैमध्ये तर दुसरी ही साधारणतः त्यानंतर सहा महिन्यांनंतर केली जाते. महाराष्ट्र राज्यातील मेंढयांपासून सरासरी ५८५ ग्रॅम एवढी लोकर उत्पादित होते. सन २००८-०९ मधील राज्याचे लोकरीचे उत्पादन १७०७ मॅटन एवढे होते.

राज्यात एकूण उत्पादित होणा-या लोकरीपैकी २० टक्के लोकर घोंगडया व जेन उत्पादनाची वापरली जाते तर उर्वरित ८० टक्के लोकर उत्तरेकडील राज्यातील हरियाणा, पंजाब येथील व्यापारी, मिल मालक लष्करासाठी लागणा-या बरेंक ब्लॅकटच्या उत्पादनासाठी खरेदी करतात.

राज्यातील लोकरीचे प्रमुख बाजार खालीलप्रमाणे

अ.क्र.	बाजाराचे नांव	जिल्हा	अ.क्र.	बाजाराचे नांव	जिल्हा
१	लोणंद	सातारा	१५	पारनेर	अहमदनगर
२	फलटण	सातारा	१६	लोणी	अहमदनगर
३	म्हसवड	सोलापूर	१७	श्रीरामपूर	अहमदनगर
४	नाझरे	सोलापूर	१८	नेवासा	अहमदनगर
५	महूद	सोलापूर	१९	पाथर्डी	अहमदनगर
६	करमाळा	सोलापूर	२०	शिरूर	पुणे
७	सांगोला	सोलापूर	२१	दोंड	पुणे
८	जुनोनी	सोलापूर	२२	जालना	जालना
९	नातेपुते	सोलापूर	२३	परळी	बीड
१०	जवळा	सोलापूर	२४	धारूर	बीड
११	पिलीव	सोलापूर	२५	मनमाड	नाशिक
१२	ढालगांव	सांगली	२६	सिन्नेर	नाशिक
१४	रशिन	अहमदनगर	२७	नांदगांव	नाशिक

१४	संगमनेर	अहमदनगर	२८	विजापूर	औरंगाबाद
----	---------	---------	----	---------	----------

शेळीपासून मिळणा-या दुधाचे उत्पादन:-

सन २००८-०९ मध्ये राज्याचे शेळीपासून मिळणा-या दुधाचे उत्पादन २७७.२४८ हजार मॅ.टन होते. महाराष्ट्रातील शेळ्यांचे एका दिवसाचे सरासरी उत्पादन २१९ ग्रॅम्स आहे. राज्यामध्ये उत्पादित होणा-या दुधापैकी एकूण ४ टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील दुध उत्पादनाचा तपशिल खालिलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.प्रकार	दुध देणा-या प्राण्यांची संख्यासरासरी दैनंदिन दुधएकूण दुध उत्पादन	(लाख)	उत्पादन	(मॅ.टन)
१ संकरित गायी	११८०	६.५४१	२८१७.१६६	
२ गायी (संकरित गायी वगळून)	१९४३	१.५०३	१०६६.२४८	
३ म्हैस	२३९५	३.७६८	३२९४.४९५	
४ शेळी	३४७५	०.२१९	२७७.२४८	

७४५५.१५७

महाराष्ट्र राज्यातील शेळ्या-मेढ्यांचे प्रमुख बाजार

अ.क्र.	बाजार गावांचे नाव	तालुका	जिल्हा	बाजार दिवस
१	रेणापुर	रेणापूर	लातूर	शुक्रवार
२	मुरुड	लातूर	लातूर	मंगळवार
३	खाजगी	उमरगा	उस्मानाबाद	गुरुवार
४	नैकनूर	बीड	बीड	रविवार

५	बार्शी	बार्शी	सोलापूर	शनिवार
६	वैराग	बार्शी	सोलापूर	बुधवार
७	कळंब	कळंब	उस्मानाबाद	सोमवार
८	अणपूर	तुळजापूर	उस्मानाबाद	गुरुवार
९	परांडा	परांडा	उस्मानाबाद	रविवार
१०	पारोदा	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	रविवार
११	भूम	भूम	उस्मानाबाद	गुरुवार
१२	येणपूर	उमरगा	उस्मानाबाद	सोमवार
१३	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	गुरुवार
१४	जळकोर	तुळजापूर	उस्मानाबाद	शनिवार

राज्यातील शेळी-मेंढी पालन करणा-या सहकारी संस्था:-

महाराष्ट्रात एकूण २२५० शेळी-मेंढ्यांच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यांचा तपशिल खालिलप्रमाणे

१. पश्चिम महाराष्ट्र - ४५०
२. मराठवाडा - ३८०
३. विदर्भ - १७०
४. कोकण - २५
५. खानदेश - १२००
- एकूण - २२२५

महाराष्ट्र राज्यातील शेळ्या-मेंढ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या अशासकीय संस्था

१. निंबकर अग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (NARI) फलटण.
२. BAIF डेव्हलपमेंट रिसर्च फॉउंडेशन उरळीकांचन पुणे.
३. अंतरा, पुणे.
४. BOSCO, ग्रामिण विकास केंद्र, कडेगांव, नगर-पुणे- मार्ग, अहमदनगर
५. रुरल अग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट नारायणराव (RAIN).
६. कृषी विज्ञान केंद्र बारामती जिल्हा पुणे.

शेळी-मेंढी प्रश्नावली

१. महाराष्ट्रातील शेळ्यांच्या व मेंढ्यांच्या जाती कोणत्या आहेत?
२. पैदाशीकरिता शेळ्यांची निवड कशी करावी ?

3. पैदाशीकरिता कळपामध्ये किती बोकड ठेवावेत ?
4. शेळी -मेंढीपालन विषयक प्रशिक्षणाची सुविधा कुठे उपलब्ध आहे?
5. शेळ्यांच्या कोकण कन्याल जातीबद्दल मार्गदर्शन व्हावे.
6. वाडेबांधकामासाठी किती जागेची आवश्यकता असते ?
7. शेळ्यांच्या आहारामध्ये अझोला विषयक मार्गदर्शन व्हावे.
8. शेळ्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे?
9. शेळ्यांच्या आहाराबाबत मार्गदर्शन व्हावे.
10. शेळ्या-मेंढ्यांचे वय कसे ओळखावे ?

महाराष्ट्रातील शेळ्यांच्या व मेंढ्यांच्या जाती कोणत्या आहेत?

महाराष्ट्रामध्ये उस्मानाबादी, संगमनेरी, कोकण कन्याल आणि सुरती या शेळ्यांच्या तर दख्खनी व माडग्याळ या मेंढ्यांच्या प्रमुख जाती आहेत. दख्खनी मेंढ्यांमध्ये संगमनेरी, लोणंद, सांगोला (सोलापूर) आणि कोल्हापूरी हे उपप्रकार आढळतात.

पैदाशीकरिता शेळ्यांची निवड कशी करावी ?

1. जातीची सर्व लक्षणे बरोबर असावीत, शक्यतो त्यांच्यामध्ये उभयगुण (मांस आणि दूध) असावेत.
2. सरासरी वय एक वर्षाचे पुढे, वजन ३०-३२ किलोच्या पुढे असावे.
3. मादीचा चेहरा थोडासाही नरासारखा नसावा. अशा मादया द्विलिंगी असू शकतात व पैदाशीकरिता निरोपयोगी असतात.
4. कपाळ रुंद असावे, मान लांब आणि पातळसर असावी, डोळे तरतरीत असावेत.
5. पाठ मानेपासून शेपटापर्यंत शक्यतो सरळ असावी, बाक नसावा. पाठीमागून पाहिल्यावर मांड्यात भरपूर अंतर असावे, योनीमार्ग स्वच्छ असावा.
6. कास मोठी आणि लुशलुशित, दोन्ही सड एकाच लांबीचे आणि जाडीचे, दुध काढल्यावर लहान होणारे असावेत.
7. नियमितपणे माजावर येणारी, न उलटणारी, सशक्त, निरोगी, जुळी पिल्ले देणारी, जास्त दुध देणारी, स्वतःच्या करडांविषयी मातृत्वाची भावना असणारी शेळी निवडावी.

पैदाशीकरिता कळपामध्ये किती बोकड ठेवावेत ?

शेळ्यांच्या संख्येच्या तीन ते चार टक्के पैदाशीचे बोकड ठेवावेत. म्हणजेच २ ते ३० शेळ्यांना एक जातीवंत बोकड हे प्रमाण ठेवावे. दर दोन ते तीन वर्षांनी कळपातील बोकड बदलावा म्हणजे समरक्त पैदास टाकून सशक्त करडे जन्माला येतील.

शेळी -मेंढीपालन विषयक प्रशिक्षणाची सुविधा कुठे उपलब्ध आहे?

महामंडळाच्या सर्व प्रक्षेत्रांवर शेळी-मेंढी पालन विषयक पाच दिवसांचे तसेच मुख्यालय पुणे येथे तीन दिवसांचे प्रशिक्षण दर महिन्याला घेतले जाते. याशिवाय राहूरी कृषी विद्यापीठ, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच काही अशासकीय संस्था जसे निंबकर अग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (NARI) फलटण, रुरल अग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट नारायणराव (RAIN) येथेही सदर प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

शेळ्यांच्या कोकण कन्याल जातीबद्दल मार्गदर्शन व्हावे.

कोकण कन्याल या जातीच्या शेळ्या कोकणातील समुद्रकिनारी असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ, सावंतवाडी, दोडामार्ग या भागांमध्ये आढळतात. कोकण कन्याल ही जात मुख्यतः मांस उत्पादनासाठी असून १ ते १.५ वर्ष वयाच्या बोकडाचा मटनाचा उत्तारा ५६.७८ टक्के एवढा आहे. या शेळ्यांबाबत अधिक माहितीसाठी फलोत्पादन पशुसंवर्धन संशोधन केंद्र निळेली, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग किंवा विभागप्रमुख पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, डॉ.ब.सा.कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी येथे संपर्क साधावा.

वाडेबांधकामासाठी किती जागेची आवश्यकता असते ?

शेळ्या -बोकड आणि करडांना खालील प्रमाणे बंदिस्त जागा आणि किमान दुप्पट जाळीच्या कुंपणाची मोकळी जागा फिरण्यासाठी आवश्यक आहे.

अ.क्र.	वयोगट	छताखालील चौ.मी.	खुली चौ.मी.
१	करडे	०.४	०.८
२	शेळ्या	१ ते १.५	३.००
३	पैदाशीचा नर	२	४.०
४	गाभण दुभत्या	२	४

शेळ्या-मेढ्यांच्या लसीकरणाविषयी माहिती द्यावी.

महिना	प्रतिबंधक
एप्रिल	आंत्रविषार, घटसर्प
मे	पी.पी.आर.
सप्टेंबर	मागील वेतात जन्मलेल्या करडांना आंत्रविषार, घटसर्प रोगाचे लसीकरण करणे.
डिसेंबर	लाळ्याखुरकूत

शेळ्यांच्या आहारामध्ये अझोला विषयक मार्गदर्शन व्हावे.

अझोला जल शैवालासारखे दिसणारे तरंगते फर्न आहे. सामान्यपणे अझोला उथळ पाण्याच्या जागी उगविते व याची वाढ फार भराभर होते. अझोला हे शेळ्या-मेढ्यांच्या आहारामध्ये प्रथिने आवश्यक अमिनो ॲसिड व जीवनसत्त्वे स्रोत म्हणून वापरता येते. अझोला जनावरांना सुलभतेने पचणारे असून घन आहारात मिसळून किंवा नुसतेच जनावरांना देऊ शकतो. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी सहाय्यक प्राध्यापक, पशुविज्ञान व पशुविस्तार विभाग, क्रांतिसिंह नाना पाटील

पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ. ता. खंडाळा, जि. खंडाळा, जि. सातारा. (फोन नं. ०२१६९-२४४२४३) येथे संपर्क साधावा.

शेळ्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे?

किफायतशीर शेळीपालनासाठी व्यवस्थापन :

1. शेळ्यांच्या संख्येच्या ३ ते ४ टक्के पैदाशीचे बोकड ठेवावे म्हणजेच २५ ते ३० शेळ्यांना १ बोकड हे प्रमाण ठेवावे.
2. दर दोन वर्षांनी शेळ्यांमधील बोकड बदलावा म्हणजे समरक्त पैदास टाळून सशक्त करडे जन्माला येतील.
3. गाभण / दुधाळ शेळ्यांना आणि पैदाशीच्या बोकडांना पैदास काळात त्यांच्या वजनानुसार अतिरिक्त हिरवाचारा, वाळलेला चारा व खुराक देण्यांत यावा.
4. सर्व शेळ्यांना नजिकच्या पशुधन विकास अधिका-यांच्या सल्ल्याने लसीकरण आणि जंतप्रतिबंधक औषधोपचार नियमितपणे करावा.
5. गोचीड, उवा इत्यादी बाह्य किटकांच्या प्रतिबंधासाठी किटकप्रतिबंधक औषध फवारणी करावी.
6. शेळ्यांचा विमा उतरविण्यांत यावा.
7. एखादी शेळी आजारी/मृत पावल्यास तात्काळ नजिकच्या पशुचिकित्सालयासी संपर्क साधावा. तीची परस्पर विल्हेवाट लावू नये.
8. शेळ्यांसाठी योग्य आकाराचा स्वस्त निवारा करावा आणि त्याची स्वच्छता ठेवण्यांत यावी.
9. शेळ्यांना दररोज आवश्यकतेनुसार दोनदा स्वच्छ आणि थंड पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.

शेळ्यांच्या आहाराबाबत मार्गदर्शन व्हावे.

- हिरवा चारा : ३ ते ४ कि. प्रती शेळी, प्रतिदिन
- वाळलेला चारा : ०.७५ ते १.०० किलो
- प्रतिशेळी, प्रतिदिन.
- संतुलित आहार : २०० ते २५० ग्रॅम प्रतिशेळी, प्रतिदिन.

शेळ्या-मेंढ्यांचे वय कसे ओळखावे ?

करडास जन्मल्यानंतर पहिल्या आठवड्यात समोरच्या दुधी दातांच्या मधल्या तीन जोड्या येतात. बाहेरची चौथी जोडी वयाच्या चौथ्या आठवड्यात उगवते. कालांतराने करडू जसजसे मोठे होते जसजसे हे दुधी दात पडतात व त्याजागी कायमचे दात उगवतात. त्याचा कालावधी खालीलप्रमाणे पहिली जोडी - १५ ते १८ महिने दुसरी जोडी- २० ते २५ महिने तिसरी जोडी- २४ ते ३१ महिने चौथी जोडी- २८ ते ३५ महिने या विशिष्ट दातावरून शेळी- बोकड यांच्या वयाचा अंदाज येतो.

शा आहेत शेळ्यांच्या जाती

1. देशातील जाती :
2. आकारमानानुसार वर्गीकरण :
3. शेळ्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनानुसार शेळ्यांचे प्रकार :
4. शेळ्यांची वैशिष्ट्ये :

शेळीपासून मांस, शिंगे व खुरे यांपासून डिकसारखे पदार्थ, लहान आतड्यापासून शस्त्रक्रियेत टाके घालण्यासाठी दोरा (कॅट गट), हाडांपासून खत, खनिज मिश्रण, कातडीपासून उच्च प्रतीचे चामडे मिळते. काश्मिरी जातीच्या शेळ्यांकडून "पश्मिना" नावाची मऊसूत लोकर मिळते. अंगोरा जातीच्या शेळ्यांपासून "मोहेर" नावाची लोकर मिळते.

देशातील जाती ः

- 1) हिमालयीन पर्वत रांगा ः (जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तरांचल) जाती ः गुडडी, चेगू आणि चांगाथांगी इ.
- 2) उत्तर-पश्चिम विभाग ः (हरियाना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाचे उत्तर - पश्चिम भाग) जाती ः बिटाल, कच्छी, झालवाडी, सुरती, मेहसाणा, गोहिलवाडी, मारवाडी, सिरोंही, जखराना, बारबरी, जमनापारी इ.
- 3) दक्षिण विभाग ः (महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाचे काही भाग) जाती ः उस्मानाबादी, कन्नी अडू, मलबारी, संगमनेरी इ.
- 4) पूर्व विभाग ः (बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणिभारताचा उत्तर-पूर्व विभाग) जाती ः काळी बंगाली, गंजाम इ.

आकारमानानुसार वर्गीकरण ः

- 1) मोठ्या आकाराच्या शेळ्या ः जमुनापारी, बिटाल, जखराना, झालवाडी, सिरोंही इ.
- 2) मध्यम आकाराच्या शेळ्या ः मारवाडी, कच्छी, सुरती, बारबरी, मेहसाणा, गोहिलवाडी, कन्नीअडू, मलबारी, संगमनेरी, उस्मानाबादी, गंजाम, चांगाथांगी, चेगू आणि गुडडी इ.
- 3) लहान आकाराची शेळी ः काळी बंगाली.

शेळ्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनानुसार शेळ्यांचे प्रकार ः

- 1) दूध व मांस (दुहेरी उद्देश) ः जखराना, जमुनापारी, बिटाल, झालवाडी, गोहिलवाडी, मेहसाणा, कच्छी, सिरोंही, बारबरी, संगमनेरी, मारवाडी इ.
- 2) मांसोत्पादनासाठी ः काळी बंगाली, उस्मानाबादी, गंजाम, मलबारी, कन्नीअडू इ.
- 3) मांस व लोकर उत्पादनासाठी ः चांगाथांगी, चेगू, गुडडी इ.राज्यांत संगमनेरी व उस्मानाबादी या जाती प्रचलित

असल्या तरी खानदेशातील काठेवाडी, खानदेशी, कोकणातील कन्याळ, पाटण तालुक्यातील कुई या जाती दूध व मांसासाठी उत्तम असूनही त्यांचे गुणधर्म निश्चित झालेले नाहीत.

भारतात केल, खागणी, बिरारी, चोरखा, दख्खनी, जौनपुरी, कन्नी, वेलाडू, कोदीवली, मालकणगिरी, नागमेसेहिल, ओरिसा ब्राउन, पंतजा, पर्वतसर, रामधन, शेखावती, शिंगारी यांसारख्या कितीतरी जाती दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.

शेळ्यांची वैशिष्ट्ये ः

अ) या जाती कोणत्याही प्रकारच्या हवामानात तग धरू शकतात.

ब) मुख्य पिकांपासून मिळणाऱ्या उपप्रकारच्या उत्पादनावर शेळ्या सहजगत्या तग धरू शकतात.

क) निकृष्ट प्रकारच्या खाद्याचे, गवताचे आणि अपारंपरिक खाद्याचे दूध, मांस आणि कातडीमध्ये रूपांतर उत्तम पद्धतीने करतात.

ड) शेळ्या सेंद्रिय पद्धतीने पालनास उपयुक्त असून, सर्वसाधारण रोगांना सहजासहजी बळी पडत नाहीत.

इ) शेळ्या दूरवर रानात, डोंगरकपाऱ्यांत चरण्यास जाऊ शकतात, तसेच कमीत कमी भांडवली गुंतवणुकीत व्यवस्थापन करणे सहज शक्य असते. कोणत्याही वातावरणाशी समरस होण्याची नैसर्गिक क्षमता असल्यामुळे कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या निवाऱ्याची गरज नसते.

संपर्क ः 02426 - 243455

अखिल भारतीय समन्वित शेळी संशोधन प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

माहिती संकलन: श्री. दत्तात्रय उरमुडे

स्त्रोत: अग्रोवन- [एँग्रो व्हिजन](#)

<http://www.agrowon.com/Agrowon/20130217/5451744907491160459.htm>

असे ठेवा करडांचे व्यवस्थापन

1. [आरोग्य व्यवस्थापन -](#)
2. [करडांची वाढ -](#)
3. [वेळीच ओळखा जनावरांतील आजार...](#)
4. [प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ः](#)

करडांच्या शरीरस्वास्थ्य सुयोग्य राखण्यासाठी सकस आहार, भरपूर व्यायाम आणि काटेकोर सांभाळ महत्वाचा आहे. करडांसाठी कप्पे मोकळे, हवेशीर, उबदार, कोरडे असणे गरजेचे असते. पशूतज्ज्ञांच्याकडून करडांची तपासमीकरून घ्यावी.

करडांच्या वाढीच्या वयाचे साधारण तीन टप्पे असतात. जन्मापासून दोन महिने वय, दोन ते चार महिने वय आणि चार ते सहा महिने वय अशा गटांत करडांची विभागणी योग्य ठरते. महत्त्वाची बाब अशी, की पहिल्या सहा महिन्यांत दर पंधरा दिवसांस करडे सांभाळण्याचे व्यवस्थापन गरजेनुसार बदलावे लागते. जन्मानंतर लगेच शरीरवजनांच्या नोंदीवरून करडे अशक्त आहेत का सशक्त आहेत, याचा अंदाज बांधता येतो. अशक्त करडे पहिले पंधरा दिवस सांभाळावी लागतात बाह्य वातावरण अतिउष्ण असो किंवा अति थंड असो, करडांच्या कप्प्यात गरजेनुसार पंखे किंवा विद्युत दिवे लावून तापमान नियंत्रित करणे प्रमुख गरजेचे समजावे. करडांच्या कप्प्यात असणारे तापमान 35 ते 38 अंश सेल्सिअस एवढे असावे. कप्प्यात तापमान वाढीस पूरक असल्यास करडांच्या शरीरातील ऊर्जा (शरीर तापमान) बाह्य वातावरणाप्रमाणे बदलून संतुलित राहण्यासाठी खर्ची पडत नाही.

आरोग्य व्यवस्थापन -

करडांच्या कप्प्यातील तापमानाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मरतुकीचे सत्र सुरू होते. अति थंड बाह्य हवामानास गोठ्यात उबदारपणा, उष्णतामान वाढविण्यासाठी विद्युत दिवे उपयोगी पडतात. अति थंड वातावरणात आर्द्रतेमुळे करडांचे कप्पे लवकर कोरडे होत नाहीत. लेंड्या, पातळ हगवण किंवा मूत्र यामुळे कप्प्यात ओल राहते; मात्र दिवसातून तीन-चार वेळा जागा बदलून करडे कोरड्याच ठिकाणी राहतील याची काळजी घ्यावी. करडांच्या कप्प्यात गोणपाटाचा वापर केल्यास ओल शोषली जाऊ शकते, जमिनीत चुनखडीचा थोडा वापर ओल शोषण्यास मदतीचा ठरतो. फरशीपेक्षा मुरूम, मातीची धुम्मस केलेली जमीन अधिक गरम असते. बाह्य वातावरणात थंडी असल्यास दुरडीखाली चार-पाच करडे दिवसभर ठेवून काम टाळणारे शेळीपालक सर्वत्र दिसतात. एका दुरडीखाली चार-पाच करडे, म्हणजे मोकळी हवा मिळणे कठीण आणि श्वसनाचे रोग पसरण्यास वाव निर्माण होतो. दुरडीमुळे शरीर हालचाल पूर्ण बंद होते. व्यावसायिक शेळी प्रकल्पावर दुरडीमुळे होणारे सगळे तोटे गांभीर्याने टाळले जाणे आवश्यक ठरते. सतत चार-पाच दिवस पावसाची झड असणाऱ्या भागात करडांच्या सांभाळाचा प्रश्न अधिक क्लिष्ट असतो. ऊब निर्माण करण्यासाठी रात्री व पहाटे स्वतःच्या देखरेखीखाली शेकोट्या कराव्यात. भिजलेल्या शेळ्यांबरोबर करडे ठेवू नयेत.

ऋतू कोणताही असो, करडांना स्वच्छ, निर्जंतुक पाणी द्यावे. बाह्य वातावरणात एकदम झालेला बदल करडांना सहन होऊ शकत नाही अचानक घडणारे बदल करडांच्या शरीरात ताण निर्माण करतात. अशा वेळी रोगजंतू फैलावतात. प्रतिकूल

Enjoy millions of documents & more free for 30 days

ल्याने
तात.

करडांची वाढ -

दूध पिणाऱ्या करडांस शेळीपासून दूर सांभाळणे गरजेचे असते. पहिल्या पंधरवड्यात चार-पाच वेळा दूध पिण्यासाठी तास अर्धा तास मातेजवळ ठेवावे. इतर वेळी वेगळ्या कप्प्यात हिंडू द्यावे. व्यायाम नसणारी करडे अपचनास बळी पडतात. करडांच्या कप्प्यात मोकळी जागा असल्यास त्यांना मोकळे फिरणे, उड्या मारणे शक्य होऊ शकेल. दुरडीखाली सतत बंदिस्त झालेली करडे अशक्त आणि दुर्बल राहतात. आज सुद्धा असणारी करडे भविष्यात कोणत्याही कारणाने आजारी पडणार नाहीत, यासाठी त्यांची शरीरक्षमता काही प्रमाणात वाढविता येते. असे उपाय प्रतिबंधात्मक लसीकरणाप्रमाणे उपयुक्त ठरतात. करडांना पावसाची झड सुरू होताच प्रतिजैविकांच्या गोळ्या आणि जीवनसत्त्वांच्या मात्रा देता येतात. असा उपचार शरीर ताण निर्माण होऊ न देण्यास उपयुक्त ठरतो.

करडांत माती चाटणे, परजीवी प्रसार होणे, बाह्य परजीवींचा त्रास असणे, असे प्रकार नेहमीच दिसून येतात. बाह्य परजीव सुद्धा करडांकडे फिरकत नाहीत. याउलट अशक्त करडे दिवसभर माश्यांच्या प्रादुर्भावाने त्रस्त असतात. वाढीस लागलेल्या करडांना क्षार कमतरता असल्यास ते माती चाटतात आणि यातूनच पोटात जंतूही वाढतात. प्रत्येक करडास जन्मानंतर 1 दिवसांत, तर पुढे दर महिन्यास एकदा जंतुनाशन करावे. करडे सहा महिन्यांची वाढेपर्यंत जंतुनाशक मात्रा अत्यंत उपयोगी पडतात. बाह्य आणि पोटातील कृमीनाशनामुळे करडांचा शरीर ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो. करडांची वाढ जोमाने होण्यासाठी तीन-चार करडे असणाऱ्या शेळीस दूध कमी असू शकते. अशा वेळी करडांना बाहेरून बाटलीने दूध पाजावे. पाने तोडणाऱ्या करडांसाठी कप्प्यात हिरवा लुसलुशीत चारा टांगून ठेवावा. वाढीच्या वयाप्रमाणे कप्प्याची जागा वाढवावी आणि गटवारीनुसार करडे वेगळे करावेत. तीन महिन्यांनंतर नर व मादी करडे वेगळी करावीत, तर खच्चीकरणानंतर नर करडे मांसल बनविता येऊ शकतात.

संपर्क ः 02426 - 243455

अखिल भारतीय समन्वित संगमनेरी शेळी संशोधन प्रकल्प,
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर

वेळीच ओळखा जनावरांतील आजार...

दुधाळ जनावरांतील आजारावर उपचारापेक्षा प्रतिबंधक उपचार महत्त्वाचे आहेत. योग्यवेळी उपाययोजना केल्यास जनावरे आजारापासून दूर राहू शकतात. यासाठी वेळोवेळी पशुवैद्यांकडून जनावरांच्या आरोग्याची तपासणी महत्त्वाची आहे.

आजारी जनावरे शांत बसून राहतात. त्यांची हालचाल मंदावते. चेहरा पडलेला दिसतो. त्वचा निस्तेज होते. केस राठ

किंवा उभे राहिलेले दिसतात. त्वचेवरून हात फिरवला असता कोंडा गळतो. शरीराभोवती माश्या घोंघावताना दिसतात. अंगावर बसलेल्या माश्या कातडीच्या हालचालीने अथवा शेपटीने उठवण्याची ताकद जनावरांमध्ये नसते. रोगी जनावरांची नाकपुडी बऱ्याचदा कोरडी आढळते. रवंथ करण्याची प्रक्रिया मंदावते. खाण्या-पिण्याची क्रिया मंदावते किंवा थांबते. दूध उत्पादन किंवा काम करण्याची क्षमता कमी होते. शेण व लघवीमध्ये नेहमीपेक्षा फरक जाणवतो. जनावरे थरथर कापतात. तोंडातून लाळ गळते. नाकातून, डोळ्यांतून पाणी येते. रोगी जनावरांच्या शरीराचे तापमान, श्वसन, हृदयाचे ठोके प्रमाणात नसतात.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ः

- 1) योग्य उत्पादनक्षम जनावरांची निवड करावी. जनावरांना आरोग्यदायक, थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण करणाऱा निवारा असावा. गोठा व संपूर्ण परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा. विशेष करून पावसाळ्यात जास्तीची खबरदारी घ्यावी. गोठ्यामध्ये दोन जनावरांत योग्य अंतर ठेवावे.
- 2) वातावरणातील बदलांचा जनावरांवर ताण येतो, त्यासाठी वेळोवेळी परिस्थितीनुसार व्यवस्थापनात बदल करत जावा. खाद्याच्या गव्हाणी नियमित स्वच्छ पाण्याने धुऊन घ्याव्यात. पाणी पिण्याचा हौद स्वच्छ धुऊन घेऊन त्याला चुना लावावा, त्यामुळे हौदात शेवाळ्याची वाढ होणार नाही. जनावरांच्या शरीराला सर्व अन्नघटक (पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, तंतुमय पदार्थ, क्षार व जीवनसत्त्वे) योग्य प्रमाणात उपलब्ध होतील, असा योग्य व संतुलित आहार पुरवावा.
- 3) दुभत्या जनावरांना मोकाट चरण्यासाठी सोडू नये. मोकाट, मुक्त पद्धतीने जनावरांचे संगोपन करत असताना ते कोणतेही अखाद्य वस्तू किंवा विषारी वनस्पतीचे सेवन करणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावे. घटसर्प, फऱ्या, लाळ्या खुरकूत आंत्रविषार (शेळी व मेंढी) रोगाविरुद्ध नियमित लसीकरण करणे.
- 4) जंतूंचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी वर्षातून किमान दोनदा (पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर) जंतनाशक औषधे पाजावीत. पचनसंस्थेचे विकार टाळण्यासाठी एकाच वेळी जास्त खाद्य न देता ते विभागून द्यावे, तसेच फक्त सुका किंवा ओला चारा न देता दोन्ही योग्य प्रमाणात द्यावा. जनावरांच्या अंगावरील व परिसरातील गोचीड, गोमाश्या यांचा प्रादुर्भाव नियंत्रित ठेवावा.
- 5) धार काढण्यापूर्वी व काढल्यानंतर कास व सड पोटॅशिअम परमँगनेटच्या पाण्याने स्वच्छ धुऊन कपड्याने पुसून घ्यावी प्रजननसंस्थेचे विकार टाळण्यासाठी अनुभवी तज्ज्ञांकडून योग्य वेळी तपासणी करून घ्यावी. दुभती जनावरे आटविल्यानंतर प्रत्येक सडात प्रतिजैविके सोडून घ्यावी.
- 6) गाभण जनावरांचा योग्य सांभाळ करावा, तसेच विताना व विल्यानंतर योग्य ती खबरदारी घ्यावी. वासराच्या जन्मापूर्वीपासूनच त्याच्या संगोपनाकडे लक्ष द्यावे. जनावरांतील विषबाधा टाळण्यासाठी बुरशीयुक्त चारा खाण्यास देऊ नये, तसेच कीटकनाशके, तणनाशके, खते, कोवळी ज्वारी, ज्वारी पिकाचे फुटवे, जवस, गायरानातील विषारी वनस्पती यांचा जनावरांशी संपर्क येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जनावरांना सर्पदंशापासून किंवा इतर प्राणी दंशापासून वाचविण्यासाठी

अडचणीच्या ठिकाणी चरण्यास नेऊ नये.

7) वेळीच निदानासाठी, गरज भासल्यास रक्त, रक्तजल, दूध, शेण व मूत्र यांची तपासणी करून घ्यावी, तरीही जनावरास रोग झाल्यास त्वरित पशुवैद्याच्या साह्याने उपचार करून घ्यावेत. फक्त आजारपणातच जनावरांना पशुवैद्याकडे न नेता वेळोवेळी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांकडून योग्य पशुसंगोपनाची माहिती घ्यावी.

माहिती संकलन: श्री. दत्तात्रय उरमुडे

स्त्रोत: अग्रोवन- <http://www.agrowon.com/Agrowon/20120321/5138763450964225312.htm>

शेळीपालनातील नोंदवहीचे अनन्यसाधारण

महत्त्व

1. नोंदवहीचे महत्त्व व प्रमुख कारणे -
2. विक्री नोंदवही -
3. करडांच्या वजनांची नोंदवही -
4. शेळ्यांच्या वजनांची नोंदवही -
5. शेळी विण्याची नोंदवही -
6. प्रत्येक शेळीबद्दलच्या माहितीची नोंदवही -
7. कळपातील एकूण शेळ्यांची संख्या दर्शविणारी नोंदवही -
8. रोजचा औषधोपचार नोंदवही -
9. मरतूक नोंदवही -

शेळीपालन हा व्यवसाय नफ्यात करावयाचा असेल, तर गोठाबांधणीसाठी कमीत कमी खर्च व स्वतःचा चारा तयार केल्यास हा व्यवसाय उत्तम आहे. शेळीपालनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्या नोंदीसाठी विशेष महत्त्व आहे. शेळीपालनामध्ये तक्त्यांनुसार विविध नोंदी ठेवणे खूप आवश्यक आहे. जर शेळीपालकांनी नोंदी ठेवल्या तर तो शेळीपालन व्यवसाय नफ्यात आल्याशिवाय राहत नाही.

- डॉ. तेजस शेंडे

भारतात शेळीला गरिबांची गाय म्हणतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील ७० टक्के गरीब महिला, सुशिक्षित बेरोजगार, अल्पभूधारक, मजूर व भूमिहीन लोक हा व्यवसाय किफायतशीरपणे करतात. भारतात शेळीच्या जवळपास २० जाती आहेत. त्यामध्ये जमुनापारी, सिरोही, सुरती आणि महाराष्ट्रातील उस्मानाबादी व संगमनेरी शेळ्या या जातींना विशेष महत्त्व आहे.

शेळीपालनामध्ये चांगला व सकस चारा उपलब्ध झाल्यास शेळी २ वर्षात ३ वेळा विते. २ करडे देणाऱ्या शेळ्यांना विशेष महत्त्व आहे. बोकडाच्या मटणासाठी धार्मिक बंधने नाहीत. चांगल्या प्रतीचे मटण, दूध, खत (लेंडीखत) व कातडी इत्यादी उत्पन्न मिळते. शेळीला १२-१५ चौ. फूट जागा व करडास ७-८ चौ. फूट बंदिस्त जागा व २५ चौ. फूट मोकळी जागा आवश्यक असते.

आपल्याला जर शेळीपालन हा व्यवसाय नफ्यात करावयाचा असेल, तर गोठाबांधणीसाठी कमीत कमी खर्च व स्वतःचा चारा तयार केल्यास हा व्यवसाय उत्तम आहे. शेळीपालनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींच्या नोंदीसाठी विशेष महत्त्व आहे. जर आहाराच्या नोंदी, पिलांच्या नोंदी, गाभणकाळाच्या नोंदी व इतर नोंदी जर आपण ठेवू शकलो नाही तर हे शेळीपालन व्यवसाय तोट्यात नेणारे प्रमुख कारण मानले जाते.

शेळीपालनामध्ये किंवा कोणत्याही पशुपालन व्यवसायामध्ये नोंदवही नसणे ही एक चिंतेची बाब म्हणण्यास काहीही हरकत नाही.

नोंदवहीचे महत्त्व व प्रमुख कारणे -

- १) अपेक्षित वंशावळीची मादी व नर ओळखण्याकरिता.
- २) शेळी व्यवस्थापनेमध्ये -
 - शेळीची उत्पादनक्षमता चाचणी.
 - अनुवंश व पैदाशीसाठी नर व मादी निवड.
 - औषधोपचार नोंदी.
 - शास्त्रोक्त शेळीपालन व प्रक्षेत्र व्यवस्थापन.
- ३) शेळीपालनातील उत्तम व निकृष्ट शेळ्या निवडून निकृष्ट प्रक्षेत्रामधून काढून टाकणे.
- ४) जर सर्व नोंदी असतील तर एखाद्या अडचणीवर मात करून शेळीचे उत्पादन वाढविण्यासंबंधी त्वरित निर्णय घेता येतो.
- ५) शेळीपालनामध्ये पुढे दिलेल्या वेगवेगळ्या तक्त्यांनुसार विविध नोंदी ठेवणे खूप आवश्यक आहे. जर पुढे दिल्याप्रमाणे शेळीपालकांनी नोंदी ठेवल्या, तर तो शेळीपालन व्यवसाय नफ्यात आल्याशिवाय राहत नाही.

विक्री नोंदवही -

विक्रीची तारीख ---- जनावराचा बिल्ला क्रमांक ---- विक्री वेळेस वय ---- विक्री वेळेसचे वजन ---- विक्री किंमत ---- कोणाला विकले ---- कापण्यासाठी/ पैदाशीसाठी

करडांच्या वजनांची नोंदवही -

करडाचा बिल्ला क्रमांक ---- नर/मादी ---- करडाची जन्मतारीख ---- जन्मतः वजन ---- वजनाची तारीख ---- वजन (कि.ग्रॅ.) ---- शेरा

शेळ्यांच्या वजनांची नोंदवही -

शेळीचा बिल्ला क्रमांक ---- वजनाची तारीख ---- वजन (कि.ग्रॅ.) ---- वजन वाढ/घट ---- शेरा

शेळी विण्याची नोंदवही -

शेळीचा बिल्ला क्रमांक ---- संकराची तारीख ---- वापरलेला बोकड बिल्ला क्र./नाव ---- शेळी गाभ गेली का? होय/नाही ---- शेळी व्यायल्याची तारीख ---- करडांची संख्या ---- करडांचा बिल्ला ---- करडाचे वजन ---- शेरा ---- नर ---- मादी ---- एकूण ---- क्रमांक/नाव/वर्णन ---- जन्मतः ---- ३ रा महिना ---- ६ वा महिना ---- १ वर्ष ----

प्रत्येक शेळीबद्दलच्या माहितीची नोंदवही -

शेळीचा बिल्ला क्रमांक ---- शेळीचे वर्णन ---- जन्मतारीख/ विकत घेतेवेळचे (अंदाजे) वय ---- खरेदी तारीख (खरेदी केली असल्यास) ---- शेळीचा जन्मप्रकार एक/ जुळे/ तिळे ---- शेळीची जात ---- शेळी वंशावळ ---- शेळीच्या विण्याच्या तारखा ---- शेरा ---- आई ---- बाप ---- दिनांक ---- शेळी व्यायली गाभाडली ---- एकूण करडांची संख्या ---- नर ---- मादी ---- एकूण ----

कळपातील एकूण शेळ्यांची संख्या दर्शविणारी नोंदवही -

सुरवातीची संख्या ---- संख्येत वाढ व कारणे ---- संख्येत घट व कारणे ---- दिवसअखेर जनावरे प्रौढ ---- करडे ---- एकूण ---- नवीन जन्मलेली करडे ---- नवीन खरेदी ---- प्रौढ ---- करडे ---- एकूण नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ---- नर ---- मादया ----

रोजचा औषधोपचार नोंदवही -

तारीख ---- बिल्ला क्रमांक ---- लक्षणे ---- उपचार

मरतूक नोंदवही -

जनावराचा बिल्ला क्रमांक ---- मृत्यूची तारीख ---- मृत्यूचे कारण

डॉ. तेजस शेंडे, ९९७०८३२१०५

(लेखक पशू अनुवंश व पशुपैदास विभाग, क्रा. ना. पा. पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)

प्राधान्याने सांभाळली जाते.)

- शेळीचे दूध हे अधिक आरोग्यदायी मानले जाते.

काय आहे हा अभ्यास?

- ऑस्ट्रेलियातील कृषी, अन्न संशोधन आणि विकास प्रादेशिक सेवा (SERIDA) या संस्थेतील संशोधकांनी शेळीचे चरणे, त्यांचे अन्य गवत खाणाऱ्या प्राण्यांशी असलेले संबंध आणि जैवविविधता संवर्धन या विषयावर अभ्यास केला आहे.
- या अभ्यासात शेळ्यांची जागतिक संख्या, त्यांच्या विविध प्रजाती, संवर्धनासाठीचे प्रयत्न, अन्य जंगली आणि पाळीव प्राण्यांशी असलेले संबंध, तसेच शेळ्यांच्या चरण्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम यांचे विश्लेषण केले आहे.
- सध्या मर्यादित शेळी प्रजातींचा वापर पशुधन सांभाळताना केला जात असल्याने नैसर्गिक जनुकांची विविधतेत प्रचंड घट झाली आहे. विशेषतः युरोपमध्ये अनेक स्थानिक शेळी प्रजातींची संख्या कमी झाली असून जगातील अनेक ठिकाणची परिस्थितीही फारशी वेगळी नसल्याचे संशोधका रोको रोसा ग्रासिया यांनी सांगितले.
- हिमालयीन प्रदेशापासून पठारी प्रदेशापर्यंत जगातील विविध भागातील शेळ्यांचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विभागामध्ये शेळ्यांचे अन्य जनावरांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक विश्लेषण करण्यात आले. त्यातून अधिक संवेदनशील अवस्थेत असलेल्या शेळी प्रजाती वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणे शक्य होणार आहे.

शेळीची वैशिष्ट्ये ः

- पशुधनातील अन्य प्रजाती तग धरून राहू शकणार नाही, अशा ठिकाणीही काटक शेळ्या तग धरून राहू शकतात.
 - शेळ्यांच्या चरण्याच्या सवयीमुळे पर्यावरणातील काही घटकांचे नुकसान होत असले तरी अनेक गवताच्या प्रजातींची वाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी शेळ्याच महत्त्वाची भूमिका निभावतात.
 - कठीण आणि तीव्र वातावरण असलेल्या डोंगरी, वाळवंटी आणि निमवाळवंटी प्रदेशांमध्ये शेळ्या पाळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच गरीब मानल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये त्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
 - स्थानिक प्रजाती या पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. त्यांच्या चरण्यामुळे रानात लागणाऱ्या वणव्याचा धोका काही अंशी कमी होतो. तसेच वेगाने वाढणारी अनेक धोकादायक गवते त्यांच्यामुळे
-

-संगमनेरी ः पुणे आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये आढळणारी ही प्रजाती दूध आणि मांसासाठी पाळली जाते.
-निलगिरी ताहेर (Nilgiritragus hylocrius) ः ही पश्चिम घाटाच्या दक्षिणेकडील तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये आढळणारी जंगली प्रजाती आहे. ही तमिळनाडूचा राज्य प्राणी असून धोक्यात असलेली प्रजाती आहे.

भारतामध्ये शेळीच्या जमनापारी, सुरती आणि संगमनेरी या पाळीव प्रजातींची संख्या वेगाने कमी होत असून, त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जनुकीय विविधतेच्या दृष्टीने शेळीच्या प्रजाती महत्त्वाच्या आहेत. कर्नाल येथे "नॅशनल ब्युरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस" ही संस्था सर्व प्रकारच्या पशू-पक्षी, पाळीव प्राणी यांची जैवविविधता जतन व संवर्धन करण्यासाठी कार्यरत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या साह्याने विद्यापीठांमध्ये संगमनेरी शेळी जतन प्रकल्प सुरू आहे.

- डॉ. संजय मंडकमाले, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, संगमनेरी शेळी संशोधन योजना, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

गेल्या दहा वर्षांपासून बंदिस्त शेळीपालनाचा उद्योग करत आहे. आज माझ्याकडे आफ्रिकन बोअर जातीच्या लहान मोठ्या 200 शेळ्या आहेत. या शेळ्यांची मी मांसासाठी विक्री करत असून, एका शेळी (व तिची दोन वेतांतील पिल्ले) यापासून सर्व खर्च वजा जाता साधारणपणे दहा हजार रुपये मिळतात. माझे अठरा जणांचे एकत्रित कुटुंब प्रामुख्याने शेळीपालनावर चालते.

- संदीप तुकाराम शिसाळ, 9226395206 पलुस, जि. सांगली

भारतातील प्रमुख शेळी प्रजाती

- सिरोंही ः राजस्थान आणि गुजरातमधील पालनपूर भागामध्ये आढळणारी जात.
- मारवारी ः राजस्थानमध्ये आणि गुजरातमध्ये विशेषतः मेहसाणा जिल्ह्यात ही जात आढळते.
- बीटल ः पंजाब आणि हरियानामध्ये आढळते. दुधासाठी पाळली जाणारी जात आहे.
- झाकराणा ः राजस्थानमधील अलवार जिल्ह्यातील झाकराणा आणि काही खेड्यांत आढळते. अत्यंत मर्यादित प्रदेशांमध्ये आढळणाऱ्या या जातीच्या जनावरांची संख्या वेगाने कमी होत आहे.
- बारवारी ः उत्तर प्रदेशातील उदाह, आग्रा आणि अलिगड तसेच राजस्थानातील भरतपूर जिल्ह्यात आढळते. दूध आणि मांसासाठी पाळली जाणारी ही जात आहे.
- मेहसाणा ः गुजरातमधील बनसकांथा, मेहसाणा, गांधीनगर आणि अहमदाबाद जिल्ह्यांमध्ये आढळते. दूध आणि केसांसाठी प्रसिद्ध.
- गोहीलवाडी ः गुजरातमधील भावनगर, अमरेली, जुनागढ जिल्ह्यांत. दूध आणि केसांसाठी प्रसिद्ध.
- झालावाडी ः गुजरातमधील सुरेंद्रनगर आणि राजकोट जिल्ह्यांमध्ये आढळणारी ही प्रजाती दूध आणि केसांसाठी प्रसिद्ध आहे.
- कच्छी ः गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यामध्ये ही प्रजाती आढळते.
- मलबारी ः केरळमधील कालिकत, कन्नमनोरे आणि मल्लपुरम जिल्ह्यांमध्ये आढळणारी जात मांस आणि काही प्रमाणात दुधासाठी पाळली जाते.

- **उस्मानाबादी** ः महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लातूर, तुळजापूर आणि उदगीर तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळते. दूध आणि मांसासाठी वापर.
- **कन्नयाडू**: तमिळनाडूतील रामनाथपुरम, थिरुनेवेली जिल्ह्यामध्ये आढळणारी ही प्रजाती प्रामुख्याने मांसासाठी पाळली जाते

माहिती संकलन: श्री. दत्तात्रय उरमुडे

स्त्रोत: अग्रोवन - [ॲग्रो व्हिजन](http://www.agrowon.com/Agrowon/20130217/4821731211800974829.htm)

<http://www.agrowon.com/Agrowon/20130217/4821731211800974829.htm>

थंडीत करडांची काळजी कशी घ्यावी?

जन्मानंतर लगेच शरीर वजनाच्या नोंदीवरून करडे अशक्त आहेत का सशक्त आहेत, याचा अंदाज बांधता येतो. गोठ्यामध्ये करडांच्या कप्प्यातील तापमानाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मरतुकीचे सत्र सुरू होते. अति थंड बाह्य हवामानास गोठ्यात उबदारपणा, उष्णतामान वाढविण्यासाठी विद्युत दिवे उपयोगी पडतात. अति थंड वातावरणात आर्द्रतेमुळे करडांचे कप्पे लवकर कोरडे होत नाहीत. लेंड्या, पातळ हगवण किंवा मूत्र यामुळे कप्प्यात ओल राहते; मात्र दिवसातून तीन-चार वेळा जागा बदलून करडे कोरड्याच ठिकाणी राहतील याची काळजी घ्यावी. करडांच्या कप्प्यात गोणपाटाचा वापर केल्यास ओल शोषली जाऊ शकते, जमिनीत चुनखडीचा थोडा वापर ओल शोषण्यास मदतीचा ठरतो. फरशीपेक्षा मुरूम, मातीची धुम्मस केलेली जमीन अधिक गरम असते. एका दुरडीखाली चार-पाच करडे, म्हणजे मोकळी हवा मिळणे कठीण आणि श्वसनाचे रोग पसरण्यास वाव निर्माण होतो. दुरडीमुळे शरीर हालचाल पूर्ण बंद होते. तीन-चार करडे असणाऱ्या शेळीस दूध कमी असू शकते. अशा वेळी करडांना बाहेरून बाटलीने दूध पाजावे. पाने तोडणाऱ्या करडांसाठी कप्प्यात हिरवा लुसलुशीत चारा टांगून ठेवावा. वाढीच्या वयाप्रमाणे कप्प्याची जागा वाढवावी आणि गटवारीनुसार करडे वेगळे करावेत. तीन महिन्यांनंतर नर व मादी करडे वेगळी करावीत. अशक्तपणा आलेल्या करडांसाठी पशुवैद्यकाची मदत आणि उपचार आवश्यक असतात.

संपर्क -	02426-	243455
संगमनेरी	संशोधन	योजना,
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी		

एस. जी. जमदाडे, मल्हारपेठ, जि. सातारा

माहिती संदर्भ : ॲग्रोवन

जोडधंद्यासाठी शेळी व मेंढीची कोणती जात निवडावी? नरांचे नियोजन कसे करावे?

1. [उस्मानाबादी शेळी](#) -
2. [संगमनेरी शेळी](#) -

3. माडग्याळ मेंढी -

4. पैदाशीसाठी नराची निवड -

राज्यातील शेळ्या व मेंढ्यांच्या जातींचा विचार करता उस्मानाबादी ही मांसासाठी उपयुक्त असलेली आणि संगमनेरी ही मांस व दुधासाठी उपयुक्त असलेली शेळीची जात आहे. मेंढ्यांमध्ये लोकर व मांसोत्पादनासाठी दख्खनी मेंढी आणि फक्त मांसासाठी मडग्याळ मेंढी फायदेशीर आहे. या सर्व जाती महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागांत अत्यंत कमी व निकृष्ट प्रतीच्या चान्यावर तग धरून राहतातच, शिवाय त्यांची रोगप्रतिकारक क्षमताही चांगली आहे.

उस्मानामाबादी शेळी -

या शेळीत जुळी करडे देण्याचे प्रमाण 60 टक्के आहे. निवड पद्धतीने जुळी करडे देणाऱ्या शेळ्या निवडाव्यात. ही जात मटणासाठी चांगली आहे.

संगमनेरी शेळी -

या शेळ्या रंगाने पांढऱ्या किंवा पांढरट तपकिरी असतात. या शेळीत जुळी करडे देण्याचे प्रमाण 40 ते 50 टक्के आहे. ही जात दूध आणि मांसासाठी वापरली जाते.

माडग्याळ मेंढी -

या मेंढीची शरीरवाढ चांगली आहे. मेंढीच्या कोकराचे जन्मतः वजन तीन ते पाच किलो असते. तीन महिने वयाच्या वेळचे वजन 22 किलो होते. पूर्ण वाढ झालेल्या मेंढीचे वजन 45 ते 50 किलो इतके असते. या मेंढ्याच्या अंगावर लोकर कमी असते.

पैदाशीसाठी नराची निवड -

नर हा कळपातील सुदृढ व त्या त्या जातीचे गुणधर्म दर्शविणारा असावा. पैदाशीचा नर चपळ असावा. पैदाशीचा नर निवडताना दोन जुळ्या नरांतील एक चांगला नर निवडावा, म्हणजे पुढील पिढ्यांत जुळे व तिळे करडे देण्याचे प्रमाण वाढते. पैदाशीच्या नराची प्रजोत्पादन क्षमता चांगली असावी, जेणेकरून एका दिवशी जास्तीत जास्त मादऱ्यांना गर्भधारणा करण्यास तो सक्षम ठरेल. नराचे अंडकोश मोठे व पोटाला चिकटलेले असावे. पैदाशीचा नर उंच, लांब, भरदार छाती असणारा व मानेवर आयाळ असणारा असावा. पैदाशीच्या नरात कोणतेही शारीरिक व्यंग नसावे. पैदाशीचा नर जातिवंत माता-पित्यापासून झालेला असावा. नर निवडताना दीड ते दोन वर्षांचा निवडावा. पैदाशीचा नर निवडताना जातीशी साधर्म्य असणारा, दीड ते दोन वर्षे वयाचा, जुळ्यांतील एक असणारा, सुदृढ, उत्तम प्रजोत्पादन क्षमता असणारा निवडावा, म्हणजे त्याच्यापासून जन्माला येणारी पुढील पिढी चांगल्या गुणवत्तेची होईल. साधारणपणे दीड ते दोन वर्षांच्या नराला 30 शेळ्या / मेंढ्यांच्या पैदाशीला वापरावे. दर दोन वर्षांनी नर बदलावा. हा बदल करताना शक्यतो दुसरा नर लांब अंतरावरून आणावा, म्हणजे सकुळ प्रजननास आळा बसून वाईट परिणाम होणार नाहीत.

संपर्क -

1)	02426	-	243455
वरिष्ठ	शास्त्रज्ञ,	संगमनेरी	शेळी संशोधन योजना
2)	02426	-	294225
सर्वसमावेशक	दख्खनी	मेंढी	प्रकल्प,
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी			

संदीप गाढे, नांदेड, वसंत शेळके, संगमनेर, जि. नगर

माहिती संदर्भ : अँगोवन

शेळ्या-मेंढ्यांतील आंत्रविषार रोगाचे नियंत्रण कसे करावे?

1. [आंत्रविषार आजार](#)
2. [उपचार -](#)

आंत्रविषार आजार

पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, परभणी येथील तज्ज्ञ डॉ. मीरा साखरे यांनी दिलेली माहिती - कडक उन्हाळ्यानंतर पावसाळा सुरु होऊन कोवळे गवत जास्त प्रमाणात दिसून येते. हे कोवळे गवत शेळ्या-मेंढ्यांनी भरपूर खाल्ल्यामुळे आंत्रविषार आजार होतो. लहान कोकरांना, करडांना जास्त दूध पाजणे. अतिकर्बयुक्त पदार्थ म्हणजे मका, गहू, ज्वारी इ. जास्त प्रमाणात खाण्यात आल्यास याची लक्षणे दिसतात.

या आजाराची लक्षणे म्हणजे करडे, कोकरे निस्तेज दिसतात, दूध पीत नाहीत, सुस्त, एका जागेवर बसून राहतात. पातळ हिरव्या रंगाची संडास होते. तोंडास फेस येतो. बाधित पिल्ले हवेत उडी मारून जमिनीवर पडतात. चक्कर येते. मोठ्या शेळ्या-मेंढ्या 24 तासांपर्यंत राहतात. त्यांच्यामध्ये तोंडातून फेस येणे, लाल येणे, अडखळत चालणे, दात खाणे, तोल जाणे, गोल फिरणे, श्वासोच्छ्वासास त्रास होणे आणि शेवटच्या टप्प्यात पोटफुगी, जुलाब ही लक्षणे आढळून येतात.

उपचार -

अल्प मुदतीचा आजार असल्यामुळे प्रभावी उपचारपद्धती नाही, पण पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याप्रमाणे प्रतिजैविके द्यावीत, त्यामुळे पोटातील विष शोषण्याचे प्रमाण कमी होते व जिवाणूंची वाढ होणे थांबते. कोवळे, लुसलुशीत हिरवे गवत जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नये. लहान करडांना, कोकरांना गरजेपेक्षा जास्त दूध पाजू नये. अतिकर्बयुक्त पदार्थ (ज्वारी, मका इ.) जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नये. गाभण शेळ्या-मेंढ्यांना पशुतज्ज्ञांकडून योग्य कालावधीत आंत्रविषार

सुभाष फराटे, जालना

पोषण व वजनवाढीवर लक्ष ठेवून बंदिस्त शेळीपालन केले यशस्वी

शेळीपालनात शेळ्यांची संख्या किती त्यापेक्षाही आहार, संगोपनाद्वारा त्यांचे वजन किती वाढवले, हे महत्त्वाचे असते. किती देऊन, किती मिळवले याचे अर्थशास्त्र ज्याला जमले त्याला शेळीपालन व्यवसायातील इंगीत कळले. सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील युवा शेतकरी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हीच संकल्पना प्रमाण मानून सुयोग्य व शास्त्रीय व्यवस्थापनातून बंदिस्त शेळीपालन व्यवसाय केला. आज त्यांची या व्यवसायात चांगली ओळख तयार झाली आहे.

पुणे-बंगळूर महामार्गावर सातारा जिल्ह्यात कवठे गाव (ता. वाई) लागते. गावाची ओळख सांगायची तर तीन पिढ्यांपासून येथील उत्पादित पेढ्यांचे गोडवे महाराष्ट्र व त्याबाहेर पसरले आहेत. दुसरी ओळख म्हणजे देशभक्त किसन वीर यांचे हे जन्मगाव. आणि तिसरी ओळख म्हणजे 26-11 च्या मुंबईत अतिरेक्यांच्या भ्याड हल्ल्यात शहीद झालेल्या अंबादास पवार यांचे गाव. ऊस, आले व हळद ही गावची प्रमुख पिके. याच गावच्या आधिपत्याखाली जवळच 50 उंबऱ्यांची विठ्ठलवाडी आहे. तेथील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन वर्षांपूर्वी पारंपरिक शेती पद्धतीला बगल देऊन शेळीपालन व्यवसाय सुरू केला.

बी.एस्सी. ऍग्री, त्यानंतर कृषी व्यवस्थापनातील एमबीए पदवी त्यांनी बंगळूर येथील संस्थेतून मिळवली. संस्थेतील "कॅम्पस इंटरव्ह्यू"च्या माध्यमातून भारतातील एका कंपनीत सांगली येथे मार्केटिंग विभागात काही काळ नोकरी केली. खरे तर उच्च शिक्षणाची पदवी हाती असल्याने चांगल्या पगाराच्या नोकरीत रमणे पृथ्वीराज यांना शक्य होते. घरच्यांचाही मुलाने नोकरी करावी असाच आग्रह होता. परंतु पृथ्वीराज यांनी वर्षभरात नोकरी सोडली. घरची शेती व त्याची आवड असल्याने फेब्रुवारी 2012 मध्ये शेतीपूरक बंदिस्त शेळीपालन व्यवसाय सुरू केला. त्यांच्या जिद्दी स्वभावापुढे घरच्यांना पाठबळ देण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. व्यवसायाच्या सुरवातीला बंदिस्त शेळीपालन अडचणीत येऊ शकते, याबाबत अनेकांनी त्यांच्यापुढे शंका निर्माण केल्या. परंतु पृथ्वीराज यांनी आपले काम निमूटपणे चालू ठेवले.

1) ज्याप्रमाणे पोल्ट्रीमध्ये कॉबड्यांना ठराविक कालावधीत दिले जाणारे खाद्य, त्यानुसार वाढणारे त्यांचे वजन यांचे गणित केले जाते. तसा विचार पारंपरिक शेळीपालनात फारसा होत नसल्याचे पृथ्वीराज यांना जाणवले. आपण शेळ्यांचे संगोपन कसे करतो, त्या बदल्यात "आऊटपुट" काय घेतो, याचा विचार त्यांनी केला. त्या दृष्टीने करावयाच्या बाबी प्राधान्याने अंगीकारल्या.

2) आफ्रिकन बोअर जातीचा छोटा नर व स्थानिक जातीच्या पाच शेळ्या विकत घेऊन व्यवसायाला सुरवात केली.

सुरवातीला नोकरीच्या उत्पन्नातील काही वाटा गुंतवला. टप्प्याटप्प्याने स्थानिक पतपेढीतून अर्थसाह्य घेतले. आता विक्री व मिळणाऱ्या उत्पन्नानुसार नियोजनबद्ध वाटचाल सुरू आहे. सुरवातीला कळपांची संख्या मर्यादित ठेवली. अनुभव वाढत गेल्यानंतर शेळ्यांची संख्या वाढवली.

3) मुंबई येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातून तीन दिवसांचे शेळीपालन प्रशिक्षण घेतले. राज्यातील, परराज्यांतील विविध प्रकल्पांना भेटी दिल्या. त्यातून शेड व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे समजले. अन्य प्रकल्पांत जाणवणाऱ्या त्रुटी आपल्या प्रकल्पामध्ये कमी केल्या. उदाहरण सांगायचे तर बऱ्याचदा बंदिस्त पद्धतीत शेळ्यांना 24 तास एकाच जागेवर ठेवले जाते. परिणामी, सातत्याने गोठा ओला व दुर्गंधीयुक्त राहतो. असे वातावरण गोचीड, पिसवांसारख्या बाह्यपरोपजीवींसाठी पोषक असते. पृथ्वीराज यांच्या प्रकल्पात खाद्याची जागा व मुक्कामाची जागा वेगवेगळी असल्यामुळे शेड स्वच्छ व कोरडी राहते. यामुळे रोगराईचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

पृथ्वीराज याचा शेळीपालन व्यवसाय दृष्टिक्षेपात

उद्दिष्ट- - जातिवंत नर-मादी यांची विक्री
- बकरी ईदसाठी जातिवंत व धष्टपुष्ट नर तयार करणे.
- आफ्रिकन बोअर, स्थानिक व सिरोंही (राजस्थान) या जातींचे पालन.

-विठ्ठलवाडी (कवठे) परिसर महाबळेश्वर व पाचगणीच्या पायथ्याशी असल्याने भौगोलिक दृष्टीने पर्जन्यछायेचा आहे. या टापूतील शेळ्यांमध्ये येथील हवामानाशी जुळवून घेण्याचे गुणधर्म विकसित झाले आहेत. परिणामी, तीनही ऋतूंत तग धरणाऱ्या स्थानिक जाती निवडून वाढवल्या.

-वजनवाढीचा वेग स्थानिक जातींमध्ये अत्यल्प असतो. परिणामी, व्यवसायातील अर्थशास्त्र कोलमडू शकते. त्यामुळे आफ्रिकन बोअर जातीच्या नरासोबत "क्रॉस" (संकर) केल्यास त्या शेळ्यांपासून 40 ते 45 किलोचे नर मिळू शकतात. त्यामुळे अर्थशास्त्राची घडी बसू शकते, हे ओळखून बोअर जातीचे नर कळपात वापरले.

-अन्य ठिकाणी जनावरांच्या वजनवाढीचा दर जिथे 50 ते 100 ग्रॅम प्रतिदिन असा असतो, त्या तुलनेत पृथ्वीराज यांच्याकडील जनावरांच्या वजनवाढीचा दर 200 ते 250 ग्रॅम प्रतिदिनी आहे. त्यामुळे वर्षात सुमारे 65 ते 70 किलोचे विक्रीयोग्य नर तयार होतात.

-18 बाय 35 फूट आकाराचे दोन निवासी, तर 12 बाय 70 फूट आकाराच्या खाद्यासाठी दोन शेड.

पाण्यासाठी दोन हजार लिटरची टाकी.

- वडिलोपार्जित विहीर. बागायत एक एकर 20 गुंठे शेती. यातील 20 गुंठ्यांत चारा लागवड.

शेळ्यांना दिला जाणारा आहार (प्रति शेळी, प्रति दिन)

1) सकाळी 100 ग्रॅम गोळी पेंड. एका तासानंतर सुक्या वैरणीची एक किलो कुट्टी. दोन तासानंतर सुका चारा दीड ते दोन किलो. (सकाळी सुका चारा दिल्याने भुकेल्या पोटी तो मोठ्या प्रमाणात खाल्ला जातो.) दुपारी बारानंतर दोन वेळा एकूण दोन ते अडीच किलो हिरवा चारा कुट्टीद्वारा.

2) हिरव्या चान्यामध्ये मेथी घास, दशरथ घास, डीएचएन-6, सीओएसएस-27 आदी बहुवार्षिक पिकांचा चारा.

3) सकाळी मुक्कामाच्या शेडमधून शेळ्यांना बाहेर सोडल्यानंतर मुक्कामाची जागा व सायंकाळी शेळ्या मुक्कामाच्या ठिकाणी आत घेतल्यानंतर दिवसभर वापराची व खाद्याची जागा स्वच्छ केली जाते.

आरोग्य

नवजात करडांना 21 दिवसांनी आंत्रविषाद व पंधरा दिवसांनी बुस्टरचा डोस. दोन महिन्यांनंतर लाळ्या खुरकूत व घटसर्प, तर तिसऱ्या महिन्यात पीपीआरचे लसीकरण. दर सहा महिन्यांनी औषधांद्वारे जंतुनिर्मूलन.

सॅद्रिय

बोकड?

पृथ्वीराज यांच्या म्हणण्यानुसार, बाजारात बकरी ईदच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात धिप्पाड, धष्टपुष्ट बोकड पाहण्यास मिळतात. त्यांना वाढवण्यासाठी रासायनिक औषधे व उत्तेजक द्रव्यांचा वापर केला जातो. परंतु पृथ्वीराज यांच्याकडे बोकडांना पूर्णतः सॅद्रिय व पौष्टिक आहार देऊन वाढवले जाते. त्यांना तणावमुक्त वातावरणात ठेवले जाते. अशा पद्धतीचे सुमारे 25 सॅद्रिय बोकड विक्रीस उपलब्ध असतात.

- वर्षभरात शेळ्यांमध्ये सुमारे 30 नर व 15 ते 20 माद्यांची विक्री केली जाते.
- बकरी इदसाठी दीड वर्ष वाढवलेल्या सुमारे 70 ते 80 किलो वजनाच्या बोकडाची विक्री होते.
- शुद्ध नर असल्यास प्रति किलो 1500 रुपये दराने विकला जातो. मादीची विक्री दोन हजार रुपये दराने होते.

जाती व जातीच्या शुद्धतेनुसार दरात फरक राहतो.

- प्रकल्पात वार्षिक सुमारे दोन लाख रुपये खर्च होतो. उपलब्ध लेंडी खताचा वापर स्वतःच्या शेतातील पिकांसाठी केला जातो. हे खत या वर्षीपासून विक्रीसही उपलब्ध केले आहे.

फायदेशीर

व्यवसायासाठी

वापरलेल्या

बाबी

* वजनवाढीचा वेग कायम ठेवला.

* सिरोहीसारख्या जातीत जुळे देण्याचे प्रमाण 60 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवले.
(योग्य प्रकारच्या पोषणातून)

- जन्मलेल्या करडांमधील मृत्यूचे प्रमाणही शून्य टक्के ठेवले आहे.
 - संगोपनगृहामध्ये स्वकल्पनेतून गव्हाणीत नावीन्यपूर्ण बदल केले. त्यामुळे खाद्य जास्त प्रमाणात तेथे बसून नासाडी कमी होते. कमी जागेत जास्त शेळ्यांना मनसोक्त खाद्य खाता येते.
 - * संगोपनगृहात मुरुमाच्या भुईऐवजी लादीचा वापर. त्यातही वेगवेगळे प्रयोग.
 - शेळ्यांच्या आई-वडिलांचा डाटा ठेवला.
- पृथ्वीराज यांनी आपल्या शेडमध्ये जन्मणाऱ्या प्रत्येक जनावराच्या आई-वडिलांचा शास्त्रीय "डाटा" ठेवला आहे. जातीची दूध देण्याची क्षमता, वेतक्षमता, आनुवंशिक गुणधर्म आदी सर्व नोंदी असल्याने जातीची शुद्धता तपासणे व तशा जाती विकसित करणे शक्य होते. नोंदीच्या दृष्टीने प्रत्येक शेळीच्या कानात क्रमांकाचे बिल्ले लावण्यात आले आहेत.
- भविष्यात जनावरांचा वजनवाढीचा वेग 250 ते 300 ग्रॅम प्रतिदिनी ठेवणे, दोन वर्षात चार वेत घेणे, असे नियोजन आहे. जातीची योग्य निवड, निवडीचे ठिकाण हे मुख्य बंदिस्त शेळीपालनात महत्त्वाचे आहेत. याकरिता बंदिस्त शेळीपालन प्रकल्पातील शेळ्या घेऊनच संगोपन करणे महत्त्वाचे ठरते, असे पृथ्वीराज म्हणतात.

पृथ्वीराज यांना फलटण येथील निंबकर कृषी संशोधन केंद्रातील चंदा निंबकर, शिरवळ येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. अविनाश देव व डॉ. सूर्यवंशी यांचे मार्गदर्शन, तर आजोबा नथू चव्हाण, आजी सौ. गजराबाई यांची मोलाची साथ मिळते.

प्रत्येक भारतीयाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था, नवी दिल्ली या संस्थेच्या शिफारशीनुसार दरडोई प्रति वर्षी अकरा किलो मांस मिळायला हवे; परंतु उपलब्धता पाच किलोपेक्षाही कमी आहे. त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीनुसार शेळीपालन ही काळाची गरज आहे. पृथ्वीराज यांचा व्यवसाय त्या दृष्टीने आदर्श आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प महाराष्ट्रात उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मांसाची उपलब्धता वाढेल आणि तरुणांना व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध होईल.

- डॉ. अविनाश देव, कार्यक्रम समन्वयक, बीएआयएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, वारजे (पुणे).

पृथ्वीराज चव्हाण- 9960548005.

काटेकोर व्यवस्थपनातून केले यशस्वी उस्मानाबादी शेळीपालन

1. [शेळ्यांचे व्यवस्थापन](#)
2. [शेडची रचना](#)

3. व्यवसायाचे स्वरूप व विस्तार -
4. मार्केट, विपणन व विक्री
5. पुरस्काराने सन्मान
6. जोखीम काय आहे?

मित्राने दिलेला शेळीपालनाचा सल्ला लातूर येथील मोहसीन शेख यांनी अभ्यासातून अंमलात आणला. आधुनिक शेड व्यवस्थापन, खाद्य, पोषण, स्वच्छता, लसीकरण आदी विविध घटकांवर काटेकोर लक्ष देऊन शेळीपालन व्यवसाय वाढवला. त्यातून आर्थिक विकास शक्य करून दाखवला. व्यवसायाच्या मार्केटिंगसाठीही त्यांनी कुशलता दाखवली. आज परराज्यातील ग्राहक त्यांच्याकडे शेळ्यांची मागणी करण्यासाठी येऊ लागले आहेत.

मोहसीन युनुसमिर्या शेख हे लातूरचे. त्यांची काही शेती नव्हती. मात्र आपले मित्र सय्यद जमिल यांनी त्यांना शेळीपालनाची वेगळी वाट दाखवली. या व्यवसायाचा अभ्यास व अर्थशास्त्र तपासून सन 2008 च्या सुमारास शेख यांनी उस्मानाबादी शेळीपालन व्यवसायाला सुरवात केली. यासाठी लातूरपासून काही किलोमीटरवरील नांदगाव शिवारात चार गुंठे जमीन मुबारक चाऊस यांच्याकडून कराराने भाडेतत्त्वावर घेतली, तर सोलापूर जिल्ह्यातील वैराग येथे शिवाजी शेंडगे यांच्याकडून चार गुंठे जमीन वार्षिक 20 हजार रुपयांने भाडेतत्त्वावर घेतली. सुरवातीला 50 शेळ्या व तीन बोकडांची खरेदी केली. लातूर येथे 20 तर वैराग येथे 30 शेळ्यांचे संगोपन सुरू केले. आज नांदगाव येथे 50 तर वैराग येथे 250 शेळ्यांचे पालन केले जात आहे. त्यासाठी आधुनिक पद्धतीच्या शेडची उभारणी केली आहे.

शेळ्यांचे व्यवस्थापन

शेडची रचना

आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीच्या आदर्श शेडवर शेळ्याचे आरोग्य अवलंबून असते. यासाठी आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने शेड बांधला आहे. जमिनीवर 15 बाय 35 फुटांच्या अंतरावर फरशीचे बेड तयार केले आहेत. त्यावर साडेतीन फुटांवर लोखंडी अँगलचा वापर करून शेडची उभारणी केली. त्यामध्ये पंचिंग जाळी बसवून मजला तयार केला. यामुळे शेळ्यांना हवेशीर वातावरण, त्यांची विष्टा व मूत्र खाली फरशीवर पडून शेड स्वच्छ राहते, तसेच शेळ्या व त्यांचे विष्टा-मूत्र एकमेकांच्या संपर्कात येत नाहीत. यामुळे त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहते.

शेडच्या आतील भागात चारा खाण्यासाठी मोठ्या शेळ्या व पिलांसाठी स्वतंत्र गव्हाणी केल्या आहेत. त्यांची विष्टा व मूत्र वाहून जाण्यासाठी शेडला जाळीचा वापर केल्यामुळे शेडमध्ये स्वच्छता राहून शेळ्यांचे आरोग्य उत्तम राहते. शेडमधील दुर्गंधी जाण्यासाठी "व्हेन्टिलेशन"ची सोय करण्यात आली आहे. यामुळे आरोग्य संपन्न राहून शेळ्यांचे पोषण उत्तम होते.

शेडच्या तिन्ही बाजूंनी जाळीचा वापर केल्यामुळे शेडमध्ये हवा मोठ्या प्रमाणात खेळती राहते. पावसाळा, हिवाळा अथवा उन्हाळ्यात आवश्यकतेनुसार शेड झाकण्याची सोय केली असल्यामुळे शेळ्यांचे संरक्षण उत्तम प्रकारे करता येते.

व्यवसायाचे स्वरूप व विस्तार -

खाद्य व्यवस्थापन - शेळ्यांसाठी सकस आहारावर भर दिला जातो. नांदगाव येथील शेतीत एक एकरात मेथी घास, मका आदींची लागवड केली आहे. शेळ्यांना दिवसातून तीन वेळा खाद्य दिले जाते. पौष्टिक खाद्यात भरडलेला मका, शेंगदाण्याची पेंड, हरभरा व तुरीचा भुस्सा व खनिज मिश्रण दिवसातून एक वेळ दिला जातो. सकाळी हिरवा चारा, दुपारी विविध पौष्टिक खाद्य, सायंकाळी वाळलेला चारा तर रात्री हिरवा चारा असे खाद्य दिले जाते. हिरवा चारा व वाळलेल्या चान्याचे तुकडे करण्यासाठी कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर केला जातो. यामुळे चान्याची 50 टक्क्यांपर्यंत बचत होते.

स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जाते. शेडच्या बाहेरील बाजूला शेडनेटचा वापर करून सावली तयार केली आहे. पाणी पिण्यासाठी स्वतंत्र गव्हाणीची बांधणी केली आहे. शेळ्यांना हव्या त्या वेळी पाणी पिता येते.

2) पीपीआर, आंत्रविषार, लाब्या खुरकूत, फन्या व घटसर्प या रोगांसाठी वर्षातून एक वेळ लसीकरण केले जाते. 3) पोट्यातील जंतुनाशक औषध वर्षातून दोन वेळा पाजले जाते.

4) तीन महिन्यांपर्यंत पिलांचे काळजीपूर्वक संगोपन केले जाते. थंडी, पावसाळा यांच्यापासून विशेषतः त्यांचे संरक्षण केले जाते.

मार्केट, विपणन व विक्री

शेख यांनी उस्मानाबादी गोड डॉट कॉम हे संकेतस्थळ 2012 मध्ये सुरू केले. यामुळे महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश व केरळ या राज्यांत ग्राहकवर्ग मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाला. सध्या ग्राहकवर्ग 80 टक्के परराज्यातील असून, तिकडे शेळीची ही जात उपलब्ध नसल्याने दरही चांगले मिळतात. सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरात असलेल्या "सोशल मीडिया"चाही वापर केल्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहक व बाजारपेठ शोधणे व ग्राहकवर्ग तयार करणे सोपे गेले.

सहा लाख रुपये गुंतवणूक करून 50 शेळ्यांपासून सुरू केलेल्या व्यवसायात आज शेळ्यांची संख्या तीनशेपर्यंत पोचली आहे. 130 पिले आहेत. महिन्याला सरासरी 30 ते 35 शेळ्यांची विक्री राज्यातील व परराज्यातील ग्राहकांना केली जाते. विक्री वजनानुसार होते. मोठी शेळी (35 ते 65 किलो वजन) 200 रुपये प्रति किलो तर बोकड 250 रुपये किलो दराने विक्री केली जाते. ग्राहकांच्या मागणीनुसार पिलांची विक्रीही महिन्याला सुमारे 30 च्या आसपास होते. जमीन भाडे, खाद्य, लसीकरण, औषधे असा सुमारे साडे 55 हजार रुपये खर्च होतो. सहा कर्मचारी असून त्यांचा वेगळा पगार असतो. लॅंडी खताचा वापर चारा पिकांच्या शेतीत केला जातो. पिले मोठी झाल्यानंतर विक्री होत असल्यामुळे त्यांनाही चांगला भाव मिळत आहे.

पुरस्काराने सन्मान

जिल्हास्तरीय आदर्श शेळीपालक पुरस्कार फेब्रुवारी 2014 मध्ये शेख यांना प्राप्त झाला. त्यांच्या उत्कृष्ट उस्मानाबादी शेळी व्यवसायाची दखल घेत राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथ डवले यांनी त्यांच्या फार्मला भेट देऊन कौतुक केले आहे व आपल्या अधिकाऱ्यांनाही त्याबाबत सांगितले आहे.

