

आंत्रविषार :-

रोगाची कारणे :- हे जीवाणु मातीमध्ये व निरोगी जनावरांच्या आतडयामध्ये वास्तव्य करतात. पावसाळ्यात जेव्हा कोवळे गवत जास्त प्रमाणात दिसून येते तेव्हा हे गवत भरपूर खाल्ल्यामुळे पोट गच्च् भरून पोटात थोडी ही जागा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे पोटातील वातारण ऑक्सिजन विरहित होऊन हे जीवाणु वाढतात व विष तयार होते. तयार झालेले विष आतडयाद्वारे शोषले जाऊन शेळ्यांना विषबाधा होते. तसेच लहान करडांना जास्त प्रमाणात दुध पाजणे अति कार्बनयुक्त पदार्थ जसे मका, गहु, ज्वारी इ. जास्त प्रमाणात खाण्यात आल्यास या रोगांची लक्षणे आढळून येतात.

रोगांची लक्षणे :-

रोगाची लक्षणे खुप कमी कालावधीतच दिसतात. लहान करडे/कोकरांमध्ये लागण झाल्यापासून २ ते १२ तासात मृत्यु येतो. संध्याकाळी शेळ्या, करडे चरून आल्यानंतर त्यांना चक्कर आल्यासारखे दिसते, आणि त्या गोल फिरून पडतात व पाय झाडत प्राण सोडतात.

- बाधित पिल्लांना पातळ हिरव्या रंगाची हगवण होते.
- दिर्घकाल पण कमी प्रमाणात विषबाधा झाल्यास शेळ्यांमध्ये आणि करडांमध्ये हगवण आढळून येते.
- मेलेल्या शेळीचे शवविच्छेदन केल्यास शेळींची / करडांची आतडी रक्ताळलेली किंवा लालसर दिसतात. मुत्रपिंड थोडेस मोठे व लाल झालेले आढळते.

उपचार :- या रोगाची लक्षणे किंवा विषबाधा झाल्यावर उपचारचा फारसा फायदा होत नाही. तरीही पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याप्रमाणे प्रतिजैविके द्यावीत त्यामुळे पोटातील विष शोषणाचे प्रमाण कमी होते व जीवाणुंची वाढ होणे थांबते.

- शेळ्यांना आणि करडांना नविन आलेले ताजे गवत, पाला जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नये. लहान करडांना गरजेपेक्षा जास्त दुध पाजू नये.
- पावसाळ्यापुर्वी शेळ्यांना रोग प्रतिबंधक लसीकरण करावे. पहिल्या मात्रेनंतर १५ दिवसांनी दुसरी मात्रा देणे आवश्यक आहे. तसेच गाभण शेळ्यांना प्रसुतीपुर्वी तीन ते चार आठवडे आंत्रविषार रोगाचे लसिकरण करून घ्यावे. शेळीकडून रोगाविरुद्धची प्रतिकारशक्ती करडाला मिळते आणि त्यामुळे करडू जन्मल्यानंतर तीन आठवडे आंत्रविषार या रोगाला बळी पडत नाहीत.