

५) ट्रीपॅनोझोमियासिस (सरा)

कारणे - ट्रीपॅनोझोमियासिस हा रोग मुख्यत्वे गाई, म्हशी, घोडे, गाढव, शेळी, मेंढी, डुकरे,उंट, कुत्रे इ. प्राण्यांना तसेच प्राण्यांपासून मानवास देखील रोग प्रसार झाल्याचे आढळून आले आहे. हा रोग उष्णकटीबंधीय प्रदेशांमध्ये जास्त करून होतो. तसेच, पावसली हवामानामध्ये या रोगाचा प्रसार होऊ शकतो.

प्रसार - सर्वसाधारणपणे या रोगाचा प्रसार रक्त शोषणा-या माशांमुळे/किटकांमुळे होतो परंतु घोड्यांमध्ये डॉवरीन रोग हा कीटक चावल्यामुळे होत नाही. रक्त शोषणा-या माशा/किटक चावल्यामुळे एका बाधित जनावरापासून इतर जनावरांना हा रोग झपाट्याने पसरू शकतो. या रोगाचा कालवधी एक ते दोन आठवड्यांचा असतो. परंतु, कधी कधी दोन महिने व त्यापेक्षा कमी कालावधी असू शकतो.

लक्षणे - या रोगजंतुची बाधा झाल्यानंतर सुमारे 10 ते 40 दिवसात रोग लक्षणे दिसायला लागतात.यामध्ये जनावरांची तब्येत ढासळत राहते, शरीराचे तापमान कमी जास्त होते, रक्तक्षय होतो, त्वचेवर चट्टे पडून खाज सुटते, मानेच्या पोळीला व जबड्याच्या ग्रंथीला सुज येते, कांही गुरांमध्ये डोळे लाल होवून पाणी येणे, गुरे उत्तेजित होवून भिंत, खांबाला जोराने डोके आपटणे व स्वतःभोवती गोल फिरणे इ. लक्षणे दिसून येतात व योग्य उपचार न झाल्यास जनावरे असह्य वेदना होवून गुरे तडफडून मृत्यु पावतात.

रोगनिदान - रोगनिदानासाठी रक्तकाचपट्टी तपासणी करणे, एलायझा चाचणी, बायलोजिकल चाचणी, किंवा पीसीआर तंत्र वापरले जाते.

उपचार - रोग उपचारासाठी उपलब्ध औषधे दक्षतेने पशुवैद्यकीय तज्ञांमार्फत उचित मात्रांमध्ये वापरणे हिताचे असते.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - रोगप्रतिबंध करण्यासाठी ज्या भागामध्ये हा आजार नेहमी होतो त्या भागात आढळणा-या रक्त शोषणा-या माशा/किटक यांचा नायनाट करणे नक्कीच हितावह असते. त्यामुळे पशुपालकाचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येते.

