

Komplexa tal och funktioner

Som uppvärmning läs 1.8 om komplexa tal.

1) Komplexa tal kan skrivas på olika former.

För växelström med fasförskjutning ϕ gäller att spänningen ges av

$$V = V_0 \sin(\omega t + \phi)$$

Med den så kallade hjälpvinkel-metoden kan $A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ relateras till $C \sin(\omega t + \phi)$ genom att använda additionsformeln:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha).$$

Vi får

$$C \sin(\omega t + \phi) = C (\sin(\omega t) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\omega t))$$

så att $C \cos(\phi) = A$ och $C \sin(\phi) = B$.

$$C \sin(\omega t + \phi) = C (\sin(\omega t) \cos(\phi) + \sin(\phi) \cos(\omega t)) =$$

$$(C \cos(\phi)) \sin(\omega t) + (C \sin(\phi)) \cos(\omega t) =$$

$$A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t).$$

Vi ser då också att $A^2 + B^2 = C^2 \cos^2(\phi) + C^2 \sin^2(\phi) = C^2$.

Vinkeln fås sedan från $\cos(\phi) = A/C$ och $\sin(\phi) = B/C$.

Observera att man måste med hjälp av båda uttrycken avgöra vilken kvadrant man är i. A/C positiv och B/C positiv innebär första kvadranten. Men A/C positiv och B/C negativ innebär fjärde kvadranten.

Skriv ett program som beräknar fasförskjutningen ϕ för en spänning som ges av

$V = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ för godtyckliga värden på A och B som input från användaren. Fasförskjutningen ska ges som en vinkel mellan 0 och 2π (testa så det verkligen fungerar för alla kvadranter). A ska vara koefficienten framför sinus och B koefficienten framför cosinus.

2) En av Eulers formler är

$$\sin(\phi) = \frac{e^{i\phi} - e^{-i\phi}}{2i}.$$

Testa python genom att undersöka för några värden (ca 10), gör en tabell, på vinklar om höger led och vänster led ger samma resultat. I python använder du j i stället för i ! Observera att vinklar är förinställt på radianer så 0,2 (eller 0.2) är 0,2 radianer.

3) Trigonometriska funktioner skrivs ofta i fysiken på formen $z = r e^{j\omega t}$.
Avsikten med denna uppgift är att du ska studera hur realdel och imaginärdel, absolutbelopp och vinkel beror på tiden.

Exempel:

$$\operatorname{Re}(r e^{j\omega t}) = r \cos(\omega t)$$

$$\operatorname{Im}(r e^{j\omega t}) = r \sin(\omega t)$$

$$|r e^{j\omega t}| = r$$

$$\phi = \omega t$$

En komplexvärd funktion ges av $z(t) = 2e^{0,3jt}$. Där $r=2$ och $\omega=0,3$.

Plotta realdelen som en funktion av t .

Plotta imaginärdelen som en funktion av t .

Plotta absolutbeloppet som funktion av t (reellt tal).

Plotta fasvinkeln (det komplexa talets vinkel $\phi = \omega t$) som en funktion av t .

<https://docs.python.org/3/library/cmath.html>

4) Två komplexvärda funktioner ges av a) $z_1(t) = 2e^{0,3jt} + e^{0,5jt}$ och b) $z_2(t) = 1/(3+jt)$.

Plotta som i föregående uppgift och observera att realdel, imaginärdel, absolutbelopp samt vinkel inte är direkt avläsbara i uttrycken.

Tex.

$$z_2(t) = 1/(3+0,2jt) = \frac{3-0,2jt}{(3+0,2jt)(3-0,2jt)} =$$

$$\frac{3-0,2jt}{9+0,04t^2} = \frac{3}{9+0,04t^2} - \frac{0,2t}{9+0,04t^2}j$$

varur realdel, imaginärdel osv. kan beräknas.

Observera att detta inte är det allmänna problemet $u+jv=f(x+jy)$. Detta kan studeras genom tex att x och y bildar \mathbb{R}^2 och sedan studeras $\operatorname{Re} f = u$ som den tredje dimensionen; eller $\operatorname{Im} f$ ger v som den tredje osv..

5) Läs 3.9 (på Jupyter) ”Lösningar till polynomekvationer” och **ange lösningarna** till det komplexa polynomet $z^3 + 2z^2 - (1 - j)z = 0$ och de **kod-rader i python** som genererar lösningarna.