

Tarea I - Optimización no lineal

Solución 1. Notemos que la función $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ está bien definida, pues en la recta real extendida siempre existe el supremo. Recordemos que dado $\gamma \in \mathbb{R}$ se define el sub nivel asociado como

$$\Gamma_\gamma(f) := f^{-1}((-\infty, \gamma]) = \{x \in X \mid f(x) \leq \gamma\}$$

Ahora notemos lo siguiente

$$f(x) \leq \gamma \iff \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} f_\alpha(x) \leq \gamma \iff \forall \alpha \in \mathcal{A}, f_\alpha(x) \leq \gamma \quad (1)$$

De lo que concluimos que

$$\Gamma_\gamma(f) = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \Gamma_\gamma(f_\alpha)$$

Dado que cada f_α es τ -s.c.i. tenemos que $\Gamma_\gamma(f_\alpha)$ es cerrado para todo $\alpha \in \mathcal{A}$. Dado que la intersección arbitraria de cerrados es cerrada, tenemos que $\Gamma_\gamma(f)$ es cerrado para todo $\gamma \in \mathbb{R}$, es decir f es τ -s.c.i.

Ahora supongamos que las f_α son convexas para todo $\alpha \in \mathcal{A}$. Por lo tanto tenemos que el epigrafo es convexo para toda f_α . Recordemos que el epigrafo se define como

$$\text{epi}(f) := \{(x, \gamma) \in X \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq \gamma\}$$

Por la ecuación (1), tenemos la siguiente igualdad

$$\text{epi}(f) = \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \text{epi}(f_\alpha)$$

Dado que la intersección (arbitraria) de convexos es convexa, tenemos que $\text{epi}(f)$ es convexo y por tanto f es convexa.

Solución 2. Directo, pues las funciones continuas son semicontinuas inferior, esto es fácil de ver pues tenemos la igualdad

$$\Gamma_\gamma(f) = f^{-1}((-\infty, \gamma])$$

Dado que preimagen de cerrados bajo funciones continuas es cerrado, tenemos que si f es continua, el subnivel es cerrado.

Luego la función $x \mapsto \|Ax - b\|_Y$ es continua, pues $x \mapsto Ax - b$ es continua para $b \in Y$ (pues A es continua). Dado que $\|\cdot\|_Y : Y \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, la composición también lo es.

Solución 3. Notemos que

$$\forall x \in X, \text{Val}(P) \leq f(x) \implies \mu(S) \text{Val}(P) \leq \int_S f d\mu$$

Dado que $\mu(S) = 1$, obtenemos que para toda medida $\mu \geq 0$ tal que $\mu(S) = 1$ se tenga la desigualdad. De esto obtenemos que

$$\text{Val}(P) \leq \text{Val}(P_m)$$

Si consideramos una sucesión minimizante $\{x_n\} \subseteq X$ tal que $f(x_n) \rightarrow \text{Val}(P)$ nos construimos la sucesión de medidas $\{\delta_{x_n}\} \subseteq \mathcal{M}^+$, donde $\delta_{x_n}(A) = 1 \iff x_n \in A$, obtenemos que

$$\int_S f d\delta_{x_n} = f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Val}(P)$$

Por lo tanto $\text{Val}(P) = \text{Val}(P_m)$

Solución 4.

1. En efecto, sea $A, B \in \mathbf{S}^n$, luego tenemos que

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}$$

Comprobemos que en efecto es un producto interno

$$\text{Tr}(A^2) = 0 \iff \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} = 0 \iff \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = 0 \iff \forall i, j \in \{1, \dots, n\} a_{ij} = 0 \iff A = 0$$

Además notemos que de lo anterior tenemos que

$$\langle A, A \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$$

Veamos que es simétrico

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji} = \langle B, A \rangle$$

Verifiquemos linealidad en el primer argumento, pues la bilinealidad sigue de esto y la simetría. Sea $C \in \mathbf{S}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, luego

$$\langle A + \lambda B, C \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{ij} + \lambda b_{ij}) c_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{ji} + \lambda \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} c_{ji} = \langle A, C \rangle + \lambda \langle B, C \rangle$$

Por lo tanto la traza sí define un producto interno. Dado que el espacio es de dimensión finita tenemos que es completo y por tanto un espacio de Hilbert.

2. Notemos que de la definición de P , la matriz es claramente simétrica pues

$$P_{ij} = x_i^T x_j = x_j^T x_i = P_{ji}$$

Veamos que $P = X^T X$. Notemos que

$$(X^T X)_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{k,i} x_{k,j} = x_i^T x_j$$

Por lo tanto se tiene la igualdad $P = X^T X$. Si $b \in \mathbb{R}^n$, tenemos que

$$b^T P b = b^T X^T X b = (Xb)^T Xb = \|Xb\|^2 \geq 0$$

Solución 5. (\Leftarrow) Supongamos que para todo $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ se tiene que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \implies f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Luego dado $x, y \in X$ y $\lambda \in [0, 1]$, tenemos que $\lambda + (1 - \lambda) = 1$, por lo tanto por hipótesis tenemos que

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Es decir, f es convexa.

(\Rightarrow) Procedamos por inducción. El caso para $n = 2$ es trivial, pues es la convexidad usual. Supongamos para n y demostramos para $n + 1$, Sean $x_1, \dots, x_{n+1} \in X$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in [0, 1]$ tal que sumen 1. Luego tenemos que

$$f(\lambda_{n+1}x_{n+1} + (1 - \lambda_{n+1})\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right)) \leq \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) + (1 - \lambda_{n+1})f\left(\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{1 - \lambda_{n+1}} x_k\right)$$

Dado que los coeficientes de la derecha suman 1, pues $1 - \lambda_{n+1} = \sum_{k=1}^n \lambda_k$, aplicamos la hipótesis de inducción y obtenemos que

$$f\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) \leq \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) + \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k) = \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k f(x_k)$$