abs-id = 115

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Les solutions de l'équation $x^2 = 4$ sont :

- ☐ **a.** 4 et -4
- ☐ **b.** 2 et -2
- ☐ **c.** 16
- ☐ **d.** 0 et 4

Question 1.2

Un quart de $\frac{8}{5}$ est égal à :

- ☐ **a.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{8}{1{,}25}$
- ☐ **c.** $\frac{32}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{5}$

Question 1.3

On donne la formule physique :

$$P = m \times g.$$

On a alors :

- ☐ **a.** $m = P - g$
- ☐ **b.** $m = \dfrac{P}{g}$
- ☐ **c.** $m = P \times g$
- ☐ **d.** $m = \dfrac{g}{P}$

Question 1.4

La médiane de la série de valeurs $3\,;8\,;4\,;10\,;7$ vaut :

☐ **a.** 4 ☐ **b.** 7 ☐ **c.** 6,4 ☐ **d.** 8

Question 1.5

Une aire de $2\,500\,\text{cm}^2$ est égale à :

- ☐ **a.** $2{,}5\,\text{m}^2$
- ☐ **b.** $0{,}25\,\text{m}^2$
- ☐ **c.** $25\,\text{m}^2$
- ☐ **d.** $0{,}025\,\text{m}^2$

Question 1.6

Le nombre d'abonnés d'un compte a été multiplié par 2 en 1 mois.
Cela correspond à une hausse de :

☐ **a.** 2 % ☐ **b.** 50 % ☐ **c.** 100 % ☐ **d.** 200 %

Question 1.7

L'ensemble des solutions de l'équation $(1-2x)(3x-5)=0$ est :


☐ **a.** $\{1,5\}$ ☐ **b.** $\left\{\frac{1}{2},\frac{3}{5}\right\}$ ☐ **c.** $\left\{\frac{1}{2},\frac{5}{3}\right\}$ ☐ **d.** $\left\{2,-\frac{3}{5}\right\}$

Question 1.8


Dans un lycée, les 140 élèves de Seconde se répartissent ainsi selon leur LVB : 50 étudient l'allemand (Al), 20 étudient l'anglais (An), alors que le reste des élèves étudient l'espagnol (Es).

Le diagramme circulaire représentant la situation est :


☐ **a.**




☐ **b.**



☐ **c.**



☐ **d.**




Question 1.9

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f et la droite (d) d'équation $y=1$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant 1$ est :

- ☐ **a.** $[-2,1]$
- ☐ **b.** $[-1,1]$
- ☐ **c.** $]-\infty,-2] \cup [1,+\infty[$
- ☐ **d.** $[-2,2]$



Question 1.10

On considère les nombres :

$$A = \frac{2}{5}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{4}{9} \quad \text{et} \quad D = 0{,}45.$$

Quel est le plus petit de ces nombres ?

☐ **a.** A ☐ **b.** B ☐ **c.** C ☐ **d.** D

Question 1.11

On considère la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 2x - 3$.

Un antécédent de -3 par f est :

- ☐ **a.** -3
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** -18
- ☐ **d.** 2

Question 1.12

On considère la droite (d) passant par le point A de coordonnées $(1\,;3)$ et de coefficient directeur 2.

Le point B de (d) ayant pour abscisse 4 a pour ordonnée :

- ☐ **a.** 4
- ☐ **b.** 6
- ☐ **c.** 8
- ☐ **d.** 9