abs-id = 130

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Soit x un nombre réel non nul. On considère l'expression $\dfrac{x^7}{x^3}$.
Elle est égale à :

- ☐ **a.** x^{10}
- ☐ **b.** x^4
- ☐ **c.** $4x$
- ☐ **d.** x^{-4}

Question 1.2

Une population augmente de 8 %.
Le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation vaut :

- ☐ **a.** 0,92
- ☐ **b.** 8
- ☐ **c.** 1,08
- ☐ **d.** 0,08

Question 1.3

On lance un dé à six faces bien équilibré.

Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\dfrac{2}{5}$
- ☐ **c.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{6}$

Question 1.4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4 - 3x$.
L'image de -2 par f vaut :


- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 10
- ☐ **d.** 6

Question 1.5

La droite dessinée ci-contre représente une fonction affine.

Son coefficient directeur vaut :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **c.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** 3
- ☐ **d.** $-\frac{1}{3}$



Question 1.6

Après une baisse de 25 %, le prix d'un manteau est de 90 €.
Quel était son prix initial ?

- ☐ **a.** 112,50 €
- ☐ **b.** 120 €
- ☐ **c.** 115 €
- ☐ **d.** 67,50 €

Question 1.7

Une série statistique comporte les valeurs suivantes : 10 ; 13 ; 15 ; 12 ; 20.
La médiane vaut :

- ☐ **a.** 13
- ☐ **b.** 14
- ☐ **c.** 12
- ☐ **d.** 15


Question 1.8

On considère deux événements A et B tels que $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$ et $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}3$.
La probabilité $\mathrm{P}(A \cap B)$ vaut :

- ☐ **a.** 0,7
- ☐ **c.** 0,1
- ☐ **b.** 0,12
- ☐ **d.** 0,75

Question 1.9

Quel est le signe du coefficient directeur de la droite d'ajustement convenant le mieux au nuage de points représenté ci-dessous ?



- ☐ **a.** strictement positif
- ☐ **c.** strictement négatif
- ☐ **b.** nul
- ☐ **d.** impossible à déterminer

Question 1.10

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = 5$ et satisfaisant, pour tout entier naturel n, la relation $u_{n+1} = u_n + 2$. Le terme u_{12} vaut :

- ☐ **a.** 24
- ☐ **c.** 29
- ☐ **b.** 19
- ☐ **d.** 17

Question 1.11

On considère la droite passant par le point A(1 ; 2) et de coefficient directeur 3. Son équation réduite est :

- ☐ **a.** $y = 3x - 1$
- ☐ **c.** $y = x + 3$
- ☐ **b.** $y = 3x + 1$
- ☐ **d.** $y = 2x + 3$

Question 1.12

On considère la suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 1{,}2$. Le terme u_2 vaut :

- ☐ **a.** 7
- ☐ **b.** 7,2
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 8,4