abs-id = 151

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un ordre de grandeur de $51 \times 19\,861$ est :

- ☐ **a.** $1\,000$
- ☐ **b.** $10\,000$
- ☐ **c.** $100\,000$
- ☐ **d.** $1\,000\,000$

Question 1.2

On considère un pavé droit de dimensions $4\,\text{cm} \times 5\,\text{cm} \times 6\,\text{cm}$.
Son volume en cm^3 est :

- ☐ **a.** 15
- ☐ **b.** 26
- ☐ **c.** 34
- ☐ **d.** 120

Question 1.3

La fonction f définie, pour tout réel x, par $f(x) = 4x + 3$ est :

- ☐ **a.** linéaire
- ☐ **b.** affine non linéaire
- ☐ **c.** décroissante sur $\mathbb{R}$
- ☐ **d.** de valeur nulle deux fois


Question 1.4

On considère une cuve de $3{,}5\,\text{m}^3$. Sa contenance en litres est :

- ☐ **a.** 35
- ☐ **b.** 350
- ☐ **c.** $3\,500$
- ☐ **d.** $35\,000$

Question 1.5

On a représenté ci-dessous une droite (d).




Son équation réduite est :

- **a.** $y = x + \dfrac{1}{2}$
- **b.** $y = \dfrac{1}{2}x + 1$
- **c.** $y = 2x + 1$
- **d.** $y = \dfrac{1}{2}x - 2$

Question 1.6

Ci-dessous, on a donné la représentation graphique d'une fonction f, qui est définie sur l'intervalle $[-4, 4]$. La fonction f s'annule en -3 et 1.



L'ensemble des solutions de $f(x) \geqslant 0$ est :

- **a.** $]-1, 3[$
- **b.** $[-1, 3]$
- **c.** $]-3, 1[$
- **d.** $[-3, 1]$

Question 1.7

Si x est la solution de l'équation $2x - 1 = 7$, alors $4x$ vaut :

- **a.** 4
- **b.** 12
- **c.** 14
- **d.** 16

Question 1.8

L'inéquation $\dfrac{2x+6}{x-1} \leqslant 0$ est équivalente à :

- **a.** $-3 \leqslant x \leqslant 1$
- **b.** $1 \leqslant x \leqslant 3$
- **c.** $-3 \leqslant x < 1$
- **d.** $x \leqslant -3$ ou $x > -1$

Question 1.9

La forme développée et réduite de $(x-3)(x+1) - (x-6)$ est :

- **a.** $x^2 - 3x - 3$
- **b.** $x^2 - 3x + 3$
- **c.** $x^2 + 3x - 3$
- **d.** $-x + 3$

Question 1.10

En simplifiant l'écriture de $A = \dfrac{\frac{6}{7} + 2}{\frac{3}{7} - 2}$, on obtient :

- **a.** $A = 8$
- **b.** $A = \dfrac{8}{49}$
- **c.** $A = -\dfrac{220}{49}$
- **d.** $A = -\dfrac{20}{11}$

Question 1.11

Le prix d'un ordinateur diminue de 20 %. Pour retrouver son prix initial, il faut lui appliquer une augmentation de :

- **a.** 10 %
- **b.** 15 %
- **c.** 20 %
- **d.** 25 %

Question 1.12

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x-2)^2 - 4$.
L'ensemble des antécédents de 0 par f est :

- **a.** $\{0\}$
- **b.** $\{0, 4\}$
- **c.** $\{2, -2\}$
- **d.** $\{4\}$