abs-id = 16

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Que valent 20 % de 120 ?

- ☐ **a.** 18
- ☐ **b.** 24
- ☐ **c.** 36
- ☐ **d.** 40

Question 1.2

Un ordre de grandeur du triple de 497 est :

- ☐ **a.** 500
- ☐ **b.** 1 000
- ☐ **c.** 1 500
- ☐ **d.** 5 000

Question 1.3

Si on multiplie le prix d'un article par 0,85, alors le prix :

- ☐ **a.** augmente de 15 %
- ☐ **b.** diminue de 15 %
- ☐ **c.** diminue de 85 %
- ☐ **d.** diminue de 8,5 %

Question 1.4

Parmi les quatre nombres suivants, lequel n'est pas égal à $\frac{3}{4}$?

- ☐ **a.** 0,75
- ☐ **b.** $\frac{75}{100}$
- ☐ **c.** $\frac{33}{44}$
- ☐ **d.** $\frac{46}{64}$

Question 1.5

On considère le réel $A = \frac{4}{3} - \frac{7}{6}$. On a :

- ☐ **a.** $A = -1$
- ☐ **b.** $A = \frac{1}{6}$
- ☐ **c.** $A = \frac{2}{3}$
- ☐ **d.** $A = \frac{1}{3}$

Question 1.6

Soient x et y deux réels. On considère l'expression $C = 2x^2 - 5y + 1$.
Quelle est la valeur de C quand $x = -\frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{6}$?

- ☐ **a.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\frac{2}{3}$
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** $\frac{5}{6}$

Question 1.7

La forme développée et réduite de $(3x - 2)(x + 3)$ est :

- ☐ **a.** $3x^2 + 7x - 6$
- ☐ **b.** $4x + 1$
- ☐ **c.** $3x^2 - 2x - 6$
- ☐ **d.** $3x - 6$

Question 1.8

On considère le tableau de répartition des élèves d'un lycée.

	Seconde	Première	Terminale	total
internes	35	20	45	100
externes	170	165	185	520
total	205	185	230	620

On choisit au hasard un élève de Seconde de ce lycée.
La probabilité que cet élève soit un interne vaut :

- ☐ **a.** $\frac{35}{100}$
- ☐ **b.** $\frac{35}{620}$
- ☐ **c.** $\frac{35}{205}$
- ☐ **d.** $\frac{100}{205}$

Question 1.9

Le prix d'un article, après une augmentation de 20 %, est 216 €.
Son prix initial était de :


- ☐ **a.** 180 €
- ☐ **b.** 190 €
- ☐ **c.** 196 €
- ☐ **d.** 200 €

Question 1.10

On a représenté une fonction sur le graphique ci-contre.

L'ensemble des antécédents de 2 par cette fonction est :

- ☐ **a.** $\{0\}$
- ☐ **b.** $\{1\}$
- ☐ **c.** $\{2\}$
- ☐ **d.** $\{0, 3\}$



Question 1.11

La solution réelle de l'équation $3x - 7 = -x + 5$ est :

- **a.** 1
- **b.** 2
- **c.** 3
- **d.** 4

Question 1.12

On considère la fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \dfrac{3x+1}{4}. \end{cases}$$

Le coefficient directeur de la droite qui représente f est égal à :

- **a.** 3
- **b.** $\dfrac{3}{4}$
- **c.** $\dfrac{1}{4}$
- **d.** 1