abs-id = 34

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'opposé du carré de -3 est :

- ☐ **a.** 6
- ☐ **b.** -9
- ☐ **c.** 9
- ☐ **d.** -6

Question 1.2

Le prix d'une paire de chaussures a baissé de $15\,\%$. Il a été multiplié par :

- ☐ **a.** $1{,}15$
- ☐ **b.** $-0{,}15$
- ☐ **c.** $-1{,}15$
- ☐ **d.** $0{,}85$

Question 1.3

L'équation $-3 + x = 4$ a pour solution :

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 7
- ☐ **d.** $\frac{4}{3}$

Question 1.4

On considère le nombre $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $A = \frac{2}{9}$
- ☐ **c.** $A = \frac{1}{9}$
- ☐ **d.** $A = \frac{2}{6}$

Question 1.5

L'image de -1 par la fonction f définie par $f(x) = -2x - 1$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** -3
- ☐ **d.** 2

Question 1.6

On considère le nombre $B = \frac{2^5 \times 2^3}{2^6}$. On a :

- ☐ **a.** $B = 2$
- ☐ **b.** $B = 4$
- ☐ **c.** $B = 8$
- ☐ **d.** $B = 16$

Question 1.7


L'image de -2 par la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + x$ est :

- ☐ **a.** -10
- ☐ **b.** -6
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** -8

Question 1.8

Ci-contre, on a tracé un vecteur $\vec{u}$.
Ses coordonnées sont :


- ☐ **a.** $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$
- ☐ **b.** $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$
- ☐ **c.** $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$
- ☐ **d.** $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$



Question 1.9

Ci-contre, on a tracé une droite (d).
Son coefficient directeur vaut :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** 3
- ☐ **c.** -3
- ☐ **d.** $\frac{1}{3}$




Question 1.10

L'ensemble des nombres réels x tels que $-2 < x \leqslant 3$ est :

- ☐ **a.** $[-2, 3]$
- ☐ **b.** $]-2, 3]$
- ☐ **c.** $[-2, 3[$
- ☐ **d.** $]-2, 3[$

Question 1.11

On considère la fonction f, définie sur l'intervalle $[-2, 2]$ et représentée ci-dessous.



Le nombre d'antécédents de 1 par f est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.12

En électricité, la puissance P, la résistance R et l'intensité I sont liées par la relation

$$P = RI^2.$$

En supposant que toutes ces quantités sont strictement positives, on a :

- ☐ **a.** $R = \dfrac{I^2}{P}$
- ☐ **b.** $I = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{P}{R}$
- ☐ **c.** $I = \dfrac{\sqrt{R}}{P}$
- ☐ **d.** $I = \sqrt{\dfrac{P}{R}}$