abs-id = 74

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 2^3 + 3^2$. On a :

- ☐ **a.** $A = 17$
- ☐ **b.** $A = 12$
- ☐ **c.** $A = 5^5$
- ☐ **d.** $A = 5^6$


Question 1.2

La somme du double de 3 et de la moitié de 24 vaut :

- ☐ **a.** 54
- ☐ **b.** 30
- ☐ **c.** 21
- ☐ **d.** 18

Question 1.3

On relève la couleur des voitures sur un parking et on représente les résultats dans le camembert ci-contre.



La proportion des voitures qui ne sont pas blanches est :

- ☐ **a.** 75 %
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** 25 %
- ☐ **d.** $\frac{2}{3}$

Question 1.4

Dans le plan muni d'un repère, on considère les points A$(0\,;2)$ et B$(-2\,;1)$.
Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut :

- ☐ **a.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **b.** $-\frac{1}{2}$
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** -2

Question 1.5

On considère le nombre $B = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{4}$. On a :

- ☐ **a.** $B = \frac{21}{12}$
- ☐ **b.** $B = 3$
- ☐ **c.** $B = \frac{7}{4}$
- ☐ **d.** $B = \frac{5}{4}$

Question 1.6

On augmente une valeur de 20 %, puis on la diminue de 20 %.
Finalement, la valeur initiale a été multipliée par :

- ☐ **a.** 0,64
- ☐ **b.** 0,96
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 1,44

Question 1.7

Combien vaut la moyenne de la série de nombres

4 ; 4,7 ; 5,4 ; 7 ; 8,9 ?

- ☐ **a.** 5
- ☐ **b.** 5,4
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 6,45

Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 1$.
Le nombre d'antécédents de 3 par f est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.9

On considère l'expression $C(x) = (2x-1)(2x+1) - (x-5)$.
La forme développée et réduite de $C(x)$ est :

- ☐ **a.** $2x^2 - x - 6$
- ☐ **b.** $2x^2 - x + 4$
- ☐ **c.** $4x^2 - x + 4$
- ☐ **d.** $4x^2 - x - 6$

Question 1.10

On considère deux événements A et B.
On donne le tableau d'effectifs ci-contre et on choisit un individu au hasard.


	A	$\overline{A}$
B	10	15
$\overline{B}$	25	10

La probabilité conditionnelle $P_A(B)$ vaut :

- ☐ **a.** $\frac{1}{6}$
- ☐ **b.** $\frac{2}{7}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{5}{12}$

Question 1.11

On considère la fonction f, définie sur $\mathbb{R}$, représentée ci-dessous.



Le tableau de signes correspondant à f est :

a.

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b.

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

c.

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	

d.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 1.12

La suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de raison 2 et telle que $u_1 = 1$ vérifie :

a. $u_3 = 4$ **b.** $u_3 = 5$ **c.** $u_3 = 6$ **d.** $u_3 = 7$