

Геометрия редукции

Сергей Омаров*

Апрель 2026

Аннотация

Документ описывает структурное отношение между полным устройством сущего и тем его срезом, который доступен наблюдению. Формулирует это отношение в общих терминах, без привязки к конкретному физическому, философскому или психологическому содержанию. Геометрия редукции описывает четыре уровня структурного отношения: между S и $R(S)$, деление компонент на симметричные и асимметричные, параметрическое пространство точек редукции с подмножеством точек, допускающих наблюдателя, и двойную вложенность редукций — внешней $S \rightarrow R(S)$ и внутренней, структурирующей отдельные измерения $R(S)$ через память наблюдателя.

Содержание

1. Природа этих материалов	3
2. Полная структура и редуцированное описание	3
3. Симметричные и асимметричные компоненты	4
4. Пространство точек редукции	4
5. Наблюдатель	5
6. Внутренняя редукция	5
7. Структурируемое измерение	5
8. Предел описательных средств	6
9. Итог	6

1. Природа этих материалов

Настоящий документ описывает структурное отношение между полным устройством сущего и тем его срезом, который доступен наблюдению. Он формулирует это отношение в общих терминах, без привязки к конкретному физическому, философскому или психологическому содержанию. Конкретные применения возможны, но в данный текст не входят.

2. Полная структура и редуцированное описание

Полная структура S есть устройство сущего, взятое во всём его составе.

Наблюдаемое описание есть не S , а его редуцированная форма $R(S)$, где R — оператор редукции, преобразующий полную структуру в форму, пригодную для регистрации наблюдением.

Редукция по своему своему смыслу есть преобразование с потерями. Если потерь нет, то это не редукция, а полное преобразование. Следовательно, между S и $R(S)$ всегда существует разница, и эта разница конститутивна для самого понятия редукции.

Это положение не вводит новых сущностей. Оно фиксирует структурное отношение, которое имеет место всякий раз, когда наблюдаемое отделяется от полного устройства наблюдаемого.

3. Симметричные и асимметричные компоненты

Компоненты S , симметричные относительно R , при редукции дают устойчивые формы. Эти формы воспроизводятся одинаково при всяком применении R и образуют то, что в $R(S)$ читается как законы, регулярности, инварианты.

Компоненты S , асимметричные относительно R , при редукции дают остатки — следы, не сводимые к устойчивым формам. В $R(S)$ они читаются как аномалии, остаточные напряжения, необъяснимые в рамках выведенных законов параметры.

Различие между симметричной и асимметричной частью S не есть различие в их собственной природе. Это различие относительно R . Один и тот же компонент S может быть симметричным относительно одной редукции и асимметричным относительно другой.

Следовательно, состав законов и состав аномалий в $R(S)$ определяется не только S , но и выбором R .

4. Пространство точек редукции

R не есть единственное преобразование. Оператор редукции имеет параметризацию — множество возможных способов произвести редукцию из S . Каждому значению параметра соответствует своя точка редукции, и в каждой такой точке возникает своё $R(S)$.

Пространство точек редукции есть параметрическое пространство, не пространство актуализаций. Точки в нём имеют статус возможностей. Утверждение об этом пространстве есть утверждение о структуре S , допускающей разные способы редукции, а не утверждение о существовании множества отдельных миров.

В каждой точке редукции состав симметричных и асимметричных компонент свой. Следовательно, и состав законов, и состав аномалий в $R(S)$ различен от точки к точке.

Содержание конкретной точки редукции — то, как именно в ней выглядит $R(S)$ — не выводится из самой геометрии. Геометрия описывает структуру отношения между S и точкой, но не предписывает, чем именно заполнена точка.

5. Наблюдатель

$R(S)$ обретает определённую структуру только при наличии в точке наблюдателя.

Наблюдатель есть то, через что $R(S)$ становится не просто потенциальной формой, а структурой, имеющей содержание. Без наблюдателя точка редукции остаётся точкой в параметрическом пространстве, но не порождает описуемого среза сущего.

Не всякая точка редукции допускает формирование наблюдателя. Подмножество точек, в которых наблюдатель возможен, есть собственное подмножество в пространстве всех точек редукции.

Это подмножество не выделяется внешним отбором. Оно является следствием того, какие точки совместимы со сборкой структуры, способной выступать наблюдателем.

6. Внутренняя редукция

В точке, допускающей наблюдателя, помимо внешней редукции $S \rightarrow R(S)$ действует внутренняя редукция, через которую отдельные измерения $R(S)$ обретают свою структуру.

Внутренняя редукция выполняет относительно одного измерения $R(S)$ ту же функцию, которую внешняя редукция выполняет относительно S в целом: преобразует материал в структурированную форму с потерями.

Носителем внутренней редукции выступает функция удержания и преемственности — память. Память не создаёт измерение, к которому применяется. Она его структурирует.

Из этого следует, что в точке, допускающей наблюдателя, существуют по меньшей мере две вложенные редукции: внешняя, отделяющая $R(S)$ от S , и внутренняя, формирующая структуру внутри $R(S)$ через работу памяти наблюдателя.

7. Структурируемое измерение

Время в $R(S)$ точки, допускающей наблюдателя, есть измерение, получающее структуру через работу внутренней редукции.

Время как материал может присутствовать в $R(S)$ как одна из её компонент. Структура времени — последовательность, направленность, различение раньше и позже — не присутствует в материале сама по себе. Она возникает через память наблюдателя.

Следовательно, утверждение о структурированности времени относится к точке, допускающей наблюдателя, а не к S как таковой. В точках, не допускающих наблюдателя, нет основания приписывать времени структуру, а значит, нет основания говорить о темпоральной развёртке как таковой.

Это не утверждение о существовании в неназываемых точках бесструктурного времени. Это утверждение о том, что без структурирующей функции категория времени в полном смысле к точке неприменима.

8. Предел описательных средств

В $R(S)$ могут присутствовать сущности, не сводимые к её описательным средствам.

Такая сущность регистрируется в $R(S)$ — она в ней присутствует, с ней возможно взаимодействие, её свойства поддаются измерению. Но какие-то аспекты её устройства в категориях $R(S)$ не читаются.

Эмпирическим примером служит свет. Он присутствует в $R(S)$ нашей точки, регистрируется и измеряется. При этом некоторые его свойства — в частности те, которые в нашей $R(S)$ принимаются как нулевые или как граничные значения, — указывают на то, что свет не помещается в нашу $R(S)$ полностью.

Это не утверждение о собственном устройстве света. Это утверждение о пределе $R(S)$: в ней есть нечто, выходящее за её описательные средства.

Из этого следует, что $R(S)$ не замкнута относительно собственного содержания. В неё могут входить элементы, чьё устройство не выводимо из её внутренних категорий.

9. Итог

Геометрия редукции описывает четыре уровня структурного отношения.

Первый — отношение S и $R(S)$: полная структура и её редуцированное описание, всегда разделённые конститутивной разницей.

Второй — деление компонент S на симметричные и асимметричные относительно R , дающее в $R(S)$ законы и остатки соответственно.

Третий — параметрическая природа R , порождающая пространство точек редукции, в котором подмножество точек допускает наблюдателя.

Четвёртый — двойная вложенность редукций в точке, допускающей наблюдателя: внешняя редукция $S \rightarrow R(S)$ и внутренняя редукция, структурирующая отдельные измерения $R(S)$ через память наблюдателя.

В пределах $R(S)$ могут присутствовать сущности, не сводимые к её описательным средствам. Этот факт не нарушает геометрию, а указывает на её собственную границу: $R(S)$ описывает то, что в неё помещается, и не претендует на то, что в неё не помещается.
