

12-недельная программа перенастройки мозга при тревожном расстройстве

Комбинация: интероцептивная экспозиция (для панических атак) + когнитивная реструктуризация (для ГТР) + дыхательные практики + телесная работа (йога/мышечная релаксация) + дневник.

Логика: сначала учимся замечать и регулировать (недели 1-4), потом целенаправленно "разучиваем" страх телесных ощущений (5-8), потом закрепляем в реальных ситуациях и строим план на будущее (9-12).

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КАРКАС (одинаковый всю программу, 20-30 мин в сумме)

Утро (5-7 мин)

- Дыхание по протоколу недели (см. ниже)
- 1 строчка в дневнике: "Сегодня я боюсь _____. Сегодня я буду делать _____ несмотря на это."

День — по ситуации

- Если накрывает тревога/паника: техника "Заметил-Назвал-Подышал" (см. ниже) + запись в лог приступа

Вечер (10-15 мин)

- Телесная практика недели (йога/PMR/растяжка)
- Дневник: 3 колонки — Мысль → Насколько верю (0-100%) → Более реалистичная мысль
- 1 строчка благодарности/самоподдержки (не про достижения, а про "я это выдержал")

Лог приступа (заполнять только когда реально была атака/сильная тревога) Дата/ время → Что предшествовало → Телесные симптомы → Мысль в моменте ("я умираю/задыхаюсь/схожу с ума") → Что сделал → Через сколько отпустило → Что реально произошло (спойлер: ничего)

Этот лог за 3 месяца станет вашим главным доказательством мозгу: “тревога всегда проходит, катастрофы не было”.

НЕДЕЛИ 1-2: Психообразование + база дыхания

Дыхание: диафрагмальное (4-4-6): вдох носом 4 сек, задержка 4 сек, выдох ртом 6 сек, 5-10 циклов. Цель — не “успокоиться усилием”, а физически замедлить пульс.

Задача недели: просто наблюдать и записывать, ничего не форсировать. Понять: тошнота/боль в животе — это симпатическая нервная система, а не болезнь (врач уже подтвердил). Полезно почитать/посмотреть коротко про физиологию панической атаки — понимание механизма само снижает страх перед ней.

Телесная практика: мягкая растяжка 10 мин перед сном (шея, плечи, поясница — там обычно держится хронический тревожный зажим).

НЕДЕЛИ 3-4: Мышечная релаксация + первая работа с мыслями

Дыхание: box breathing (4-4-4-4) — вдох-задержка-выдох-задержка по 4 сек. Используйте это как “аварийную кнопку” при первых признаках тревоги, а не только вечером.

Новое: прогрессивная мышечная релаксация (PMR) 10-15 мин вечером — последовательно напрягать/расслаблять группы мышц от стоп до лица. Есть готовые аудио-гиды, можно найти по запросу “PMR 15 минут”.

Работа с мыслями: в дневнике добавьте вопрос к каждой тревожной мысли:

- “Что самое страшное может случиться реально?”
- “Случалось ли это раньше хоть раз за 17 лет?”
- “Что бы я сказал другу с такой же мыслью?”

“Время для тревоги” (worry time): выделите 15 минут в день (например, 19:00), где специально садитесь и “перетревоживаете” всё, что накопилось. В остальное время, если тревожная мысль лезет вне этого окна — говорите себе “запишу и обдумаю в 19:00” и откладываете. Это разрывает привычку тревожиться круглосуточно.

НЕДЕЛИ 5-6: Начало interoцептивной экспозиции (ключевой этап)

Это специально вызывать телесные ощущения, похожие на паническую атаку, в безопасной обстановке — чтобы мозг перестал их бояться. Делать дома, сидя, никуда не спеша.

Упражнения (выбирайте 2-3, по 30-60 сек каждое, 1 раз в день):

- Быстрое дыхание (гипервентиляция) 30 сек → вызывает головокружение
- Задержка дыхания на выдохе на 20-30 сек → вызывает нехватку воздуха
- Кружение на стуле или на месте 30 сек → вызывает головокружение
- Дыхание через тонкую трубочку 1 мин → вызывает нехватку воздуха
- Бег на месте / приседания 1 мин → вызывает учащённое сердцебиение

После каждого — оцените: страх 0-10, насколько симптомы совпали с симптомами атаки 0-10. Запишите в дневник. Не убегайте от ощущения — досидите, пока не пройдёт само (обычно 1-3 минуты).

Зачем именно это: ваш мозг сейчас трактует “тошнота/спазм в животе/учащённое сердцебиение” как сигнал опасности. Это упражнение напрямую переучивает эту связь.

Телесная практика: мягкая йога с акцентом на дыхание — подойдут виньясы уровня “beginner anxiety relief” или просто “кошка-корова” + “поза ребёнка” + скрутки лёжа, 10-15 мин.

НЕДЕЛИ 7-8: Усиление экспозиции + ситуативная

Дыхание/тело: продолжайте interoцептивные упражнения, увеличивайте время (до 1-2 мин) и интенсивность.

Новое — ситуативная экспозиция: составьте список из 8-10 ситуаций, которых избегаете из-за тревоги, от лёгкой до самой пугающей (иерархия страха, 0-100). Начните с самой лёгкой — заходите в неё специально 2-3 раза в неделю, оставаясь до спада тревоги минимум на 50% от пика, не убегая раньше.

Дневник добавляем колонку: “Что я делал вместо избегания” — отслеживаем поведение, не только мысли.

НЕДЕЛИ 9-10: Принятие + консолидация (элементы АСТ)

Смена рамки: цель — не “убрать тревогу навсегда” (это невозможно и попытки этого добиться сами создают тревогу), а научиться действовать несмотря на неё.

Дневниковый вопрос вечером меняется на:

- “Что я сделал сегодня, что для меня важно, даже когда было тревожно?”

Практика: йога-нидра или длинная медитация тела (15-20 мин) 3-4 раза в неделю — тренирует способность оставаться с дискомфортными ощущениями без борьбы.

Продолжаем: интероцептивную и ситуативную экспозицию, но реже — 3-4 раза в неделю, как поддержку, а не ежедневный тренинг.

НЕДЕЛИ 11-12: Закрепление и план на будущее

Задача: пройти всю иерархию избегаемых ситуаций до конца (или максимально приблизиться).

Финальное упражнение: напишите “письмо себе тревожному” — от лица человека, который прошёл эти 3 месяца, себе в начале пути. Что вы теперь знаете о механизме тревоги, что помогло, чего не нужно бояться.

План профилактики рецидива (обязательно письменно):

1. Какие 3 техники сработали лучше всего лично для меня
 2. Ранние признаки, что тревога нарастает (у каждого свои — например, сон, раздражительность)
 3. Что делать при первых признаках (конкретные 3 шага)
 4. Как часто буду делать поддерживающую практику дальше (например, дыхание + 1 экспозиция в неделю пожизненно, как “техобслуживание”)
-

Важные принципы на все 12 недель

- **Регулярность важнее интенсивности.** 10 минут каждый день сильнее, чем час раз в неделю — мозг переучивается через повторение, не через силу.
- **Не убегайте от упражнения в момент пика тревоги** — именно “досиживание” до спада учит мозг, что сигнал ложный. Уход в момент пика закрепляет страх ещё сильнее.

- **Откаты — это нормально и не значит, что программа не работает.** 17 лет привычки не переписываются линейно.
- **Один параметр за раз.** Если на неделе экспозиции стало сильно хуже — не бросайте, а снизьте интенсивность (короче по времени/мягче упражнение), но не пропускайте совсем.

Могу также сделать вам гугл-табличку/трекер для ежедневных отметок, если удобнее галочками, чем текстом.