

SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA

Definicija 0.1 *Sistem linearnih jednačina S nad poljem F za n -torku nepoznatih (x_1, x_2, \dots, x_n) , $n, m \in \mathbb{N}$, gde su $a_{ij} \in F$ i $b_i \in F$ za $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ i $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, jeste konjunkcija formula (linearnih jednačina) odnosno*

$$S : \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Ako je $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$, onda se za sistem S kaže da je **homogen**. Skalari b_1, b_2, \dots, b_n polja F nazivaju se slobodni članovi.

Skup svih rešenja sistema S označavaće se sa $R_S = \{x \in F^n \mid Ax = b\}$.

Definicija 0.2 *Sistemi S_1 i S_2 ekvivalentni su ako i samo ako imaju iste skupove rešenja, to jest $R_{S_1} = R_{S_2}$.*

Primer 0.3 *Rešiti sisteme jednačina.*

$$\begin{array}{rcl} 3x_1 & - & x_2 = 1 \\ x_1 & + & 2x_2 = 5 \end{array}; \quad \begin{array}{rcl} x_1 & + & 3x_2 = 7 \\ & & x_2 = 2. \end{array}$$

Ova dva sistema su ekvivalentna jer imaju isto rešenje i to $(x_1, x_2) = (1, 2)$.

Primer 0.4 *Rešiti sisteme jednačina.*

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & + & x_2 = 6 \\ x_1 & - & x_2 = 0 \end{array}; \quad \begin{array}{rcl} x_1 & + & x_2 = 4 \\ 2x_1 & + & 4x_2 = 8. \end{array}$$

Prvi sistem jednačina ima jedinstveno rešenje $(x_1, x_2) = (2, 2)$, uvrštavanjem ovog rešenja u drugi sistem zaključujemo da je $(x_1, x_2) = (2, 2)$ i rešenje drugog sistema, međutim drugi sistem ima beskonačno mnogi rešenja $(x_1, x_2) = \{(4 - \alpha, \alpha) \mid \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$ koja nisu rešenja prethodnog sistema, tako da zaključujemo da ova dva sistema nisu ekvivalentna.

Definicija 0.5 *Ekvivalentne (elementarne) transformacije sistema linearnih jednačina:*

1. Zamena mesta jednačinama.
2. Množenje jednačine brojem različitim od nule.
3. Dodavanje jednačine nekoj drugoj jednačini.
4. Promena mesta sabircima u jednačinama (iste nepoznate pišu se jedna ispod druge odnosno u istoj koloni).

Teorema 0.6 *Ekvivalentnim transformacijama skup rešenja sistema se ne menja, to jest ako je sistem S_1 dobijen od sistema S_2 ekvivalentnim transformacijama, tada je $R_{S_1} = R_{S_2}$, odnosno sistemi S_1 i S_2 su ekvivalentni.*

Teorema 0.7 *Homogeni kvadratni sistem linearnih jednačina ima netrivialna rešenja, tj. rešenja različita od $(0, 0, \dots, 0)$, ako i samo ako je determinanta toga sistema jednaka nuli.*

Klasifikacija sistema linearnih jednačina u zavisnosti od rešenja

Sistemi linearnih jednačina mogu da budu rešivi (sistemi koji imaju rešenja, zovu se još i **saglasni sistemi**) i nerešiv (sistemi koji nemaju rešenja).

1. **Saglasni sistemi**-mogući, rešivi.
 - 1.a. **Odredjeni sistemi** - tačno jedno rešenje.
 - 1.b. **Neodređeni sistemi**-više od jednog rešenja, (tj. beskonačno mnogo rešenja).
2. **Nerešivi sistemi**-kontradiktorni, sistemi koji nemaju rešenje, nemogući, protivrečni.

Primer 0.8 *Rešiti sisteme jednačina i prikazati sisteme grefički.*

$$a) \begin{array}{rcl} x & + & y = 3 \\ -x & + & y = 5 \end{array}, \quad b) \begin{array}{rcl} x & + & y = 3 \\ 2x & + & 2y = 6 \end{array}, \quad c) \begin{array}{rcl} x & + & y = 3 \\ x & + & y = 4 \end{array}.$$

Rešenje:

$$a) \begin{array}{rcl} x & + & y = 3 \\ -x & + & y = 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x & + & y = 3 \\ & 2y & = 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x & = & -1 \\ y & = & 4 \end{array}.$$

Sistem je određen i ima tačno jedno rešenje $(x, y) = (-1, 4)$.

$$\begin{array}{rcl} b) \quad x & + & y = 3 \\ 2x & + & 2y = 6 \\ \hline x & + & y = 3 \\ 0 & = & 0 \end{array}.$$

Sistem je jednostruko određen i ima beskonačno mnogo rešenja. Skup rešenja sistema je $(x, y) = \{(\alpha, 3 - \alpha) | \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$.

$$\begin{array}{rcl} c) \quad x & + & y = 3 \\ x & + & y = 4 \\ \hline x & + & y = 3 \\ 0 & = & 1 \end{array}.$$

U ovom primeru sistem je nemoguć, odnosno nerešiv.

Primer 0.9 *Rešiti sistem linearnih jednačina*
$$\begin{array}{rcl} 2x & + & y - z = 1 \\ x & + & y + 2z = 1 \end{array}$$

Rešenje: Prvu jednačinu pomnožimo sa -2 i dodamo je drugoj jednačini

$$\begin{array}{rcl} x & + & y + 2z = 1 \\ 2x & + & y - z = 1 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} x & + & y + 2z = 1 \\ - & y & - 5z = -1 \end{array}$$

Drugu jednačinu pomnožimo sa -1 i tada dobijamo
$$\begin{array}{rcl} x & + & y + 2z = 1 \\ & y & + 5z = 1 \end{array},$$

odakle dobijamo skup rešenja sistema $(x, y, z) = \{(3\alpha, 1 - 5\alpha, \alpha) | \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Primer 0.10 *Rešiti sistem linearnih jednačina.*

$$\begin{array}{rrcr} x & - & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 2y & + & 3z & = & 2 \\ x & - & y & + & 4z & = & 1 \end{array}$$

Prvu jednačinu pomnožimo sa -2 i dodamo drugoj a zatim prvu jednačinu pomnožimo sa -1 i dodamo trećoj jednačini. Dobijamo sistem jednačina koji je ekvivalentan sa polaznim sistemom:

$$\begin{array}{rrcr} x & - & y & + & z & = & 1 \\ & & & & z & = & 0 \\ & & & & 3z & = & 0 \end{array}$$

Sada drugu jednačinu pomnožimo sa -3 i dodamo trećoj jednačini,

$$\begin{array}{rrcr} x & - & y & + & z & = & 1 \\ & & & & z & = & 0 \\ & & & & 0 & = & 0 \end{array}$$

Dakle, dobijamo da je sistem jednostrukoneodređen i rešenje sistema je $(x, y, z) = \{(1 + \alpha, \alpha, 0) | \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Primer 0.11 *U zavisnosti od realnog parametra a , diskutovati sledeće sisteme linearnih jednačina:*

$$\begin{array}{rrcr} 2ax & + & y & = & a \\ 2x & + & ay & = & -1 \end{array}$$

Rešenje: Prvo rešiti determinantu

$$D_s = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} = 2a^2 - 2 = 2(a^2 - 1) = 2(a - 1)(a + 1).$$

1. Prvi sličaj diskusije je kada je determinanta sistema različita od nule.

$D_s = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ 2 & a \end{vmatrix} = 2(a - 1)(a + 1) \neq 0$ akko je $a \neq 1$ i $a \neq -1$ tada je sistem određen tj. ima tačno jedno rešenje.

2. Drugi slučaj diskusije je ako je $a = 1$

$$\begin{array}{rcl} 2x & + & y = 1 \\ 2x & + & y = -1 \\ \hline 2x & + & y = 1 \\ & & 0 = -2 \end{array}$$

Tako da je u ovom slučaju sistem kontradiktoran.

3. Treći slučaj diskusije je ako je $a = -1$

$$\begin{array}{rcl} -2x & + & y = -1 \\ 2x & - & y = -1 \\ \hline -2x & + & y = -1 \\ & & 0 = 0 \end{array}$$

Iz prve jednačine izrazimo y preko x i dobijamo $y = -1 + 2x$. U ovom slučaju sistem je jednostruko neodređen i ima beskonačno mnogo rešenja. Skup rešenja je $(x, y) = \{(\alpha, -1 + 2\alpha) | \forall \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Zadatak 0.12 *U zavisnosti od realnog parametra a , diskutovati sledeći sistem linearnih jednačina:*

$$\begin{array}{rcl} x & + & y + az = 0 \\ x & + & 2y + 3z = -6 \\ 3x & + & ay + 5z = 6 \end{array}$$

i rešiti ga u slučaju neodređenosti.

Rešenje: Prvo rešiti determinantu

$$D_s = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & a & 5 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & a \end{vmatrix} = 10 + 9 + a^2 - 6a - 3a - 5 = a^2 - 9a + 14.$$

1. Sistem je određen kada je determinanta sistema različita od nule, tj. $D_s = a^2 - 9a + 14 = (a - 2)(a - 7) \neq 0$. Odavde sledi da je sistem je određen, tj. ima tačno jedno rešenje za $a \neq 2$ i $a \neq 7$.

2. Zamenom $a = 2$ u početni sistem i množenjem prve jednačine sa -1 i dodavanjem drugoj jednačini i množenjem prve jednačine sa -3 i dodavanjem trećoj dobija se:

$$\begin{array}{rclcl} x + y + 2z & = & 0 & x + y + 2z & = & 0 \\ x + 2y + 3z & = & -6 & \Leftrightarrow & y + z & = & -6, \\ 3x + 2y + 5z & = & 6 & -y - z & = & 6 \end{array}$$

Dalje množenjem druge jednačine sa -1 i dodavanjem trećoj dobija se

$$\begin{array}{rcl} x + y + 2z & = & 0 \\ y + z & = & -6. \\ 0 & = & 0 \end{array}$$

Sistem je (jednostruko) neodređen.

Rešenje sistema je $R_s = \{(6 - \alpha, -6 - \alpha, \alpha), \alpha \in \mathbb{R}\}$.

3. Zamenom $a = 7$ u početni sistem i množenjem prve jednačine sa -1 i dodavanjem drugoj jednačini i množenjem prve jednačine sa -3 i dodavanjem trećoj dobija se:

$$\begin{array}{rclcl} x + y + 7z & = & 0 & x + y + 7z & = & 0 \\ x + 2y + 3z & = & -6 & \Leftrightarrow & y - 4z & = & -6. \\ 3x + 7y + 5z & = & 6 & 4y - 16z & = & 6 \end{array}$$

Dalje množenjem druge jednačine sa -4 i dodavanjem trećoj dobija se:

$$\begin{array}{rcl} x + y + 7z & = & 0 \\ y - 4z & = & -6. \\ 0 & = & 30 \end{array}$$

U ovom slučaju sistem kontradiktoran odnosno nerešiv.