Prezime:

lme: _____

br.ind.: _____

1. Ako je P(A) = 0.7, P(B) = 0.6 i P(AB) = 0.4, izračunati

$$P(A\bar{B}) =$$

$$, P(A \cup B) =$$

$$, P(A|B) =$$

2. Nezavisne slučajne promenljive X, Y, i Z imaju istu raspodelu $\mathcal{N}(0, 1)$.

Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $U = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{2}(Y^2 + Z^2)}}$?

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 0.05. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti $\alpha=0.01$?

DA			

Nekad DA, nekad NE

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je y = a + bx i neka su $\hat{y}_i = a + bx_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Koji znak stoji između $\sum\limits_{i=1}^n (\bar{y}_n-\hat{y}_i)^2$, i $\sum\limits_{i=1}^n (\bar{y}_n-y_i)^2$, gde je $\bar{y}=\sum_{i=1}^n y_i/n$?

<		
_		

$$\geq$$

Zavisi od
$$y_i$$

5. ECDF

Rekonstruisati uzorak $(x_1,...,x_5)$ čija je empirijska funkcija raspodele data levo:

Fn(x)

Izračunati korigovanu uzoračku varijansu uzorka $\bar{s}_n^{2\prime} =$

Statistika - test

Novi Sad. 6. X 2020.

Prezime:

lme: _____

br.ind.: _____

1. Od svih figura sa šahovske table na slučajan način je odabrano 4. Kolika je verovatnoća da je među izvučenim kartama dva piona?

P =

2. Nezavisne slučajne promenljive X i Y imaju normalnu raspodelu sa istom disperzijom, gde je $E(X) = m_1$, $E(Y) = m_2$, $D(X) = D(Y) = s^2$.

Koju raspodelu ima slučajna promenljiva $Z = ((X - m_1)^2 + (Y - m_2)^2)/s^2$?

3. Za uzorak obeležja sa normalnom raspodelom testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ odbačena je nulta hipoteza sa pragom značajnosti 1%. Da li se odbacuje nulta hipoteza testiranjem $H_0(m=m_0)$ protiv $H_1(m \neq m_0)$ sa pragom značajnosti 5%?

DA NE I

Nekad DA, nekad NE

4. Za realizovanu vrednost dvodimenzionalnog uzorka $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ prava linearne regresije y po x (najmanjih kvadrata) je y = a + bx i neka su $ss_x = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^2$, $ss_y = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}_n)^2$,

$$s_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n) (y_i - \bar{y}_n), \, \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i, \, \bar{y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i. \, \text{Formule za } r, b, a, \text{ preko } ss_x, ss_y, s_{xy}, \bar{x}_n, \, \bar{y}_n:$$

r =

b =

a =

5. Nacrtati Boxplot i Empirijsku funkciju raspodele (ECDF) uzorka (2,2,4,5,6).