


### Lagranžova teorema

Ako je funkcija  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  neprekidna nad zatvorenim intervalom  $[a, b]$  i ima izvod nad otvorenim intervalom  $(a, b)$ , tada postoji bar jedna tačka  $\xi \in (a, b)$  takva da je

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$



3. Pokazati da jednačina  $2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} = \frac{16\sqrt{2}-9}{2\pi}$  ima bar jedno rešenje u intervalu  $(\frac{3}{\pi}, \frac{4}{\pi})$ .

Funkcija  $F(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$  je neprekidna nad intervalom  $[\frac{3}{\pi}, \frac{4}{\pi}]$  i diferencijabilna nad intervalom  $(\frac{3}{\pi}, \frac{4}{\pi})$  ( $F'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} + x^2 (-\sin \frac{1}{x})(-\frac{1}{x^2}) = 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$ ) pa zadovoljava uslove Lagranžove teoreme, tj. postoji  $\xi \in (\frac{3}{\pi}, \frac{4}{\pi})$  takvo da  $F(\frac{4}{\pi}) - F(\frac{3}{\pi}) = F'(\xi)(\frac{4}{\pi} - \frac{3}{\pi})$ .

$$F(\frac{4}{\pi}) - F(\frac{3}{\pi}) = \frac{16}{\pi^2} \cos \frac{\pi}{4} - \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{16}{\pi^2} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{9}{\pi^2} \frac{1}{2} = \frac{16\sqrt{2}-9}{2\pi^2}$$

$$\frac{16\sqrt{2}-9}{2\pi^2} = F'(\xi) \cdot \frac{1}{\pi}$$

$$\frac{16\sqrt{2}-9}{2\pi^2} = \left[ 2\xi \cos \frac{1}{\xi} + \sin \frac{1}{\xi} \right] \cdot \frac{1}{\pi} \Rightarrow 2\xi \cos \frac{1}{\xi} + \sin \frac{1}{\xi} = \frac{16\sqrt{2}-9}{2\pi}$$

### Košijeva teorema

Ako su funkcije  $f(x)$  i  $g(x)$  neprekidne nad zatvorenim intervalom  $[a, b]$ , imaju izvode nad otvorenim intervalom  $(a, b)$  i za svako  $x \in (a, b)$  je  $g'(x) \neq 0$ , tada postoji bar jedna tačka  $\xi \in (a, b)$ , takva da je

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Lagranžova teorema je specijalan slučaj Košijeve teoreme.

Geometrijski značaj ove teoreme se sastoji u tome da pod datim uslovima postoji tangenta krive  $y = f(x)$  u nekoj tački koja pripada intervalu  $[a, b]$  i paralelna je sa sečicom koja prolazi kroz tačke  $A(a, f(a))$  i  $B(b, f(b))$ .

### Tejlorova teorema

Neka su funkcija  $f(x)$  i svi njeni izvodi do  $(n-1)$ -og reda neprekidni nad zatvorenim intervalom  $[A, B]$  i neka  $f(x)$  ima  $n$ -ti izvod nad otvorenim intervalom  $(A, B)$ . Neka je  $a \in [A, B]$  proizvoljna tačka. Tada za svako  $b \in [A, B]$ ,  $b \neq a$  postoji bar jedna tačka  $\xi \in (a, b)$ ,  $b > a$ , odnosno  $\xi \in (b, a)$ ,  $a > b$  takva da je

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + R_n$$

$$R_n = \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

Kada je funkcija  $f(x)$  predstavljena na način

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i + R_n(x)$$

kažemo da je razvijena po Tejlorovoj formuli u tački  $a$ .

$R_n$  – ostatak ili greška i predstavlja odstupanje funkcije  $f(x)$  od Tejlorovog polinoma

$$T_{n-1}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i$$

$$R_n(x) = f(x) - T_{n-1}(x)$$

Za  $n = 1$  dobijamo Lagranžovu teoremu.

### Maklorenova formula

Ako u Tejlorovoj formuli stavimo  $a = 0$  dobićemo Maklorenovu formulu.

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(0) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x), 0 < \theta < 1$$

Polinom  $M_{n-1}(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(0)$  se zove Maklorenov polinom, a  $R_n(x)$  ostatak ili greška aproksimacije funkcije  $f(x)$  Maklorenovim polinomom.

4. Aproksimirati funkciju  $f(x) = x^2 e^{-x}$  Tejlorovim polinomom trećeg stepena u tački  $x = 2$ .

$$T_{3,2}(x) = f(2) + \frac{f'(2)}{1} (x-2) + \frac{f''(2)}{2} (x-2)^2 + \frac{f'''(2)}{3!} (x-2)^3$$

$$f(x) = x^2 \cdot e^{-x} \Rightarrow f(2) = 4e^{-2}$$

$$f(x) = x^2 e^{-x}$$

$$f'(x) = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = e^{-x}(-x^2 + 2x) \Rightarrow f'(2) = 0$$

$$f''(x) = -e^{-x}(-x^2 + 2x) + e^{-x}(-2x + 2) = e^{-x}(x^2 - 4x + 2) \Rightarrow f''(2) = -2e^{-2}$$

$$f'''(x) = -e^{-x}(x^2 - 4x + 2) + e^{-x}(2x - 4) = e^{-x}(-x^2 + 6x - 6) \Rightarrow f'''(2) = 2e^{-2}$$

$$T_{3,2}(x) = \frac{4}{e^2} - \frac{2}{e^2}(x-2) + \frac{1}{3e^2}(x-2)^3 = \frac{1}{e^2} \left( 4 - (x-2)^2 + \frac{1}{3}(x-2)^3 \right)$$

5. Razviti funkciju  $f(x) = \arctg x + x^3 - 2x^2 + 1$  u Tejlorov polinom trećeg stepena u tački  $x = 1$  i u Maklorenov polinom trećeg stepena.

$x^3 - 2x^2 + 1$  je polinom trećeg stepena, pa razvijamo samo funkciju  $z(x) = \arctg x$ .

$$z(x) = \arctg x, \quad z(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}, \quad z(0) = \arctg 0 = 0$$

$$z'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad z'(1) = \frac{1}{2}, \quad z'(0) = 1$$

$$z''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \quad z''(1) = -\frac{1}{2}, \quad z''(0) = 0$$

$$z'''(x) = -2 \frac{(1+x^2)^2 - x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = -2 \frac{1+x^2-4x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{-2+6x^2}{(1+x^2)^3},$$

$$z'''(1) = \frac{1}{2}, \quad z'''(0) = -2$$

$$T_{3,1}(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) + \frac{-\frac{1}{2}}{2!}(x-1)^2 + \frac{\frac{1}{2}}{3!}(x-1)^3 + x^3 - 2x^2 + 1$$

$$T_{3,1}(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \frac{1}{12}(x-1)^3 + x^3 - 2x^2 + 1$$

$$M_3(x) = x - \frac{2}{6}x^3 + x^3 - 2x^2 + 1 = x - \frac{1}{3}x^3 + x^3 - 2x^2 + 1 = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + x + 1$$

6. (domaći)

a) Aproksimirati funkciju  $f(x) = 1 + x + \sqrt{x^4 - x^5}$  Maklorenovim polinomom četvrtog stepena.

b) Naći približnu vrednost broja  $\sqrt{\frac{2}{243}}$  koristeći rezultat pod a).



$$* a) f(x) = \frac{1 - \ln x^2}{1 + \ln x^2}$$

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot 2x(1 + \ln x^2) - (1 - \ln x^2) \cdot \frac{2x}{x^2}}{(1 + \ln x^2)^2} = \frac{-4}{x(1 + \ln x^2)^2}$$

$$b) \frac{1}{3(e-1)} = \frac{1}{x(1 + \ln x^2)^2} \quad \text{ИМА РЕШЕНИЕ НА } (1, e)$$

•  $f(x)$  НЕПРЕКЛЮЧА НАД  $[1, e]$

•  $f(x)$  ИМА ИЗБОР НАД  $(1, e)$

$$\text{Н.Т.} \Rightarrow \exists \xi \in (1, e)$$

$$\frac{f(e) - f(1)}{e - 1} = f'(\xi)$$

$$\frac{-\frac{1}{3} - 1 \cdot \frac{3}{3}}{e - 1} = \frac{-4}{\xi(1 + \ln \xi^2)^2}$$

$$\frac{-4}{3(e-1)} = \frac{-4}{\xi(1 + \ln \xi^2)^2} \Rightarrow \frac{1}{3(e-1)} = \frac{1}{\xi(1 + \ln \xi^2)^2}$$