

2. Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije  $y = \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 - 1}$ .

1) Domen

$$\left. \begin{array}{l} x^2 - 1 \neq 0 \\ x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1 \end{array} \right\} \Rightarrow D: x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$$

2) Nule funkcije

$$y = \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 - 1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

3) Parnost funkcije

$f(-x) = -f(x) \Rightarrow$  funkcija je neparna. Kako je funkcija neparna (simetrična u odnosu na koordinatni početak), dovoljno je posmatrati funkciju samo za  $x \geq 0$ .

4) Asimptote

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 - 1} = \operatorname{arctg} \infty = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 - 1} = \operatorname{arctg}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{2x}{x^2 - 1} = \operatorname{arctg} 0 = 0 \Rightarrow \text{prava } y = 0 \text{ je horizontalna asimptota funkcije}$$

Funkcija nema kosu asimptotu.

5) Monotonost i ekstremne vrednosti

$$y' = \frac{1}{1 + \left(\frac{2x}{x^2 - 1}\right)^2} \cdot \frac{2(x^2 - 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{1}{(x^2 - 1)^2 + 4x^2} \cdot \frac{2x^2 - 2 - 4x^2}{(x^2 - 1)^2}$$

$$= \frac{-2 - 2x^2}{x^4 - 2x^2 + 1 + 4x^2} = \frac{-2(1 + x^2)}{(1 + x^2)^2} = \frac{-2}{1 + x^2} < 0$$

$y' < 0$  za svako  $x \in D$ , funkcija opada

Funkcija nema ekstremnih vrednosti.

6) Tangente funkcije

$$\operatorname{tg} \alpha = \lim_{x \rightarrow \pm 1} y' = \lim_{x \rightarrow \pm 1} \frac{-2}{1 + x^2} = -1 \quad (y = -x)$$

$$\operatorname{tg} \beta = y'(0) = -2 \quad (y = -2x)$$

$$\operatorname{tg} \beta = \lim_{x \rightarrow 0^+} y' = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2}{1 + x^2} = -2$$


7) Konveksnost, konkavnost i prevojne tačke

$$y'' = \frac{2 \cdot 2x}{(1 + x^2)^2} = \frac{4x}{(1 + x^2)^2}$$

$y'' > 0$  za  $x \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ , funkcija je konveksna

Tačka  $(0, 0)$  je prevojna tačka funkcije.

## 8) Grafik funkcije



3. Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije  $f(x) = \ln \left| \frac{\ln |x| + 1}{\ln |x| - 1} \right|$ .

1) Domen

$$\ln |x| - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \ln |x| \neq 1$$

$$|x| \neq e \Leftrightarrow x \neq \pm e$$

$$\ln |x| + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \ln |x| \neq -1$$

$$|x| \neq e^{-1} \Leftrightarrow x \neq \pm e^{-1}$$

$$x \neq 0$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -e, -\frac{1}{e}, 0, e, \frac{1}{e} \right\}$$

2) Parnost funkcije

$f(-x) = f(x) \Rightarrow$  funkcija je parna. Kako je funkcija parna (simetrična u odnosu na  $y$ -osu) dovoljno je posmatrati funkciju samo za  $x \geq 0$ .

3) Nule funkcije

$$f(x) = \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| = 0 \Leftrightarrow \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| = 1$$

a)  $\frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = 1$

$$\ln x + 1 = \ln x - 1 \Leftrightarrow 1 = -1$$

b)  $\frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = -1$

$$\ln x + 1 = -\ln x + 1 \Leftrightarrow 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\mathbb{N}(1, 0)$$

4) Asimptote

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| = \ln \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| = \ln 1 = 0 \quad \text{! tgd}$$

$\star \ln \left| \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| \stackrel{\substack{\text{"n,n."} \\ \text{"n,n."}}}{=} \ln \left| \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \right| = \ln |1| = \ln 1 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}^{\pm}} \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| \stackrel{\text{"ln 0"}^{\pm}}{=} -\infty \Rightarrow \text{prava } x = \frac{1}{e} \text{ je vertikalna asimptota funkcije}$$


$$\lim_{x \rightarrow e^{\pm}} \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| \stackrel{\text{"ln 2"}^{\pm}}{=} \infty \Rightarrow \text{prava } x = e \text{ je vertikalna asimptota funkcije}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right| \stackrel{\star}{=} 0 \Rightarrow \text{prava } y = 0 \text{ je horizontalna asimptota funkcije}$$

Funkcija nema kosu asimptotu.

Za nalaženje izvoda, potrebno je da se oslobodimo apsolutne zagrade...

$$f(x) = \ln \left| \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right|$$




$$f(x) = \begin{cases} \ln \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}, & x \in (0, \frac{1}{e}) \cup (e, \infty) \\ \ln \frac{\ln x + 1}{1 - \ln x}, & x \in (\frac{1}{e}, e) \end{cases}$$

5) Monotonost i ekstremne vrednosti

za  $x \in (0, \frac{1}{e}) \cup (e, \infty)$

$$f'(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1} \cdot \frac{1}{x} \frac{(\ln x - 1) - (\ln x + 1) \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} = \frac{-2}{x(\ln^2 x - 1)} = \frac{2}{x(1 - \ln^2 x)}$$

$\downarrow$   
 $\circ$



$f'(x) < 0$  za  $x \in (0, \frac{1}{e}) \cup (e, \infty)$  funkcija opada

Funkcija nema ekstremnih vrednosti.

za  $x \in (\frac{1}{e}, e)$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{\ln x + 1} \cdot \frac{\frac{1}{x} \cdot (1 - \ln x) + (\ln x + 1) \cdot \frac{1}{x}}{(1 - \ln x)^2} = \frac{2}{x(1 - \ln^2 x)}$$

$f'(x) > 0$  za  $x \in (\frac{1}{e}, e)$  funkcija raste

Funkcija nema ekstremnih vrednosti.

6) Tangente funkcije


$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x(1 - \ln^2 x)} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{1 - \ln^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-2}}{-2 \ln x \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{-1}}{\ln x} = -\infty \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^{-2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x} = -\infty \Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

7) Konveksnost, konkavnost i prevojne tačke

$$f''(x) = \frac{-2 \left[ 1 - \ln^2 x + x(-2 \ln x) \cdot \frac{1}{x} \right]}{x^2 (1 - \ln^2 x)^2} = \frac{2(\ln^2 x + 2 \ln x - 1)}{x^2 (1 - \ln^2 x)^2}$$



$$\ln^2 x + 2 \ln x - 1 = 0, \ln x = t, t^2 + 2t - 1 = 0 \Leftrightarrow t_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}, \quad x_1 = e^{-1-\sqrt{2}}, \quad x_2 = e^{-1+\sqrt{2}}$$



$$0 < x_1 < \frac{1}{e} = e^{-1} < 1 = e^0 < x_2 < e = e^1$$

$f''(x) > 0$  za  $x \in (0, x_1) \cup (x_2, e) \cup (e, \infty)$  funkcija je konveksna

$f''(x) < 0$  za  $x \in (x_1, \frac{1}{e}) \cup (\frac{1}{e}, x_2)$  funkcija je konkavna

Tačke  $(x_1, f(x_1))$  i  $(x_2, f(x_2))$  su prevojne tačke funkcije ( $f(x_1) \approx -0,88$ ,  $f(x_2) \approx 0,87$ ).

8) Grafik funkcije

