

15. Lineare Abbildungen

Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

18.11.2025



$$2) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$$

$$[A | I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{II - I} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$\text{Rang}(A) = 1 \neq 2 = \text{Anzahl Spalten}$
 $\Rightarrow A$ nicht invertierbar

$$3) [A | I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -6 & 12 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{I+2II} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\rightarrow \dots \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$

Beobachtung: $A \in \mathbb{K}^{m,n}$ beschreibt eine Abbildung:

$$f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad f(x) = Ax$$

Eigenschaften: Seien $x, y \in \mathbb{K}^n$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Dann gilt:

$$(1) \quad f(x+y) = A(x+y) = Ax + Ay = f(x) + f(y)$$


$$(2) \quad f(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda f(x)$$

Matrixmultiplikation $\hat{=}$ Komposition:

Sei $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, $f(x) = A \cdot x$ und $g : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^p$, $g(x) = B \cdot x$

Dann $g \circ f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^p$, $x \mapsto (B \cdot A)x$, denn

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(Ax) = B \cdot Ax = (B \cdot A)x$$



15.1 Definition und erste Eigenschaften

Definition: Seien V, W zwei \mathbb{K} -Vektorräume. Eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ heißt **linear**, wenn für alle $v, w \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$(1) \quad f(v + w) = f(v) + f(w),$$

$$(2) \quad f(\lambda v) = \lambda f(v).$$

Die Menge aller linearen Abbildungen von V nach W wird mit $L(V, W)$ bezeichnet.

Bemerkung: Sei $f : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt:


$$1) \quad f(\overset{\text{Vektor}}{0}) = f(\overset{\text{Skalar}}{0} \cdot v) \stackrel{(2)}{=} 0 \cdot f(v) = 0$$

$$2) \quad \text{Sei } v = \sum_{j=1}^n \lambda_j v_j. \text{ Dann } f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j v_j\right) \stackrel{(1)}{=} \sum_{j=1}^n f(\lambda_j v_j) = \sum_{j=1}^n \lambda_j f(v_j)$$

Beispiele:

1) $A \in \mathbb{K}^{m,n}$ beschreibt $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, $x \mapsto Ax$ eine lineare Abbildung

2) Spiegelung an der Winkelhalbierenden



$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$ ist linear, denn

Seien $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R}$, dann gilt

$$1) f(v+w) = f\left(\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}\right) = f\left(\begin{bmatrix} v_1+w_1 \\ v_2+w_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} v_2+w_2 \\ v_1+w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_2 \\ w_1 \end{bmatrix} = f(v) + f(w)$$

$$2) f(\lambda v) = f\left(\lambda \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}\right) = f\left(\begin{bmatrix} \lambda v_1 \\ \lambda v_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \lambda v_2 \\ \lambda v_1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} = \lambda f(v)$$

2) $f: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^{2 \times 2}$ mit $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1+x_2 & 2x_1 \\ 0 & x_2 \end{bmatrix}$,
ist linear, denn $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2$

z.B. $f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 2 & 2 \cdot 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$$1) f(v+w) = f\left(\begin{bmatrix} v_1+w_1 \\ v_2+w_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2(v_1+w_1) + (v_2+w_2) & 2(v_1+w_1) \\ 0 & v_2+w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1+v_2 & 2v_1 \\ 0 & v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2w_1+w_2 & 2w_1 \\ 0 & w_2 \end{bmatrix}$$

$$= f(v) + f(w)$$

$$2) f(\lambda v) = \lambda f(v) \text{ analog.}$$

$$3) f: \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}, \quad f(p) = p', \quad \text{z.B. } f(3x^2 + 4x) = 6x + 4$$

ist linear, denn

$$\cdot f(p+q) = (p+q)' = p' + q' = f(p) + f(q)$$

$$\cdot f(\lambda p) = (\lambda p)' = \lambda p' = \lambda f(p)$$

$$4) f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f(x) = x^2 \text{ ist nicht linear, denn für } x=2, \lambda=2$$

$$\left. \begin{aligned} \cdot f(\lambda x) &= f(2 \cdot 2) = f(4) = 4^2 = 16 \\ \cdot \lambda f(x) &= 2 f(2) = 2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 4 = 8 \end{aligned} \right\} f(\lambda x) \neq \lambda f(x)$$

$A = [a_{ij}] \in \mathbb{K}^{m,n}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^n$. Dann gilt:

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{12}x_2 \\ \vdots \\ a_{m2}x_2 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{mn}x_n \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$= x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n \quad \text{wobei } A = [a_1 \dots a_n] \text{ also } a_i \text{ i-te Spalte}$$

Satz: Ist $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ linear, dann gibt es eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m,n}$ mit $f(x) = Ax$ für alle $x \in \mathbb{K}^n$. Dabei enthält $A = [a_1, \dots, a_n]$ die Bilder der Vektoren:

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

d.h. $a_1 = f(e_1), \dots, a_n = f(e_n)$.

Beweis: Sei $a_i = f(e_i)$ und $A = [a_1 \dots a_n]$. Dann gilt für $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

$$f(x) = f(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) \stackrel{\text{Linearität}}{=} \sum_{i=1}^n f(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i a_i = Ax$$

1) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$

$\cdot f(e_1) = f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
 $\cdot f(e_2) = f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

also $f(x) = Ax$ mit $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Probe $Ax = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}$

2) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_3 \\ 2x_2 + x_3 \end{bmatrix}$ ist linear (nachrechnen!)

$\cdot f(e_1) = f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
 $\cdot f(e_2) = f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$
 $\cdot f(e_3) = f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

$f(x) = Ax$ mit $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Definition: Seien V, W zwei \mathbb{K} -Vektorräume. Für $f, g \in L(V, W)$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ definieren wir

$$f + g : V \rightarrow W, \quad v \mapsto (f + g)(v) := f(v) + g(v),$$

$$\lambda f : V \rightarrow W, \quad v \mapsto (\lambda f)(v) := \lambda f(v).$$

Satz: Seien V, W, X \mathbb{K} -Vektorräume.

(1) Ist $f : V \rightarrow W$ linear, so gilt $f(0) = 0$.

(2) Seien $f, g : V \rightarrow W$ linear und $\lambda \in \mathbb{K}$, dann sind $f + g$ und λf linear.

(3) $L(V, W)$ ist ein \mathbb{K} -Vektorraum.

(4) Sind $f : V \rightarrow W$ und $g : W \rightarrow X$ linear, so ist auch die Komposition

$$g \circ f : V \rightarrow X \quad \text{linear.}$$

(5) Ist $f : V \rightarrow W$ linear und bijektiv, so ist auch die Umkehrabbildung

$$f^{-1} : W \rightarrow V \quad \text{linear.}$$

Für lineare Abbildungen f, g, h und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt (falls die Verknüpfungen definiert sind)

$$(1) \quad f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h,$$

$$(2) \quad f \circ (g + h) = (f \circ g) + (f \circ h),$$

$$(3) \quad (f + g) \circ h = (f \circ h) + (g \circ h),$$

$$(4) \quad \alpha(f \circ g) = (\alpha f) \circ g = f \circ (\alpha g),$$

$$(5) \quad \text{id} \circ f = f = f \circ \text{id}.$$


Definition: Sei $f : V \rightarrow W$ linear.

(1) Der **Kern** von f ist das Urbild von 0:

$$\text{Kern}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\} = f^{-1}(\{0\}).$$

(2) Das **Bild** von f ist die Menge

$$\text{Bild}(f) = f(V) = \{f(v) \mid v \in V\}.$$



Spezialfall:

Satz: Sei $f : V \rightarrow W$ linear.

- (1) $\text{Kern}(f)$ ist ein Teilraum von V .
- (2) $\text{Bild}(f)$ ist ein Teilraum von W .

Beispiele:

Spezialfall: $A \in \mathbb{K}^{m,n}$, $f(x) = Ax$.

Erinnerung: $\text{Kern}(A) = \{x \in \mathbb{K}^n \mid Ax = 0\} = \mathbb{L}(A, 0)$

Bemerkung: $\dim(\text{Kern}(A)) = n - \text{Rang}(A)$

Bemerkung: Sei $A \in \mathbb{K}^{m,n}$ mit $A = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{bmatrix}$. Für $x \in \mathbb{K}^n$ ist

$$Ax = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = \sum_{j=1}^n x_j a_j,$$

also die Linearkombination der Spalten von A mit den Koeffizienten x_1, \dots, x_n . Daher ist

$$\text{Bild}(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{K}^n\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_n\}.$$

Berechnung des Bildes von A :

- (1) Bringe A in Zeilenstufenform.
- (2) Spaltenvektoren von A , die zu Pivotelementen in ZSF von A gehören, bilden Basis des Bildes.

Bemerkung: $\dim(\text{Bild}(A)) = \text{Rang}(A)$

Beispiel: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$


15.3 Dimensionsformel

Satz: Für $A \in \mathbb{K}^{m,n}$ erhalten wir

$$\dim(\text{Kern}(A)) + \dim(\text{Bild}(A)) = n - \text{Rang}(A) + \text{Rang}(A) = n = \dim(\mathbb{K}^n).$$

Satz: Sei $f : V \rightarrow W$ linear und V endlichdimensional. Dann gilt

$$\dim(V) = \dim(\text{Kern}(f)) + \dim(\text{Bild}(f)).$$



Satz: Sei $f : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt:

(1) f ist injektiv $\Leftrightarrow \text{Kern}(f) = \{0\} \Leftrightarrow \dim(\text{Kern}(f)) = 0$.

(2) f ist surjektiv $\Leftrightarrow \text{Bild}(f) = W \Leftrightarrow \dim(\text{Bild}(f)) = \dim(W)$.

Dabei gilt die letzte Äquivalenz nur falls $\dim(W) < \infty$.

(3) Wenn $\dim(V) = \dim(W) < \infty$, so gilt:

f ist bijektiv $\Leftrightarrow f$ ist injektiv $\Leftrightarrow f$ ist surjektiv.