

Análisis Matemático para Inteligencia Artificial

Martín Errázquin (merrazquin@fi.uba.ar)

Especialización en Inteligencia Artificial

Derivadas de funciones multivariadas

Repaso: derivando escalares


$$\left. \begin{matrix} (x_1, y_1) \\ (x_2, y_2) \end{matrix} \right\} \text{ con } x_1 \neq x_2$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$x_2 = x_1 + h$$

con $h \neq 0$

$$\Delta x = x_1 + h - x_1 = h$$



Recordemos siempre que la derivada busca calcular $\Delta y / \Delta x$ para una función dada $y = f(x)$ en un punto x .


$$\begin{aligned} y_2 &= f(x_2) \\ &= f(x_1 + h) \end{aligned}$$

$$y_1 = f(x_1) = f(x)$$

$$f'(x) \doteq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Derivadas de orden 1: campos escalares

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n)^T \mapsto f((x_1, \dots, x_n)^T)$, se definen las **derivadas parciales** como:



$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

\vdots

$$\frac{\partial f}{\partial x_n} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n + h) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

Se define el **gradiente** como: $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$.



Importante: El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento.

$$f(x, y) = x^2 \cos(y)$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 \cos(y) - x^2 \cos(y)}{h} = \dots = 2x \cos(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cos(y)$$

$$\nabla f(x, y) = (2x \cos(y), x^2 \cos(y))$$

Derivadas de orden 1: campos vectoriales

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$(x_1, \dots, x_n)^T \mapsto (f_1((x_1, \dots, x_n)^T), \dots, f_m((x_1, \dots, x_n)^T))$, se define el

jacobiano como:



m.n deriv.
parciales

$$J_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

$$J_{f(i,j)} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$


$$= \begin{pmatrix} -\nabla_{f_1} - \\ \vdots \\ -\nabla_{f_m} - \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

ej: $\vec{f}(x,y) = (xy, z^2y, \cos(x))$

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} y & x \\ 2xy & z^2 \\ -\sin(x) & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \nabla_{f_1}(x,y)$$

Derivadas de orden 2: Matriz Hessiana

La **matriz Hessiana** es aquella cuyas derivadas de orden 2 de f respecto a $x \in \mathbb{R}^n$ se ubican:



$$H_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$H_{f(i,j)} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$(neg) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

$\Rightarrow H_f$ simétrico

$$f(x, y) = x^2 \cos(y)$$

$$\nabla f(x, y) = (2x \cos(y), -x^2 \sin(y))$$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 \cos(y) & -2x \sin(y) \\ -2x \sin(y) & -x^2 \cos(y) \end{pmatrix}$$

Polinomio de Taylor

Una aplicación común del Hessiano es el polinomio de Taylor de orden 2 para campos escalares. Sea f un campo escalar $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, asumiendo que posee derivadas parciales de todo orden en un entorno de un punto $a \in \mathbb{R}^n$, se define el **polinomio de Taylor** de orden 2:

$$P_2(x) = \overbrace{f(a)}^{\text{const.}} + \overbrace{\nabla f(a)^T (x-a)}^{c^T \cdot x} + \frac{1}{2} \overbrace{(x-a)^T H_f(a) (x-a)}^{x^T A x}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad P_2(x) = \underbrace{f(a)}_{\text{const. (0)}} + \underbrace{f'(a) \cdot (x-a)}_{\text{lineal (1)}} + \underbrace{\frac{1}{2} f''(a) (x-a)^2}_{\text{cuad. (2)}}$$

Ejemplo

Sea $f(x_1, x_2) = \cos(x_1) + x_1x_2 + 3x_1^2$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla f(x_1, x_2) = (-\sin(x_1) + x_2 + 6x_1, x_1)$$

$$\nabla f\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = \left(\frac{3}{2}\pi - 1, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\nabla(x, a) = \left(x, -\frac{\pi}{2}, x_2\right)$$

$$p_2(x) = \frac{3}{4}\pi^2 + \left(\frac{3}{2}\pi - 1, \frac{\pi}{2}\right) \cdot \left(x, -\frac{\pi}{2}, x_2\right) + \left(x, -\frac{\pi}{2}, x_2\right) \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - \frac{\pi}{2} \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$a = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

$$f(a) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} + 3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}\pi^2$$

$$H_f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -\cos(x_1) + 6 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H_f\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$