

Gabarito da AP3 - Fundamentos de Algoritmos para Computação

1. Queremos provar que: $(\overline{A \cap B} \cup (\overline{A \cap C})) = \overline{A \cap B \cap C}$.

De fato,

$$\begin{aligned}
 & (\overline{A \cap B} \cup (\overline{A \cap C})) &= \\
 \text{(lei de Morgan)} & &= (\overline{A} \cup \overline{B}) \cup (\overline{A} \cup \overline{C}) &= \\
 \text{(propriedade comutativa)} & &= (\overline{B} \cup \overline{A}) \cup (\overline{A} \cup \overline{C}) &= \\
 \text{(propriedade associativa)} & &= [(\overline{B} \cup \overline{A}) \cup \overline{A}] \cup \overline{C} &= \\
 \text{(propriedade associativa)} & &= [\overline{B} \cup (\overline{A} \cup \overline{A})] \cup \overline{C} &= \\
 (\overline{A} \cup \overline{A} = \overline{A}) & &= (\overline{B} \cup \overline{A}) \cup \overline{C} &= \\
 \text{(propriedade comutativa)} & &= (\overline{A} \cup \overline{B}) \cup \overline{C} &= \\
 \text{(lei de Morgan)} & &= (\overline{A \cap B}) \cup \overline{C} &= \\
 \text{(lei de Morgan)} & &= \overline{A \cap B \cap C} &=
 \end{aligned}$$

2. Por indução:

Base da indução:

Para $n = 1$, $\frac{1}{1 \times (1+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ é verdadeira.

Hipótese indução:

Suponha verdadeiro para $n = k$, isto é:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{k \times (k+1)} = \frac{k}{k+1}$$

Vamos mostrar que se é verdadeiro para k então é verdadeiro para $k + 1$.

Desenvolvendo para $n = k + 1$ e usando a hipótese de indução, temos que:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{k \times (k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} &= \\
 &= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \\
 &= \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)} = \\
 &= \frac{k(k+1+1)+1}{(k+1)(k+2)} = \\
 &= \frac{k(k+1)+k+1}{(k+1)(k+2)} = \\
 &= \frac{(k+1)(k+2)}{(k+1)(k+2)} = \\
 &= \frac{(k+1)}{(k+2)}
 \end{aligned}$$

Logo, a expressão é verdadeira, $\forall n \in \mathbb{N}$

3. Raciocínio 1 (princípio multiplicativo)

A primeira letra do anagrama pode ser escolhido de 23 modos; a segunda, de 22 modos; e a terceira, de 21 modos. A resposta é: $23 \times 22 \times 21 = 10626$.

Raciocínio 2 (arranjos simples)

O número de anagramas de 3 letras diferentes que podemos formar com 23 letras corresponde a arranjos simples de 32 tomados 3 a 3, $A(23, 3) = \frac{23!}{(23-3)!} = 23 \times 22 \times 21$.

4. Raciocínio 1

As soluções inteiras não-negativas de $x + y + z + w \leq 27$ dividem-se em vários grupos: soluções onde $x + y + z + w = 27$, onde $x + y + z + w = 26$, onde $x + y + z + w = 25$, ..., onde $x + y + z + w = 1$, onde $x + y + z + w = 0$. A resposta é:

$$\begin{aligned} CR_4^{27} + CR_4^{26} + \dots CR_4^1 + CR_4^0 &= \\ C_{30}^{27} + C_{29}^{26} + \dots C_4^1 + C_3^0 &= \\ 4060 + 3654 + \dots + 4 + 1 &= \\ 31465 \end{aligned}$$

Raciocínio 2

Em cada solução inteira não-negativa de $x + y + z + w \leq 27$ defina-se a folga da solução por:

$$f = 27 - (x + y + z + w)$$

É claro que existe uma correspondência biunívoca entre as soluções inteiras não-negativas de $x + y + z + w \leq 27$ e as soluções inteiras não-negativas de $x + y + z + w + f = 27$.

Logo, o número de soluções inteiras não-negativas da inequação $x + y + z + w \leq 27$ é igual ao número de soluções inteiras não-negativas de $x + y + z + w + f = 27$ que é $CR_5^{27} = C_{31}^{27} = 31465$.

5. O número total de subconjuntos de um conjunto A de n elementos corresponde a $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$. Logo, usando o teorema das linhas temos que o número total de subconjuntos é $2^n = 256 = 2^8$. Portanto, a resposta é $n = 8$.

6. (a) Verdadeira

Justificativa: Sabemos que um grafo é bipartido se e somente se ele não possui ciclo ímpar. Uma árvore é um grafo conexo e acíclico, logo não tem ciclos ímpares. Portanto, é um grafo bipartido.

(b) Falso

Justificativa: Seja $G = K_2$ (grafo completo com 2 vértices). G é 1-regular, mas não existe um ciclo que passe por todos os vértices, já que G é acíclico.

(c) Falso

Justificativa: Seja $G = K_{3,3}$ (grafo bipartido completo), $E(G) = m = 9$ e $V(G) = n = 6$.

Temos que $9 \leq 3 \times 6 - 6 = 12$, mas G não é planar

(d) Verdadeiro

Justificativa: Seja D um digrafo fortemente conexo então $\forall u, v \in V(D)$ existe caminho de u para v e de v para u .

Se D possui fonte, então seja v uma fonte de D , isto é, $d^-(v) = 0$. Mas, se $d^-(v) = 0$ então não existe nenhum caminho de w para v , $\forall w \in V(D \setminus \{v\})$. Contradição, pois D é fortemente conexo.

Se D possui sumidouro, então seja w um sumidouro de D , isto é, $d^+(w) = 0$. Mas, se $d^+(w) = 0$ então não existe nenhum caminho de w para x , $\forall x \in V(D \setminus \{w\})$. Contradição, pois D é fortemente conexo.