

## Gabarito da AP1 - Fundamentos de Algoritmos para Computação

1. (2.0) Verifique se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira. Se for falsa, justifique e faça a devida modificação de modo a torná-la verdadeira. Caso seja verdadeira, justifique.

(a)  $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset, 2, -3, 5\}$

*Resposta:*

A afirmativa é verdadeira porque  $\emptyset$  é o único elemento do conjunto  $\{\emptyset\}$  e é um elemento do conjunto  $A = \{\emptyset, 2, -3, 5\}$ , usamos o símbolo *está contido* ( $\subseteq$ ) para estudarmos a relação entre conjuntos.

(b)  $(A \cup B) \cap C = (A \cap B) \cup C$

*Resposta:* A afirmativa é falsa, pois por exemplo, se considerarmos os conjuntos  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6\}$  e  $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ , temos  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5\}$ ,  $A \cap B = \{3, 4\}$  e  $(A \cap B) \cup C = \{1, 3, 4, 5, 7, 9\}$ , concluímos que  $(A \cup B) \cap C \neq (A \cap B) \cup C$ .

*As afirmações corretas são:*

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

OU

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

(c) Se  $n(A \cup B) = 15$ ,  $n(A) = 9$ ,  $n(A \cap B) = 2$  então  $n(B) = 6$ .

*Resposta:* A afirmação é falsa, pois pelo princípio de inclusão e exclusão,  $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ , implicando em  $n(B) = 8$ , para  $n(A \cup B) = 15$ ,  $n(A) = 9$ ,  $n(A \cap B) = 2$ .

Portanto, a afirmação correta é:

Se  $n(A \cup B) = 15$ ,  $n(A) = 9$ ,  $n(A \cap B) = 2$  então  $n(B) = 8$ .

2. (2.0) Mostre usando Indução Matemática:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^n} \text{ para todo } n \text{ inteiro natural.}$$

*Prova:*

Seja  $P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^n}$

Base da indução:

Para  $n = 1$ ,  $\frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2^1}$ , logo  $P(1)$  é verdadeiro.

Hipótese de Indução:

Suponha verdadeiro para  $n = k$ , isto é,  $P(k)$  é verdadeiro:

$$P(k) : \sum_{i=1}^k \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

Vamos mostrar que se  $P(k)$  é verdadeiro então  $P(k+1)$  é verdadeiro, isto é:

Temos que provar que:  $P(k+1) : \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{2^i} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}$  é verdadeiro.

Desenvolvendo para  $n = k+1$  e usando a hipótese de indução, temos que:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{2^i} &= \\ = & \underbrace{\left( \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^k} \right)}_{(Por \text{ hipótese indutiva})} + \frac{1}{2^{k+1}} &= \\ = & 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= \\ = & 1 + \frac{(-2+1)}{2^{k+1}} &= \\ = & 1 + \frac{-1}{2^{k+1}} &= \\ = & 1 - \frac{1}{2^{k+1}} &= \end{aligned}$$

Logo, pelo princípio da indução, a igualdade é verdadeira,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

3. (1.5) Quantos números com cinco algarismos podemos construir com os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, desde que estejam sempre juntos os algarismos 5 e 9?

*Resposta:* O número de maneiras de ordenar 5 algarismos de modo que 2 números, 5 e 9, fiquem juntas é  $2 \cdot P_4$ , pois para formar um número com 5 algarismos, devemos inicialmente decidir em que ordem se colocarão 5 e 9 (59 ou 95), e, em seguida, formar o número com 4 algarismos. Portanto a resposta é  $2 \cdot 4! = 2 \cdot 24 = 48$ .

4. (1.5) Uma embarcação deve ser tripulada por 8 homens, 2 dos quais só remam do lado direito e 1 apenas do lado esquerdo. De quantos modos podemos formar uma tripulação, se de cada lado devemos ter 4 tripulantes?

*Resposta:* Como temos que 2 homens só remam do lado direito então faltam 2 lugares para a ocupação dos 4 tripulantes do lado direito, o mesmo ocorre com o lado

esquerdo, sendo que faltam 3 tripulantes. Daí, ficam faltando 5 tripulantes, logo para o lado esquerdo devemos escolher 3 tripulantes dos 5 restantes, o que pode ser feito de  $C_5^3$ . Agora, com a escolha desses 3 tripulantes, automaticamente definimos os 2 restantes para o lado direito. Portanto, temos  $C_5^3 = 10$ .

5. (1.5) Considerando o sistema decimal de numeração, quantos números naturais com 4 algarismos (repetidos ou não) existem?

*Resposta:* Pelo sistema decimal de numeração podemos usar os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, logo o primeiro algarismo pode ser escolhido de 9 modos (o dígito zero não entra, pois não formaria um número de 4 dígitos). Observemos que para os algarismos restantes temos de escolher 3 números ordenados dentre 10, que podem ser repetidos o que corresponde a arranjos com repetição,  $AR_{10}^3 = 10^3$ . Daí, pelo princípio multiplicativo, temos que a resposta é  $9 \cdot 10^3 = 9000$ .

6. (1.5) Quantas são as soluções inteiras, não negativas da inequação  $x + y + z \leq 10$ , tal que  $y > 1$ ? Justifique.

*Resposta:* Como  $y > 1$ , isto é,  $y \geq 2$ , então temos de encontrar quantas são as soluções inteiras não-negativas da inequação  $x + y + z \leq 10$  com a restrição:  $y \geq 2$ .

Definindo por  $y' = y - 2$ , e substituindo  $y$  por  $y' + 2$ , a equação  $x + y + z \leq 10$  resulta equivalentemente a:  $x + y' + 2 + z \leq 10$ , com  $x, y', z \geq 0$ , ou seja,  $x + y' + z \leq 8$ , com  $x, y', z \geq 0$ .

Em cada solução inteira não-negativa de  $x + y' + z \leq 8$  defina-se a folga da solução por:

$$f = 8 - (x + y' + z)$$

É claro que existe uma correspondência biunívoca entre as soluções inteiras não-negativas de  $x + y' + z \leq 8$  e as soluções inteiras não-negativas de  $x + y' + z + f = 8$ .

Logo, o número de soluções inteiras não-negativas da inequação  $x + y' + z \leq 8$  é igual ao número de soluções inteiras não-negativas de  $x + y' + z + f = 8$  que é  $CR_4^8 = C_{11}^8 = 165$ .