



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação
AD2 - 2º semestre de 2013 - Gabarito

Questões

1. (1,0 ponto) _____

Mostre que a função $f(x) = |x|$ não é diferenciável em $x = 0$.

Solução:

Sejam as derivadas laterais de $f(x)$ em 0, isto é

$$f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{e} \quad f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

como

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$$

Finalmente, como as derivadas laterais são diferentes a derivada no ponto $x = 0$ não existe. Logo, $f(x) = |x|$ não é diferenciável em $x = 0$.

2. (1,0 ponto) —————

Mostre que a função $f(x) = 4x^3 + x - 3$ tem somente uma raiz real.

Solução:

É fácil ver que $f(0) = -3$ e $f(1) = 2$. Houve troca de sinal da função entre $x = 0$ e $x = 1$, sendo os polinômios contínuos em toda a reta real, existe pelo menos uma raiz da função no intervalo $(0, 1)$. Mas a primeira derivada da função vale $f'(x) = 12x^2 + 1$ e é sempre positiva, o que indica que a função $f(x)$ é sempre crescente em toda a reta real. Portanto só existe um ponto aonde $f(x)$ se anula e assim $f(x)$ tem uma única raiz.

3. (1,0 ponto) —————

Seja $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$. Ache

- (a) Os pontos críticos de f ;
- (b) os pontos extremos de f ;
- (c) os intervalos aonde f é crescente e decrescente.

Solução:

São candidatos a pontos críticos aqueles pontos aonde a primeira derivada se anula ou aqueles aonde a primeira derivada se anula:

$$f'(x) = 0 \implies 4x^3 + 6x^2 - 6x - 4 = 0$$

claramente $x = 1$ anula f' , e as demais raízes são $x = -2$ e $x = -1/2$. Como a derivada está definida em toda a reta real, estes são os únicos pontos críticos da função $f(x)$.

Verificando o sinal da primeira derivada na reta real

Para $x < -2 \implies f'(x) < 0$ logo $f(x)$ é decrescente

Para $-2 < x < -\frac{1}{2} \implies f'(x) > 0$ logo $f(x)$ é crescente

Para $-\frac{1}{2} < x < 1 \implies f'(x) < 0$ logo $f(x)$ é decrescente

Para $1 < x \implies f'(x) > 0$ logo $f(x)$ é crescente

assim são pontos de mínimo locais $x = -2$ e $x = 1$ e é ponto de máximo local $x = -1/2$.

4. (1,0 ponto) —————

Deve-se fabricar um recipiente cilíndrico – de base circular – aberto no topo, com capacidade de volume igual a V centímetros cúbicos. Se o custo do material usado para a fabricação da base é três vezes o custo do material para a superfície lateral, e se não há perda de material, determine as dimensões do recipiente que minimizam o custo.

Solução:

Seja r o raio da base e h a altura do cilindro. Como o volume deve ser V temos

$$V = (\text{Área da base}) \cdot (\text{Altura do cilindro}) = (\pi r^2) \cdot (h) = \pi r^2 h$$

Queremos minimizar o custo total de material para a fabricação do recipiente. Se c for o custo unitário (por centímetro quadrado) de fabricação da superfície lateral, $3c$ será o custo unitário de fabricação da base. As áreas da base (A_b) e da superfície lateral (A_l) valem respectivamente

$$A_b = \pi r^2 \quad \text{e} \quad A_l = 2\pi r h$$

Assim o custo total C será a soma do custo da base mais o custo da lateral, ou seja,

$$C = 3c(\pi r^2) + c(2\pi r h) = \pi c [3r^2 + 2rh]$$

podemos reescrever o custo C em função somente do raio r ou da altura h .

$$V = \pi r^2 h \longrightarrow h = \frac{V}{\pi r^2} \quad \text{ou} \quad r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}$$

Vamos reescrevê-lo em função do raio r .

$$C = \pi c [3r^2 + 2rh] = \pi c \left[3r^2 + 2r \frac{V}{\pi r^2} \right] = \pi c \left[3r^2 + \frac{2V}{\pi r} \right]$$

que coloca o custo C em função do raio r . Para determinar o valor de r que minimiza o custo vamos achar os pontos críticos.

$$C' = \pi c \left[6r + \frac{2V}{\pi} \left(-\frac{1}{r^2} \right) \right] = 2\pi c \left[\frac{3\pi r^3 - V}{\pi r^2} \right] = 2\pi c \left[3r - \frac{V}{\pi r^2} \right]$$

$r = 0$ não é ponto crítico porque a função que representa o custo não está definida neste ponto. Logo, o ponto crítico ocorre quando

$$3\pi r^3 - V = 0 \quad \text{ou} \quad r = \sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}$$

Verifiquemos agora a segunda derivada, assim descobriremos se o ponto crítico é um ponto de mínimo ou máximo.

$$C'' = 2\pi c \left[3 - (-2) \frac{V}{\pi r^3} \right] = 2\pi c \left[3 + \frac{2V}{\pi r^3} \right]$$

que é sempre positiva para $r > 0$, logo o ponto crítico é um ponto de mínimo. Já sabemos o raio que minimiza o custo, falta somente calcular a altura,

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{V}{\pi \left[\sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}} \right]^2} = \frac{V}{\pi \left[\sqrt[3]{\frac{V^2}{3^2\pi^2}} \right]} = \frac{V}{\pi} \sqrt[3]{\frac{9\pi^2}{V^2}} = \sqrt[3]{\frac{V^3}{\pi^3} \cdot \frac{9\pi^2}{V^2}} = \sqrt[3]{\frac{9V}{\pi}}$$

Resumindo

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}} \quad \text{e} \quad h = \sqrt[3]{\frac{9V}{\pi}}$$

5. (1,0 ponto) _____

Ache o ponto na curva $y = x^2$ que esteja mais próximo do ponto $(18, 0)$.

Solução:

Lembre-se de que a distância entre dois pontos $\mathbf{a} = (x_a, y_a)$ e $\mathbf{b} = (x_b, y_b)$ é dada por $\sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$.

Logo a distância D entre o ponto indicado e um ponto qualquer (x, y) vale

$$D = \sqrt{(x - 18)^2 + (0 - y)^2} = \sqrt{(x - 18)^2 + y^2}$$

como queremos que o ponto pertença a curva $y = x^2$ a distância D valerá

$$D = \sqrt{(x - 18)^2 + (x^2)^2} = \sqrt{(x - 18)^2 + x^4} = \sqrt{x^4 + x^2 - 36x + 324}$$

queremos que a distância D seja mínima. Entretanto, minimizar D^2 também minimiza D . Vamos então minimizar $D^2 = \mathcal{D}$.

$$\mathcal{D}' = 4x^3 + 2x - 36 \implies 4x^3 + 2x - 36 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x^3 + x - 18 = 0$$

fatorando

$$(x - 2)(2x^2 + 4x - 9) = 0 \implies (x - 2)(2x^2 + 4x + 9) = 0$$

entretanto, $2x^2 + 4x + 9$ só possui raízes reais. Consequentemente o único ponto crítico é $x = 2$. Se olharmos agora a segunda derivada veremos se este ponto crítico se trata de um ponto de mínimo ou de máximo.

$$\mathcal{D}'' = 12x^2 + 2 \implies \text{que é positiva em } x = 2$$

sendo então $x = 2$ um ponto de mínimo. Assim o ponto na curva mais próximo de $(8, 0)$ é

$$(x, y) = (x, x^2) = (2, 4)$$

6. (1,0 ponto) —————

Ache as antiderivadas:

(a) $\int (1-x)\sqrt{x} \, dx$

(b) $\int \frac{x^3 + 5x^2 - 4}{x^2} \, dx$

(c) $\int (s^3 + 2)^2(3x^2) \, ds$

(d) $\int \sqrt[3]{1-x^2} \, x \, dx$

(e) $\int \frac{\cos x \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

Solução:

(a)
$$\begin{aligned} \int (1-x)\sqrt{x} \, dx &= \int (1-x)x^{1/2} \, dx = \int (x^{1/2} - x^{3/2}) \, dx \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{2}{5}x^{5/2} + C \end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 5x^2 - 4}{x^2} \, dx &= \int \left[\frac{x^3}{x^2} + \frac{5x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2} \right] \, dx = \int [x + 5 - 4x^{-2}] \, dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 5x - 4\frac{1}{-1}x^{-1} + C = \frac{x^2}{2} + 5x + \frac{4}{x} + C \end{aligned}$$

(c) $\int (s^3 + 2)^2(3x^2) \, ds \implies \textbf{Item Anulado:}$ deveria ser $\int (s^3 + 2)^2(3s^2) \, ds$

(d)
$$\begin{aligned} \int \sqrt[3]{1-x^2} \, x \, dx &= -\frac{1}{2} \int (1-x^2)^{1/3}(-2x) \, dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{4/3}(1-x^2)^{4/3} \right] + C \\ &= -\frac{3}{8}(1-x^2)^{4/3} + C \end{aligned}$$

(e) $\int \frac{\cos x \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

Seja $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$. Portanto, $du = \frac{1}{2}x^{-1/2}$ e $2du = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Substituindo na integral

$$\int \frac{\cos x \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int \cos u \, du = 2\text{sen } u + C = 2\text{sen } \sqrt{x} + C$$

7. (1,0 ponto) —————

Calcule a área delimitada pelos gráficos das curvas definidas pelas equações $2y^2 = x + 4$ e $x = y^2$.

Solução:

Considerando as funções na variável y , teremos $f(y) = y^2$ e $g(y) = 2y^2 - 4$. A área desejada será igual a integral da diferença entre as duas funções.

A interseção entre os dois gráficos se dá quando $f(y) = g(y)$ ou

$$y^2 = 2y^2 - 4 \implies y^2 - 4 = 0 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

Portanto,

$$\text{Área} = \int_{-2}^2 [f(y) - g(y)] dy = \int_{-2}^2 [y^2 - 2y^2 + 4] dy = \int_{-2}^2 [4 - y^2] dy$$

$$\text{Área} = \left[4x - \frac{y^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left[4 \cdot 2 - \frac{2^3}{3} \right] - \left[4 \cdot (-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right] = \left[8 - \frac{8}{3} \right] - \left[-8 - \frac{-8}{3} \right] =$$

$$\text{Área} = \frac{24 - 8 + 24 - 8}{3} = \frac{32}{3}$$

8. (1,0 ponto) _____

Calcule os limites a seguir:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x - 8}{7x^2 - 2x + 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$

Solução:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x - 8}{7x^2 - 2x + 1}$

$$\frac{+\infty}{+\infty} \longrightarrow \text{Regra de L'Hôpital}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x - 8}{7x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 5}{14x - 2}$$

que também é uma indeterminação do tipo $+\infty / +\infty$, podemos aplicar novamente a regra de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 5x - 8}{7x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 5}{14x - 2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{14} = \frac{6}{14}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$$

Novamente temos $\frac{+\infty}{+\infty} \rightarrow$ Regra de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$$

É a mesma indeterminação dos itens anteriores. Logo, pela regra de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

9. (1,0 ponto) _____

Usando o cálculo de volumes de sólidos de revolução por integrais calcule:

- (a) O volume de um cone de altura h e raio da base igual a r .
- (b) O volume da esfera de raio r .

Solução:

- (a) Um cone é gerado por revolução em torno do eixo x da região entre a linha $y = \frac{r}{h}x$ e o eixo x , entre os pontos $x = 0$ e $x = h$. Assim o volume V de um cone pode ser expresso por,

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^h y^2 dx = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^h \\ &= \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{1}{3} h^3 \right] = \frac{\pi r^2 h^3}{3h^2} = \frac{1}{3} \pi r^2 h \end{aligned}$$

- (b) Uma esfera é gerada por revolução em torno do eixo x da região entre o semicírculo $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ e o eixo x , entre $x = -r$ e $x = r$. Assim o volume V de uma esfera pode ser expresso por,

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^r y^2 dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^r = 2\pi \left[r^2 r - \frac{1}{3} r^3 \right] \\ &= \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

10. (1,0 ponto) _____

Ache o volume do sólido gerado por revolução da região entre o eixo x e a parábola $y = 4x - x^2$ em torno da linha $y = 6$.

Solução:

$$V = \pi \int_0^4 \left[6^2 - (6 - y)^2 \right] dx = \pi \int_0^4 \left[36 - (6 - 4x + x^2)^2 \right] dx$$

$$\begin{aligned}
&= \pi \int_0^4 \left[36 - (36 - 48x + 28x^2 - 8x^3 + x^4) \right] dx \\
&= \pi \int_0^4 [48x - 28x^2 + 8x^3 - x^4] dx \\
&= \pi \left[48 \frac{x^2}{2} - 28 \frac{x^3}{3} + 8 \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_0^4 \\
&= \pi \left[24x^2 - 28 \frac{x^3}{3} + 2x^4 - \frac{x^5}{5} \right]_0^4 \\
&= \pi \left[\frac{360x^2 - 140x^3 + 30x^4 - 3x^5}{15} \right]_0^4 \\
&= \pi \left[\frac{360(4)^2 - 140(4)^3 + 30(4)^4 - 3(4)^5}{15} - \frac{360(0)^2 - 140(0)^3 + 30(0)^4 - 3(0)^5}{15} \right] \\
&= \pi \left[\frac{5760 - 8960 + 7680 - 3072}{15} \right] = \pi \left[\frac{1408}{15} \right] = \frac{1408\pi}{15}
\end{aligned}$$