



**Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação**  
**Disciplina: Matemática para Computação**  
**AP2 - 1º semestre de 2019 - Gabarito**

## Questões

1. (2,5 pontos) \_\_\_\_\_

Dada a função  $y = x^4 - 6x + 2$ , esboce seu gráfico

**Solução:**

Candidatos a pontos críticos  $\longrightarrow y' = 0$


$$y' = 0 \longrightarrow 4x^3 - 6 = 0 \longrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{6}{4}} = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$$

Candidatos a pontos de inflexão  $\longrightarrow y'' = 0$

$$y'' = 0 \longrightarrow 12x^2 = 0 \longrightarrow x = 0$$

$x = 0$  pode ser um ponto de inflexão, mas  $y''$  é sempre positiva, logo a concavidade da curva tanto para  $x < 0$  assim como para  $x > 0$  é voltada para cima e portanto  $x = 0$  não é um ponto de inflexão.

No único ponto crítico  $x = \sqrt[3]{3/2}$ , o valor de  $y'' > 0$  que indica ser o ponto crítico um ponto de mínimo relativo. Como só há um ponto crítico este é um ponto de mínimo global.



2. (2,5 pontos) \_\_\_\_\_

Calcule as integrais abaixo:

(a)

$$\int \frac{(1+x)^2}{\sqrt{x}} dx$$

(b)

$$\int \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} dx$$

(c)

$$\int \cos 3x dx$$

**Solução:**

(a)

$$\begin{aligned} \int \frac{(1+x)^2}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{(1+2x+x^2)}{x^{\frac{1}{2}}} dx \\ &= \int \left[ \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} + \frac{2x}{x^{\frac{1}{2}}} + \frac{x^2}{x^{\frac{1}{2}}} \right] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \left[ x^{-\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}} \right] dx \\
&= \int \left[ x^{-\frac{1}{2}} \right] dx + \int \left[ 2x^{\frac{1}{2}} \right] dx + \int \left[ x^{\frac{3}{2}} \right] dx \\
&= \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} x^{-\frac{1}{2}+1} + 2 \frac{1}{\frac{1}{2}+1} x^{\frac{1}{2}+1} + \frac{1}{\frac{3}{2}+1} x^{\frac{3}{2}+1} + C \\
&= \frac{1}{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} + 2 \frac{1}{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{\frac{5}{2}} x^{\frac{5}{2}} + C \\
&= 2x^{\frac{1}{2}} + 2 \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C \\
&= 2\sqrt{x} + \frac{4}{3}\sqrt{x^3} + \frac{2}{5}\sqrt{x^5} + C
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} dx &= \int \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} dx \\
&= \int \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} dx \\
&= \int \left[ \frac{(x+1)^2}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx \\
&= \int \left[ 1 - (x+1)^{-2} \right] dx \\
&= x - \frac{1}{(-2+1)}(x+1)^{-2+1} + C \\
&= x + (x+1)^{-1} + C \\
&= x + \frac{1}{(x+1)} + C \\
&= \frac{x(x+1) + 1}{(x+1)} + C \\
&= \frac{x^2 + x + 1}{x+1} + C = \frac{x^2}{x+1} + C
\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
\int \cos 3x \, dx &= \frac{3}{3} \int \cos 3x \, dx \\
&= \frac{1}{3} \int 3 \cos 3x \, dx \\
&= \frac{1}{3} \sin 3x + C
\end{aligned}$$

3. (2,5 pontos)

---

Usando a regra de L'Hôpital calcule os limites

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^4 - 256}{x^2 - 16}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x - 2}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + x^2}{e^x + 1}$$

**Solução:**

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^4 - 256}{x^2 - 16} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x^3}{2x} = \frac{4 \cdot 4^3}{2 \cdot 4} = 32 \quad \left( \text{tipo } \frac{0}{0} \right)$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x - e^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^x}{1} = e^2 \quad \left( \text{tipo } \frac{0}{0} \right)$$

(c)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + x^2}{e^x + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 + 2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x^2 + 2}{e^x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{24x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{24}{e^x} = 0 \quad \left( \text{tipo } \frac{\infty}{\infty} \right) \end{aligned}$$


4. (2,5 pontos)

---

Seja a região entre o eixo  $x$ , a linha  $x = 2$  e a curva  $y = x^3$ . Ache o volume do sólido gerado por rotação da região em torno do eixo  $x$ .

**Solução:**

O gráfico ilustra as curvas que definem a região a ser rotacionada.



$$V = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 (x^3)^2 dx = \pi \int_0^2 x^6 dx = \pi \left[ \frac{x^7}{7} \right]_0^2 = \frac{128\pi}{7}$$