



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação
AP1 - 2º semestre de 2012 - Gabarito

Questões

1. (2,50 pontos) _____

Determine as inversas das seguintes funções, a seguir calcule as primeiras derivadas das funções e de suas inversas:

(a) $f(x) = x^3 + 1$

(b) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

Solução:

(a) $f(x) = x^3 + 1$

$$y = x^3 + 1 \implies y - 1 = x^3 \implies \sqrt[3]{y - 1} = x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1}$$

$$[f(x)]' = 3x^2$$

$$[f^{-1}]'(x) = \frac{1}{3}[x - 1]^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x - 1)^2}}$$

(b) $f(x) = \sqrt[4]{x - 1}$

$$y = \sqrt[4]{x - 1} \implies y^4 = x - 1 \implies x = y^4 + 1$$

$$f^{-1}(x) = x^4 + 1$$

$$[f(x)]' = \frac{1}{4}[x - 1]^{-3/4} = \frac{1}{4\sqrt[4]{(x - 1)^3}}$$

$$[f^{-1}(x)]' = x^4 + 1 = 4x^3$$

2. (2,50 pontos) _____

Calcule os limites abaixo.

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x - 5} + 3x$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x^2 - 4}$

Solução:

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x - 5} + 3x = \sqrt{2 \cdot 4 - 5} + 3 \cdot 4 = \sqrt{8 - 5} + 12 = \sqrt{3} + 12$

(b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x^2 - 4} = \frac{3}{3^2 - 4} = \frac{3}{9 - 4} = \frac{3}{5}$

3. (2,50 pontos) _____

Mostre que a função $f(x) = \sqrt{x^2}$ é contínua em toda a reta dos reais.

Solução:

Devemos mostrar que em todos os pontos da reta real, o limite existe e é igual ao valor da função no ponto.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ Existe e } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x^2} = \sqrt{a^2} = a = f(a)$$

4. (2,50 pontos) _____

Calcule as derivadas de primeira ($f'(x)$) e segunda ($f''(x)$) ordens das funções

(a) $f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$

(b) $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$

Solução:

(a)

$$f(x) = x^{4/3} + 4x^{1/3}$$

$$f'(x) = [x^{4/3} + 4x^{1/3}]' = \frac{4}{3}x^{1/3} + 4 \cdot \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{4}{3}x^{1/3} + \frac{4}{3}x^{-2/3} = \frac{4}{3} \left[\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right]$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[\frac{4}{3}x^{1/3} + \frac{4}{3}x^{-2/3} \right]' = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3}x^{-2/3} - \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{3}x^{-5/3} = \frac{4}{9}x^{-2/3} - \frac{8}{9}x^{-5/3} \\ &= \frac{4}{9} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} - \frac{8}{9} \frac{1}{\sqrt[3]{x^5}} \end{aligned}$$

(b)

$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

$$f'(x) = [x\sqrt{4-x^2}]' = (x)'(\sqrt{4-x^2}) + (x)(\sqrt{4-x^2})'$$

$$= \sqrt{4-x^2} + (x)\left(\frac{1}{2}(4-x^2)^{-1/2}(-2x)\right) = \sqrt{4-x^2} - \left(\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)$$

$$= \sqrt{4-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$f''(x) = [x\sqrt{4-x^2}]'' = \left[\frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right]' = \frac{[4-2x^2]'[\sqrt{4-x^2}] - [4-2x^2][\sqrt{4-x^2}]'}{[\sqrt{4-x^2}]^2}$$

$$= \frac{[-4x][\sqrt{4-x^2}] - [4-2x^2]\left[\frac{1}{2}(4-x^2)^{-1/2}(-2x)\right]}{[4-x^2]}$$

$$= \frac{-4x\sqrt{4-x^2} + x(4-2x^2)(4-x^2)^{-1/2}}{4-x^2}$$

$$= \frac{-4x\sqrt{4-x^2} + \frac{x(4-2x^2)}{(4-x^2)^{1/2}}}{4-x^2} = \frac{-4x\sqrt{4-x^2} + \frac{x(4-2x^2)}{\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2}$$

$$= \frac{\frac{-4x(4-x^2) + x(4-2x^2)}{\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2} = \frac{-4x(4-x^2) + x(4-2x^2)}{\sqrt{4-x^2}(4-x^2)}$$

$$= \frac{-16x + 4x^3 + 4x - 2x^3}{\sqrt{(4-x^2)^3}} = \frac{2x^3 - 12x}{\sqrt{(4-x^2)^3}}$$