

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação
AP1 - 1º semestre de 2018 — Gabarito

Questões

1. (2,5 pontos) _____

Determine as inversas das seguintes funções:

(a) $f(x) = 2x^3 - 2$

(b) $f(x) = \sqrt[6]{x-1}$

Solução:

(a) $f(x) = 2x^3 - 2$

$$y = 2x^3 - 2 \implies y + 2 = 2x^3 \implies \frac{y+2}{2} = x^3 \implies \sqrt[3]{\frac{y+2}{2}} = x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{x+2}{2}}$$

(b) $f(x) = \sqrt[6]{x-1}$

$$y = \sqrt[6]{x-1} \implies y^6 = x-1 \implies x = y^6 + 1$$

$$f^{-1}(x) = x^6 + 1$$

2. (2,50 pontos) _____

Calcule os limites abaixo.

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 - 27}{x^3 - 9}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(x-1)^2}$

Solução:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4 - 27}{x^3 - 9} = \frac{3^4 - 27}{3^3 - 9} = \frac{81 - 27}{27 - 9} = \frac{54}{18} = \frac{27}{9} = 3$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)}{(x - 1)} = \infty$$

3. (2,50 pontos) —————

Discuta a continuidade da função usando a definição de continuidade:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2}$$

Solução:

$f(x)$ não é definida se o denominador $x - 2$ se anular ou se o radicando $x^2 - 7$ for negativo, isto é, se $x = 2$ ou se $-\sqrt{7} < x < \sqrt{7}$. Qualquer outro número real está em um dos intervalos $(-\infty, -\sqrt{7}]$ ou $[\sqrt{7}, \infty)$. Temos então que provar a continuidade de $f(x)$ em todo o domínio. Ou seja, no interior dos intervalos (*usando limites*) e nos extremos (*usando limites laterais*).

Intervalos $(-\infty, -\sqrt{7}] \cup [\sqrt{7}, \infty)$:

nos pontos interiores

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} = \frac{\sqrt{c^2 - 7}}{c - 2} = f(c) \quad \forall c \in (-\infty, -\sqrt{7}) \cup (\sqrt{7}, \infty)$$

nos extremos dos intervalos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} \frac{\sqrt{x - 2}}{\sqrt{x - 2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(x^2 - 7)(x - 2)}}{\sqrt{(x - 2)^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^3 - 2x^2 - 7x + 14}}{\sqrt{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2x^2 - 7x + 14}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}} \\ &= \sqrt{1} = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{7}} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\sqrt{7}} \sqrt{x^2 - 7}}{\lim_{x \rightarrow -\sqrt{7}} x - 2} = \frac{\sqrt{(-\sqrt{7})^2 - 7}}{-\sqrt{7} - 2} = \frac{\sqrt{7 - 7}}{-\sqrt{7} - 2} = 0 = f(-\sqrt{7})$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{7}} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow \sqrt{7}} \sqrt{x^2 - 7}}{\lim_{x \rightarrow \sqrt{7}} x - 2} = \frac{\sqrt{(\sqrt{7})^2 - 7}}{\sqrt{7} - 2} = \frac{\sqrt{7 - 7}}{\sqrt{7} - 2} = 0 = f(\sqrt{7})$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 7}}{x - 2} \frac{\sqrt{x - 2}}{\sqrt{x - 2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(x^2 - 7)(x - 2)}}{\sqrt{(x - 2)^3}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^3 - 2x^2 - 7x + 14}}{\sqrt{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x^2 - 7x + 14}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}} \\
&= \sqrt{1} = 1
\end{aligned}$$

enfim, $f(x)$ é contínua em todos os pontos de seu domínio, a saber $(-\infty, -\sqrt{7}] \cup [\sqrt{7}, \infty)$.

4. (2,50 pontos) _____

Calcule as derivadas de primeira ($f'(x)$) e segunda ($f''(x)$) ordens das funções

(a)

$$f(x) = \frac{2}{x^{1/3}} + \frac{6}{x^{1/4}} - \frac{2}{x^{3/2}} - \frac{4}{x^{3/4}}$$

(b)

$$f(x) = \frac{3 + 2x}{3 - 2x}$$

Solução:

(a)
$$f(x) = \frac{2}{x^{1/3}} + \frac{6}{x^{1/4}} - \frac{2}{x^{3/2}} - \frac{4}{x^{3/4}}$$

$$f(x) = 2x^{-1/3} + 6x^{-1/4} - 2x^{-3/2} - 4x^{-3/4}$$

Primeira Derivada:

$$f'(x) = -\frac{1}{3}2x^{-1/3-1} - \frac{1}{4}6x^{-1/4-1} + \frac{3}{2}2x^{-3/2-1} + \frac{3}{4}4x^{-3/4-1}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{3}2x^{-4/3} - \frac{1}{4}6x^{-5/4} + \frac{3}{2}2x^{-5/2} + \frac{3}{4}4x^{-7/4}$$

$$f'(x) = -\frac{2}{3x^{4/3}} - \frac{6}{4x^{5/4}} + \frac{3}{x^{5/2}} + \frac{3}{x^{7/4}}$$

$$f'(x) = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x^4}} - \frac{6}{4\sqrt[4]{x^5}} + \frac{3}{\sqrt{x^5}} + \frac{3}{\sqrt[4]{x^7}}$$

Segunda Derivada:

$$f''(x) = -\frac{1}{3} \left[-\frac{4}{3} \right] 2x^{-4/3-1} - \frac{1}{4} \left[-\frac{5}{4} \right] 6x^{-5/4-1} + \frac{3}{2} \left[-\frac{5}{2} \right] 2x^{-5/2-1} + \frac{3}{4} \left[-\frac{7}{4} \right] 4x^{-7/4-1}$$

$$f''(x) = \frac{8}{9}x^{-10/3} + \frac{30}{16}x^{-9/4} - \frac{30}{4}x^{-7/2} + \frac{84}{16}x^{-11/4}$$

$$f''(x) = \frac{8}{9x^{10/3}} + \frac{30}{16x^{9/4}} - \frac{30}{4x^{7/2}} + \frac{84}{16x^{11/4}}$$

$$f''(x) = \frac{8}{9\sqrt[3]{x^{10}}} + \frac{15}{8\sqrt[4]{x^9}} - \frac{15}{2\sqrt{x^7}} + \frac{21}{4\sqrt[4]{x^{11}}}$$

(b) $f(x) = \frac{3+2x}{3-2x}$

Da regra do quociente:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Primeira Derivada:

$$f'(x) = \frac{(3+2x)'(3-2x) - (3+2x)(3-2x)'}{(3-2x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{6-4x+6+4x}{(3-2x)^2} = \frac{12}{(3-2x)^2}$$

Segunda Derivada:

$$f''(x) = \frac{(12)'(3-2x)^2 - (12)[(3-2x)^2]'}{(3-2x)^4} = \frac{0 \cdot (3-2x)^2 - 12[9-12x+4x^2]'}{(3-2x)^4}$$

$$f''(x) = \frac{0-12[-12+8x]}{(3-2x)^4} = \frac{144-96x}{(3-2x)^4}$$