

Fundamentos Matemáticos e Computacionais de Machine Learning

Especialização em Machine Learning e Big Data



Profa. Dra. Juliana Felix

jufelix16@uel.br



Básico de Geometria Analítica

Fundamentos de Geometria Analítica

- O primeiro fundamento de toda a geometria analítica é a noção de espaço.
- Na geometria temos o espaço \mathbb{R} (números Reais).
 - Este espaço é unidimensional e é representado como uma linha, ou eixo, geralmente na horizontal, em que os números estão representados sobre ele.
- Sobre esse eixo podemos representar valores, e identificá-los como "ponto".




Fundamentos de Geometria Analítica

- Desta forma, o segundo fundamento da geometria analítica é o conceito de ponto.
- O ponto é um valor que pode ser representado em um espaço.
- Na figura abaixo, o ponto $C = 2$, está representado no eixo.




Fundamentos de Geometria Analítica

- O espaço pode ter mais dimensões.
- Daí, temos o conceito de \mathbb{R}^2
 - O \mathbb{R}^2 é um espaço representado por dois eixos, geralmente representados na vertical e horizontal.
- O \mathbb{R}^2 forma o que chamamos de Plano ou Plano Cartesiano.




Fundamentos de Geometria Analítica

- O Plano ou Plano Cartesiano tem seus eixos geralmente representados pelas letras X e Y, na horizontal e na vertical, respectivamente.
- Todavia isso não é uma regra. O importante é que cada eixo tenha seu próprio nome.




Fundamentos de Geometria Analítica

- Além disso, o eixo horizontal costuma ser chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical como eixo das ordenadas.
- Eixo das abscissas significa que é onde se encontram os valores livres.
- Eixo das ordenadas significa que é onde se encontram os valores dependentes
 - Ou seja, dependem dos valores livres.
- Todavia, isso é também uma mera convenção.




Fundamentos de Geometria Analítica

- No plano representamos o ponto pelo par de valores (X, Y) .
- Por exemplo:
 - O ponto $O (0,0)$ está nas coordenadas $x=0$ e $y=0$.
 - Este ponto é conhecido como origem.
 - O ponto $A (-3,1)$ está nas coordenadas $x=-3$ e $y=1$
 - E assim por diante.



Fundamentos de Geometria Analítica

- Outro conceito muito importante é a reta.
- A reta pode ser representada no \mathbb{R} ou \mathbb{R}^1 , por dois ou mais pontos alinhados.
- É importante ressaltar que uma reta é composta por infinitos pontos colineares (alinhados na mesma direção)




Fundamentos de Geometria Analítica

- Todavia, precisamos apenas de dois pontos para definirmos uma reta.
- Os pontos A e B definem a reta e todos os pontos sobre essa reta são colineares, logo, estão sobre a mesma reta.




Fundamentos de Geometria Analítica

- No \mathbb{R}^2 , uma reta representa valores colineares no plano \mathbb{R}^2 , e portanto, com dois pontos, podemos definir a reta neste plano.
- Na figura, a reta está representada pelos pontos A_1 e A_2
 - Não necessariamente a reta inicia ou termina em um desses dois pontos.



Fundamentos de Geometria Analítica


- A reta r pode ser representada pelos pontos A_1 , e A_2 , logo as coordenadas da reta r são (x_1, y_1) e (x_2, y_2) .



Fundamentos de Geometria Analítica

- Conhecendo-se dois pontos, podemos calcular a **distância** entre eles, que pode também ser interpretada como o **comprimento** da reta r .
- Para calcular a distância desses pontos podemos utilizar a equação da **distância "euclidiana"**:

$$d_{A_1A_2} = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2}$$



Fundamentos de Geometria Analítica

- Essa distância nada mais é que o comprimento do segmento que liga os dois pontos.
- Exemplo:
 - Dados A(2,3) e B(5,1), qual é a distância entre esses dois pontos?

$$dAB = \sqrt{|5 - 2|^2 + |1 - 3|^2}$$

$$dAB = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

$$dAB = \sqrt{9 + 4}$$

$$dAB = \sqrt{13}$$

Fundamentos de Geometria Analítica

- Com base na ideia de distância e do segmento que une dois pontos, outra fórmula importante é a de **ponto médio** de um segmento.
- Para calcular o ponto $M(x_m, y_m)$, que é ponto médio do segmento $A1(x_1, y_1)$ e $A2(x_2, y_2)$, utilizamos a equação:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}$$
$$y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

- Essa fórmula nada mais é que a média aritmética entre as abcissas dos dois pontos e as ordenadas também dos dois pontos.

Fundamentos de Geometria Analítica

- Encontre o ponto médio entre os pontos A(-2,5) e B(6,3).

$$x_m = \frac{-2 + 6}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$y_m = \frac{5 + 3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Fundamentos de Geometria Analítica

- A condição de alinhamento de três pontos serve para realizar a verificação de que três pontos $A1 (x_1, y_1)$, $A2(x_2, y_2)$ e $A3(x_3, y_3)$ estão alinhados ou não.
- Calculamos o determinante da seguinte matriz:

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

Fundamentos de Geometria Analítica

- Existem dois casos possíveis
 - se o determinante for igual a 0, significa que os três pontos estão alinhados,
 - Caso contrário, dizemos que os pontos não estão alinhados ou então que são vértices de um triângulo.

Equação da reta


- A reta pode também ser representada pela sua equação.
- Existem diversas equações, mas as mais comuns são:

- Equação geral da reta:

$$ax + by + c = 0$$

- Equação reduzida da reta:

$$y = mx + n$$



Equação da reta

- Observe que os termos m e n da equação


$$y = mx + n$$

Podem ser entendidos como manipulação algébrica dos termos a , b e c , a equação

$$ax + by + c = 0$$

Formando então (ignorando-se os sinais)

$$y = a/b x + c/b$$



Equação da reta


- É importante destacar que os termos m e n da equação

$$y = mx + n$$

podem ser interpretados como parâmetros da reta também.

Em que m é o coeficiente de inclinação da reta, ou seja, $\text{tg}(\alpha)$

E n é o coeficiente de deslocamento (onde a reta toca no eixo y)



Equação da reta


Na geometria, sabe-se que a tangente de um ângulo é dada por:

$$\text{tg } \alpha = \text{cateto oposto} / \text{cateto adjacente}$$

Com as manipulações corretas, chegamos a:

$$\text{tg } \alpha = y_B - y_A / x_B - x_A$$

$$m = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$$



- Por padrão, quando $m > 0$, a reta é ascendente no plano cartesiano.
- Se, $m < 0$, admite-se que a reta r é descendente.

Equação da reta

Assim, de posse de dois pontos, podemos então calcular o coeficiente m , (e o ângulo alfa se necessário):

$$m = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$$

- Para obter o termo n da equação, basta usar a equação

$$y = mx + n$$

- Com o valor de m , e escolher um par (x,y) para calcular o coeficiente n .

Equação da reta

- Exemplo: dado A(2,3) e B(5,1), qual é a equação da reta?
- Se:

$$m = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$$

$$m = (1 - 3) / (5 - 2)$$

$$m = -2/3$$

- Então:

$$y = mx + n$$


$$3 = -2/3 * 2 + n$$

$$n = 3 + 4/3$$

$$n = 13/3$$

- Logo:

$$y = -2/3 x + 13/3$$



A circunferência


- Outras equações estudadas na geometria analítica são as equações geral e reduzida da circunferência, tendo o centro definido pelo ponto $O(x_c, y_c)$:

- Equação reduzida da circunferência:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

- Equação geral da circunferência

- $x^2 + y^2 - 2x_c x - 2y_c y + x_c^2 + y_c^2 - r^2 = 0$




A parábola

- De forma simplificada:
 - A parábola está ligada às funções do segundo grau.
 - Assim, a parábola pode ser representada pela equação:


$$y = ax^2 + bx + c$$

- Em que a define a abertura da parábola, enquanto b e c deslocam a parábola da origem do plano.




Plano R3

- O Plano R3 é definido por três eixos, comumente chamados de eixos X, Y e Z, embora isso não seja uma regra.



Ponto no \mathbb{R}^3

- O ponto no \mathbb{R}^3 é representado por três coordenadas




Reta/Plano no R3

- Com três coordenadas no R3, a reta, na verdade representa um plano, e portanto possui uma equação mais complexa:

$$aX + bY + cZ + d = 0$$

- Exemplos
 - $A(x_1, y_1, z)$ e $B(x_2, y_2, z)$, onde z em A e B são iguais
 - $A(x_1, y, z_1)$ e $B(x_2, y, z_2)$, onde y em A e B são iguais
 - $A(x, y_1, z_1)$ e $B(x, y_2, z_2)$, onde x em A e B são iguais




Reta/Plano no R3

- A equação do plano

$$aX + bY + cZ + d = 0$$

Permite inferir que a , b , e c são os coeficientes que definem a inclinação do plano no espaço R^3 , e d permite deslocar o plano da origem.



Reta/Plano no R3

- Conhecendo-se dois pontos, podemos calcular a **distância** entre eles, que pode também ser interpretada como o **comprimento** da reta r entre os pontos no plano.
- Para calcular a distância desses pontos podemos utilizar a equação da **distância "euclidiana"**:

$$d_{A_1A_2} = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 + |z_2 - z_1|^2}$$

Considerações Finais

- É importante destacar que
 - Quem ocupa o eixo horizontal, vertical, etc, é uma mera convenção
 - Quem é a variável independente e dependente está relacionado ao valor de interesse
 - Os nomes X, Y, e Z para eixos é uma mera convenção, e podem ser chamados de eixos Y, K, T, ou X1, X2, e X3, etc
 - A mesma regra vale para a representação de pontos e suas coordenadas. Pontos podem ser representados como:
 - $P1(x1, y2, z2)$, ou
 - $P1(x1_1, x2_1, x3_1)$, etc

Links úteis



Calculadoras gráficas:

[Desmos | Calculadora Gráfica](#)

[Calculadora 3D - GeoGebra](#)