



Колебания

Теория



По пройденному: серия 2.

Гармонические колебания

Def. Колебания гармонические, если координата подчиняется уравнению

$$\ddot{x} = -\omega^2 x.$$

Его решение $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$: A — амплитуда, φ_0 — начальная фаза, ω — циклическая частота, период $T = 2\pi/\omega$, частота $\nu = 1/T$.

Утверждение. Частота задаётся самой системой, амплитуда и фаза — начальными условиями: $x(0) = A \cos \varphi_0$, $\dot{x}(0) = -A\omega \sin \varphi_0$. Скорость колеблется с амплитудой $A\omega$, ускорение — с амплитудой $A\omega^2$.

Утверждение (маятники). Груз на пружине: $\omega^2 = k/m$. Математический маятник при малых углах: $\omega^2 = g/l$. Постоянная сила сдвигает положение равновесия, но не меняет частоту: груз на вертикальной пружине колеблется около растянутого положения с той же $\omega^2 = k/m$.

Энергетический метод

Утверждение. Пусть q — координата, отсчитанная от положения равновесия: смещение, угол, длина — любая, которая одна задаёт положение системы. Если при малых q полная энергия

$$E = \frac{\mu \dot{q}^2}{2} + \frac{\kappa q^2}{2} + \text{const},$$

то колебания гармонические и $\omega^2 = \kappa/\mu$. Коэффициенты μ и κ — эффективные масса и жёсткость; у них может быть другая размерность, чем у массы и жёсткости, если q — не длина.

Замечание (как считать). Кинетическую энергию выразить через $\dot{q}$ и оставить главный, квадратичный член. Потенциальную разложить по q до второго порядка: линейный член в равновесии обращается в ноль, квадратичный и даёт κ . Члены выше второго порядка при малых колебаниях не нужны.

Утверждение (около минимума). Частица массы m в поле с потенциальной энергией $U(x)$: равновесие там, где $U'(x_0) = 0$, и около него

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2} U''(x_0) (x - x_0)^2, \quad \omega^2 = \frac{U''(x_0)}{m}.$$

Минимум U — равновесие устойчиво, тело колеблется; максимум — неустойчиво, малое отклонение растёт.

Неинерциальные системы

Утверждение. В системе отсчёта, которая движется поступательно с ускорением $\vec{a}$, на тело массы m действует сила инерции $-m\vec{a}$. Она постоянна и складывается с силой тяжести, так что в такой системе тело ведёт себя как в поле тяжести с другим ускорением свободного падения.