ВЛИЯНИЕ *N*-АЦИЛЬНОГО И *N*-АЛКИЛЕНОВОГО СПЕЙСЕРА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНЪЮГАТОВ ИПИДАКРИНА КАК АГЕНТОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Бурлаченко П.М.[1,2], *Грищенко М.В.*[2], *Штейнберг Т.С.*[3], *Щегольков Е.В.*[2], *Бургарт Я.В.*[2], *Махаева Г.Ф.*[3], *Салоутин В.И.*[2]
[1] Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
[2] Институт органического синтеза УрО РАН
620066, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22
[3] Институт физиологически активных веществ ФИЦ ПХФ и МХ РАН
142432, г. Черноголовка, Северный проезд, д. 1

В докладе обсуждается синтез конъюгатов на основе ингибитора холинэстераз ипидакрина со спейсерами разных типов и оценка свойств новых соединений как перспективных агентов для терапии болезни Альцгеймера. В ипидакрин **1** вводили спейсер ацилированием (путь А) или замещением атома хлора в его производном **2** (путь В). Конденсацией образующихся аминоацильного **3** и аминоалкильного **4** производных ипидакрина с салициловым альдегидом и восстановлением получали целевые конъюгаты **5–8**.



Найдено, что присутствие карбонильной группы при ипидакрине в конъюгатах **5**, **6** снижает антихолинэстеразную активность, особенно в отношении ацетилхолинэстеразы (АХЭ) по сравнению с аналогами **7**, **8**, имеющими *N*-алкиленовый спейсер. Такой подход позволяет регулировать селективность конъюгатов, что важно для терапии различных стадий БА.

Работа выполнена в рамках государственного задания (тема № 124020500023-9).