

The background is a vibrant collage of Peruvian natural and cultural elements. On the left, a blue falcon is perched on a tree stump. In the center, a waterfall cascades down a lush green cliff. To the right, a large, majestic white deer with antlers stands against a soft, hazy sky. In the bottom right corner, a person wearing a hat and a vest is seen from behind, looking through binoculars at a distant mountain range. The overall scene is a mix of wildlife, landscapes, and human exploration.


III CONGRESO NACIONAL DE  
**ÁREAS DE  
CONSERVACIÓN  
REGIONAL**

**“EL RENACER DEL MARAÑÓN”**

*Propagación y restauración de Parkinsonia peruviana*  
Una especie endémica de los Bosques Secos del Marañón

**ERCY JHULY SANCHEZ SORUE**

**JEFA (e) - ACR BOSQUES SECOS DEL MARAÑÓN**



El Área de Conservación Regional **Bosques Secos del Marañón** es la 3ra área natural protegida administrada por el Gobierno Regional de Cajamarca en trabajo articulado con las poblaciones locales.



Tiene una extensión de 21 794.71 hectáreas:  
**Sector A:** 10,229.27 ha. y **Sector B:** 11,565.44 ha



Se ubica en los **distritos de José Sabogal y Sitacocha**, provincias de **San Marcos y Cajabamba**.



Se trabaja con **17 localidades** del ámbito del área



Conservar una muestra representativa de los Bosques Secos del Marañón, protegiendo sus ecosistemas y especies endémicas, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y contribuyendo a la mitigación del cambio climático.



243 especies de flora, **32 especies endémicas**



95 especies de aves, **10 especies endémicas**



17 especies de mamíferos, **una especie endémica**




2 especies de anfibios, **2 especies endémicas**



15 especies de reptiles, **2 especies endémicas**

## ¿Por qué la Parkinsonia peruviana importa?

- Especie endémica del valle del Marañón y actualmente considerada **En Peligro Crítico (CR)**.
- Su distribución restringida y el reducido número de localidades conocidas evidencian una alta prioridad de conservación.
- El conocimiento sobre su distribución se amplió con la identificación de siete nuevas subpoblaciones dentro del ACR BSM a través de los patrullajes.
- La recuperación requiere integrar investigación, propagación, restauración y monitoreo.
- Es una especie amenazada por la pérdida de su hábitat, ampliación de frontera agrícola, incendios forestales donde se ha reportado, poca regeneración natural, pocos registros de la especie.



CR

Categoría de amenaza

7

### Nuevas subpoblaciones identificadas

# ACR BSM

Territorio de acción

- Parkinsonia peruviana* se asocia a **microclimas térmicamente estables con terrenos irregulares y secos**, condiciones que favorecen su **presencia**

## Una experiencia que conecta conocimiento y acción



**De una especie poco conocida a una experiencia concreta de recuperación en el territorio.**

# Propagación: empezar por buenas semillas

La experiencia permitió generar criterios y procedimientos replicables.

**20**

Individuos seleccionados

**Abr-May**

Época de recolección

**85 %**

Germinación aprox.

**3-10 días**

Emergencia

- Plantas madre seleccionadas por vigor, estado fitosanitario, producción de frutos y semillas, características morfológicas y ubicación.

- Las plantas madre fueron georreferenciadas para fortalecer la trazabilidad de las fuentes semilleras.



- La colecta se realizó entre los meses de abril – mayo



- Selección de semillas por individuo de manera codificada



Proceso pre germinativo y selección de semillas



Combinación de sustratos: **arena + tierra de bosque**, arena, Tierra de bosques, (frecuencia de riego cada 3 días.



- Se aplicaron hidratación, escarificación y tratamiento con agua caliente como tratamientos pregerminativos.

Propagación evidenciado 85 % de germinación y emergencia (3-10 días)

Manejo en vivero (labores culturales) para contar con plántones de calidad (4 meses) con riego cada 4 días



- Tiempo en vivero: 5 – 6 mese. Se recomienda registrar el número de meses transcurridos entre el repique y el traslado definitivo a campo.

## El vivero comunal: laboratorio de aprendizaje local

- Primera experiencia de propagación impulsada por el GORE Cajamarca.
- Siembra inicial en almácigo y posterior repique a bolsas.
- Ensayos comparativos de sustratos para identificar condiciones favorables.

### VIVERO COMUNAL


Santa Rosa de Crisnejas  
≈ 1 150 m s. n. m.

- Alternativa preliminar favorable: tierra de bosque + arena (1:1).
- Los resultados generan una base técnica para futuras campañas de producción.
- La experiencia vincula conservación y capacidades locales.



**1:1**

Tierra de bosque : arena



- Bosque interandino del Marañón
- Zona de uso de recuperación del ACR
- Suelo franco-arcilloso
- Profundidad efectiva  $\approx 20$  cm

## ¿Qué nos dicen los primeros resultados?

**60 %**

Prendimiento aproximado

**≈600**

Individuos vivos estimados

**≈40 cm**

Altura actual aprox.

10 hectáreas restauradas  
con *Parkinsonia peruviana*  
con 1000 individuos



Monitoreo semestral de  
supervivencia y desarrollo.



### Crecimiento observado



Altura inicial: 25–30 cm



Altura actual: ≈40 cm

- Los individuos presentan, en general, desarrollo vegetativo.
- El principal reto de establecimiento es el estrés hídrico.
- No se ha registrado rebrote significativo en los individuos evaluados.

## El reto clave: sobrevivir al establecimiento

### AGUA

- Estrés hídrico durante periodos de menor disponibilidad de agua.
- La mortalidad registrada está asociada principalmente a la disponibilidad de humedad.
- Se ha utilizado hidrogel como medida complementaria en algunos individuos.
- En algunos individuos se ha utilizado hidrogel como medida complementaria para mejorar la disponibilidad de humedad en el suelo.
- El monitoreo georreferenciado permite identificar espacialmente supervivencia y desarrollo.

**La restauración no termina con la plantación: empieza con el monitoreo.**



# Ficha técnica de la experiencia

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especie               | Parkinsonia peruviana                                                                                                   |
| Área                  | ACR Bosques Secos del Marañón                                                                                           |
| Vivero                | Santa Rosa de Crisnejas, ≈ 1 150 m s. n. m.                                                                             |
| Propagación           | 20 plantas madre · 85 % germinación aprox.                                                                              |
| Plantación            | 1 000 individuos · ≥10 ha /pendientes de 35–40 %/ · oct–nov 2024                                                        |
| Tiempo en el vivero   | 5 – 6 mese. Se recomienda registrar el número de meses transcurridos entre el repique y el traslado definitivo a campo. |
| Monitoreo             | Semestral · 60 % prendimiento aprox.                                                                                    |
| Altitud de plantación | 1 100–1 280 m s. n. m.                                                                                                  |
| Principal desafío     | Estrés hídrico durante el establecimiento                                                                               |



## Aprendizajes para futuras acciones de conservación

01

**Conocer primero** La identificación de nuevas subpoblaciones amplía la base para decidir dónde conservar y restaurar.

02

**Seleccionar bien** Las plantas madre y la trazabilidad de las semillas son claves para fortalecer la propagación.

03

**Experimentar** Los ensayos de sustratos y tratamientos pregerminativos permiten adaptar el manejo a la especie.

04

**Monitorear** Supervivencia, altura, estado fitosanitario y ubicación deben acompañar la restauración.

05

**Gestionar el agua** El establecimiento en campo exige respuestas específicas frente al estrés hídrico.

- Primera experiencia en la restauración del paisaje del valle del Marañón y de *Parkinsonia peruviana* a nivel nacional y regional.
- El trabajo con poblaciones locales es clave para asegurar la permanencia de la especie, fortaleciendo la protección de su hábitat y promoviendo prácticas sostenibles en el territorio como la apicultura.
- Alianzas estratégicas para proteger uno de los bosques secos con más alto nivel de endemismo a nivel nacional y mundial.



# CONSERVAR TAMBIÉN ES RECUPERAR

La experiencia con Parkinsonia peruviana demuestra que generar conocimiento, producir plantones, restaurar hábitat y monitorear resultados puede convertir una prioridad de conservación en una acción concreta sobre el territorio.



Área de Conservación Regional  
**BOSQUES SECOS  
DEL MARAÑÓN**  
"Hábitat de Especies Endémicas"  
Establecida por D. S. N°007-2021-MINAM

