N=12 · one fixed disorder 50000 · 49 contexts · four independent GFMC runs each

Exact ground state | Guide (unprojected) | Infinite-population finite-time reference | Guided GFMC ±1 run SE

Γ=0.25, h=0 | A=0/4
Γ=0.25, h=0.05 | A=1/4
Γ=0.25, h=0.1 | A=0/4
Γ=0.25, h=0.15 | A=0/4
Γ=0.25, h=0.2 | A=0/4
Γ=0.25, h=0.25 | A=1/4
Γ=0.25, h=0.3 | A=0/4
Γ=0.5, h=0 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.05 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.1 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.15 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.2 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.25 | A=0/4
Γ=0.5, h=0.3 | A=0/4
Γ=0.75, h=0 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.05 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.1 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.15 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.2 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.25 | A=0/4
Γ=0.75, h=0.3 | A=0/4
Γ=1, h=0 | A=0/4
Γ=1, h=0.05 | A=0/4
Γ=1, h=0.1 | A=0/4
Γ=1, h=0.15 | A=0/4
Γ=1, h=0.2 | A=0/4
Γ=1, h=0.25 | A=0/4
Γ=1, h=0.3 | A=0/4
Γ=1.5, h=0 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.05 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.1 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.15 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.2 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.25 | A=0/4
Γ=1.5, h=0.3 | A=0/4
Γ=2, h=0 | A=0/4
Γ=2, h=0.05 | A=0/4
Γ=2, h=0.1 | A=0/4
Γ=2, h=0.15 | A=0/4
Γ=2, h=0.2 | A=0/4
Γ=2, h=0.25 | A=0/4
Γ=2, h=0.3 | A=0/4
Γ=3, h=0 | A=0/4
Γ=3, h=0.05 | A=0/4
Γ=3, h=0.1 | A=0/4
Γ=3, h=0.15 | A=0/4
Γ=3, h=0.2 | A=0/4
Γ=3, h=0.25 | A=0/4
Γ=3, h=0.3 | A=0/4

Probability mass

Overlap q