





Женщины часто  
отказываются от приёма  
контрацепции, т.к.  
считают, что нет  
идеального безопасного  
контрацептива...



Но такой контрацептив  
уже создан —

# ZOELY®


## ИННОВАЦИОННЫЙ КОК



# В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 3 ТИПА ЭСТРОГЕНОВ В СОСТАВЕ КОК<sup>1</sup>




Только **17 $\beta$ -эстрадиол** идентичен эстрогену, вырабатываемому в яичниках женщины.




**ЭТИНИЛ-  
ЭСТРАДИОЛ**

Самый популярный.  
В составе почти всех КОК



**ЭСТРАДИОЛА  
ВАЛЕРАТ**

Клайра



**17 $\beta$ -  
ЭСТРАДИОЛ**

Только в составе **Zoely<sup>®</sup>**



# ZOELY® — ПЕРВЫЙ МОНОФАЗНЫЙ ЭСТРАДИОЛ-СОДЕРЖАЩИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ОРАЛЬНЫЙ КОНТРАЦЕПТИВ



**Zoely®** содержит номегэстрола ацетат (**NOMAC**) 2,5 мг в сочетании с 17β-эстрадиолом (E2) 1,5 мг<sup>1</sup>

- 17β-эстрадиол в препарате Зоэли биологически идентичен эндогенному эстрогену, вырабатываемому в яичниках
- номегэстрола ацетат (NOMAC) представляет собой химическое вещество, которое по своей структуре подобно прогестерону

## ПРОГЕСТЕРОН → НОМЕГЭСТРОЛА АЦЕТАТ




# NOMAC

- пероральный прием NOMAC даже в дозах до 5 мг/сутки существенно не влияет на параметры обмена и гомеостаза<sup>1</sup>, не оказывает заметного прямого действия на кровеносные сосуды<sup>2</sup>
- NOMAC не оказывает значимого влияния на уровень глюкозы в крови натощак или уровень инсулина; уровень общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП; уровни фибриногена и плазминогена<sup>3-4</sup>



## ZOELY® УДОБЕН В СЛУЧАЕ ПРОПУЩЕННОЙ ТАБЛЕТКИ ИЗ-ЗА ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ

- +** Период полувыведения Zoely® составляет 46 часов
- +** Это больше, чем у любого другого КОК, представленного сегодня на рынке контрацептивов
- +** Восстановление фертильности после его применения составляет в среднем 21 день, что согласуется с данными по другим оральным контрацептивам.





# МНОГОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ VOLERO:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТЕРАПИЕЙ ZOELY®  
(NOMAS/E2)



## Пациенты

**298** женщин

18-50 лет, получающие ЗОЭЛИ в  
рутинной клинической  
практике. Средний возраст 29.2  
лет. Исследование проводилось  
в 17 центрах в Италии

**82,2%**

не курящие

**11,1%**

лишний вес

**57,7%**

ранее использовали КОК

**35,9%**

барьерная контрацепция

**10,7%**

естественные методы  
контрацепции

## Оценивали

через 3, 6 и 12 месяцев  
(13 циклов)


1. Продолжительность применения
2. Удовлетворенность лечением
3. Менструальные симптомы, либидо
4. Нежелательные явления





## 89,2% ЖЕНЩИН БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПРИМЕНЕНИЕМ ZOELY® В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ<sup>1</sup>

Удовлетворенность применением  
женщинами NOMAC/E2



## ДОСТОИНСТВА ПРЕПАРАТА ZOELY®

-  Содержит номегэстрола ацетат — высокоселективный прогестаген на основе прогестерона, и 17 $\beta$ -эстрадиол, который структурно идентичен эндогенному эстрогену
-  Монофазный режим дозирования: 24 активных таблетки и 4 таблетки плацебо
-  Более короткое и менее интенсивное кровотечение отмены по сравнению с другими КОК
-  Отсутствие влияния на показатели артериального давления, углеводный обмен, систему гемостаза, минеральную плотность костей, появление акне
-  Высокая контрацептивная эффективность — более 99% (индекс Перля 0,38)
-  Удобен в случае пропущенной таблетки из-за длительного периода полувыведения (46 часов)



# Together for happiness

# WE

**zENTIVA**

ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА»

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2

E-mail: [info.russia@zentiva.com](mailto:info.russia@zentiva.com) / Тел.: +7 (499) 350-13-48 / [www.zentiva.ru](http://www.zentiva.ru)