When you find the one

*Когда ты нашла то единственное



Алвовизан Диеногест 2 мг


AVITUOS

ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА» 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2 Тел.: +7 (499) 350-13-48

www.zentiva.ru

Информация для специалистов здравоохранения

Предотвращение рецидивов эндометриоза после хирургического вмещательства





Операцию следует рассматривать в случае атипичных изменений на УЗИ



Болезненные кисты яичников >3-4 см в диаметре должны лечиться хирургически согласно принятым рекомендациям²



Медикаментозная терапия может назначаться для облегчения симптомов перед операцией



Послеоперационная терапия, включая диеногест 2 мг, должна назначаться с целью предотвращения рецидива эндометриоза, если женщина не планирует беременность



Диеногест 2 мг эффективно предотвращает возникновение симптомов и рецидивирование эндометриом.³



Долговременная терапия диеногестом 2 мг уменьшает размер рецидивирующих эндометриом, что является дополнительным преимуществом терапии.4

- Ally Murji, Kutay Biberoğlu, Jinhua Leng, Michael D. Mueller, Thomas Römer, Michael Vignali & Maria Yarmolinskaya (2020): Use of dienogest in endometriosis: a narrative literature review and expert commentary, Current Medical Research and Opinion
- Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D'Hooghe T, De Bie B, et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod 2014 Mar;29(3):400-12.
- Lee SR, Yi KW, Song JY, Seo SK, Lee DY, Cho S, et al. Efficacy and safety of long-term use of dienogest in women with ovarian endometrioma. Reprod Sci 2018 Mar;25(3):341-46.
- Park SY, Kim SH, Chae HD, Kim CH, Kang BM. Efficacy and safety of dienogest in patients with endometriosis: A single-center observational study over 12 months. Clin Exp Reprod Med 2016 Dec;43(4):215-20