




Лизегора (гозерелин) 3,6 мг

**Противоопухолевое средство,
аналог гонадотропин-рилизинг гормона**

- Первый дженерик европейского производителя*.
- Доступный по цене**.
- Для подкожного введения пролонгированного действия¹.
- Шприц-аппликатор с защитным механизмом¹.



* По данным ГРПС <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=%d0%93%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd&If=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&Isfs=0&IsND=-1®type=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1>
** По данным ГРПС <https://grls.rosminzdrav.ru/PriceLims.aspx?Torg=&Mnn=%d0%93%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd&RegNum=&Mnf=&Barcode=&Order=&OuterState=60&PageSize=8&orderby=pklimprice&orderType=desc&pageNum=1>
¹ Инструкция по медицинскому применению препарата Лизегора



Государственный реестр
предельных отпускных цен:



grls.rosminzdrav.ru

Лизегора (гозерелин)



Выдержки из инструкции по применению препарата Лизегора* (гозерелин)

| | |
|---|---|
| Производитель, страна производства | AMB ГмбХ Арцнаймиттельверк Варнгау, Германия Биркерфельд 1, 83627 Варнгау, Германия |
| МНН (РУС) | Гозерелин |
| Фармакологическое действие | Противоопухолевое средство, аналог гонадотропин-рилизинг гормона. |
| Форма выпуска | Капсула для п/к введения в шприце-аппликаторе в пакете-саше |
| Дозировка | 3,6 мг |
| Показания к применению | <ul style="list-style-type: none">● рак предстательной железы;● рак молочной железы;● эндометриоз;● фибромы матки;● для истончения эндометрия при планируемых операциях на эндометрии;● при экстракорпоральном оплодотворении. |
| Противопоказания | <ul style="list-style-type: none">● повышенная чувствительность к гозерелину или другим аналогам ГнРГ, а также другим компонентам препарата;● беременность;● период грудного вскармливания;● детский возраст. |

Способ применения и дозы

Способ применения и дозы

Для подкожного введения в область передней брюшной стенки.

Лекарственный препарат Лизегора 3,6 мг

Взрослые

Лекарственный препарат Лизегора 3.6 мг вводят подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней.

- при злокачественных новообразованиях длительно;
- при доброкачественных гинекологических заболеваниях не более 6 месяцев;
- для истончения эндометрия делают две инъекции с интервалом в 4 недели, при этом абляцию матки рекомендуется производить в первые две недели после введения 2-ой дозы.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

* Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Лизегора ЛП-005605 от 21.06.2019.

Способ применения



Ссылка на видеоинструкцию применения препарата Лизегора (гозерелин)

Воспользуйтесь любым приложением для распознавания QR-кодов на телефоне



Рисунок 1

- Проведите осмотр пакета-саше на наличие повреждений. Извлеките шприц-аппликатор из стерильной упаковки.
- Проверьте, в правильном ли положении находится капсула для подкожного введения пролонгированного действия в шприц-аппликаторе.
- Снимите предохранитель.




Рисунок 2

- Удерживая шприц-аппликатор одной рукой, другой рукой аккуратно снимите с иглы защитный колпачок, не касаясь иглы колпачком, чтобы избежать искривления иглы.
- В отличие от инъекций растворов, в данном случае не требуется удалять воздушные пузыри, поскольку при попытке это сделать может произойти смещение капсулы для подкожного введения пролонгированного действия.




Рисунок 3

- Введите иглу в подкожную ткань (не в мышцы или брюшную полость) передней брюшной стенки выше линии пупка.
- Захватите кожу пациента и, удерживая цилиндр шприца-аппликатора, введите иглу под углом 30–45 градусов (почти параллельно коже), располагая иглу срезом вверх.
- Иглу вводите до тех пор, пока цилиндр шприца-аппликатора не упрется в кожу пациента.
- **Данный контакт с кожей должен сохраняться на протяжении всего процесса введения капсулы для подкожного введения пролонгированного действия!**




Рисунок 4

- Нажмите на поршень шприца-аппликатора.
- Капсула для подкожного введения пролонгированного действия переместится в кончик иглы
- Ни в коем случае не вытягивайте шприц-аппликатор.
- В процессе введения цилиндр шприца-аппликатора должен касаться кожи пациента.




Рисунок 5

- После того, как поршень упрется, процесс извлечения иглы разблокируется автоматически.




Рисунок 6

- Игла втянется из кожи в цилиндр шприца-аппликатора.
- **Цилиндр шприца-аппликатора должен оставаться в контакте с кожей пациента.**
- В норме перемещение поршня и втягивание иглы происходят одним плавным движением.




Рисунок 7

- Процедура введения капсулы для подкожного введения пролонгированного действия завершена.
- Игла полностью втянулась в цилиндр шприца-аппликатора.
- Выступающий мандрен предохраняет кончик иглы от повреждения.




Рисунок 8

- Снова наденьте защитный колпачок.
- Утилизируйте использованный шприц-аппликатор разрешенным для острых предметов способом.





ZENTIVA

Компания «Зентива» —

производитель высококачественных и доступных лекарств, которые представлены на европейском рынке и за его пределами.

Компания стремится стать чемпионом на рынке оригинальных и дженериковых препаратов в Европе.

Команда «Зентива» —

это более чем 4500 профессионалов. Наши специалисты трудятся на производственных площадках, оснащенных самым современным оборудованием, расположенных по всему миру. Среди них флагманские заводы в Праге, Бухаресте и Анклешваре (Индия).

Цель компании —

максимально удовлетворять потребности людей в медицинском обслуживании высокого качества, а также обеспечить им лучший доступ к современным и недорогим лекарствам. Это должно быть правом, а не привилегией человека, убеждены в компании.

Тесное сотрудничество Зентивы с врачами, фармацевтами, дистрибьюторами, государственными и регулирующими органами дает возможность компании предлагать пациентам наилучшие условия.

ООО «Зентива Фарма». 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2
E-mail: info.russia@zentiva.com. Тел.: +7 (499) 350-13-48

