AVITASS

ТИБОЛОН НЕ ВЛИЯЕТ НА МОЛОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ





COCTAB:

28 таблеток белого цвета. 1 таблетка содержит: **тиболон — 2,50 мг**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 1:

- Лечение симптомов эстрогенной недостаточности у женщин в пост- менопаузальном периоде (не ранее чем через 1 год после последней менструации при наступлении естественной менопаузы или сразу после хирургической менопаузы);
- Профилактика постменопаузального остеопороз у женщин с высоким риском переломов при непереносимости или противопоказаниях к применению других лекарственных препаратов, преднахначенных для лечения остеопороза.



AVITAOS




Воздействуя на систему тканевых ферментов, Тиболон изменяет метаболизм эстрогенов в МЖ. Действие Тиболона на систему тканевых ферментов осуществляется в 2 направлениях ².

Во-первых, ускоряются процессы образования неактивных форм эстрогенов. **Во-вторых,** блокируются процессы образования активных форм эстрогенов.

Таким образом, на фоне терапии Тиболоном эстрогены в молочной железе неактивны.

На маммограммах тканеселективный эффект Тиболона проявляется в виде отсутствия увеличения маммографической плотности ³.



² Kloosterboer H.J. Tissue-selectivity: the mechanism of action of tibolone. Maturitas 2004 Suppl. 130-40

³ Lundström et al., Effects of tibolone and continuous combined hormone replacement therapy on mammographic breast density. Am J Obstet Gynecol 2002 Apr; 186(4):717-20



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

AVITASZ

ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА» 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2

E-mail: info.russia@zentiva.com Тел.: +7 (499) 350-13-48, www.alvogen.ru