




Велледиен

РУ № ЛП-001739



При участии Филяевой Ю.А., к. м. н., гинеколога-эндокринолога,
специалиста по патологии гемостаза, www.ogyn.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Пациентка 54 года

ЖАЛОБЫ: отсутствуют менструации в течение 3 лет, МГТ не принимала, 3 года беспокоят приливы, бессонница, боли в костях и суставах, сниженное настроение, снижение либидо.

АНАМНЕЗ:

- **Менструации** с 12 лет, после родов – через 28–30 дней по 7 дней, обильные, болезненные, с мажущими темными выделениями до и после менструации.
- **Б** – 1, **Р** – 1.
- **Контрацепция** – барьерная.
- **Гинекологические заболевания** – аденомиоз.
- **Соматические заболевания** – отрицает.
- **Наследственность** – неотягощена (онкоанамнез, тромбоанамнез, анамнез по СД отрицает).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- **УЗИ малого таза:**
 - матка размерами 54 * 49 * 50 мм;
 - М-эхо 3 мм;
 - фолликулы не визуализируются.

- **Маммография** – без патологии.
- **РАР-тест** – NILM.
- **АД** – 130/80 мм рт.ст.
- **ИМТ** – 27.
- **ТТГ** – 4,0 мЕд/л.
- **Индекс НОМА** – 2,8.
- **Липидограмма** – триглицериды в норме, индекс атерогенности повышен – 3,2.
- **По данным денситометрии** – признаки остеопении (Т-критерий – 2,2).

ДИАГНОЗ:

Нарушения менопаузы и другие нарушения в околomenopausal периоде – N 95 (МКБ-10)

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

Определить показания к МГТ – климактерический синдром, профилактика остеопороза.

Определить противопоказания к МГТ – отсутствуют.

Выбрать состав МГТ – Тиболон 2,5 мг.

Выбрать режим МГТ – нециклический (постменопауза).

Выбрать путь введения МГТ – нет специальных показаний к парентеральному пути введения.

Согласовать другие назначения с эндокринологом и кардиологом.

для СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.