




Велледиен

РУ № ЛП-001739



При участии Филяевой Ю.А., к. м. н., гинеколога-эндокринолога,
специалиста по патологии гемостаза, www.ogyn.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Пациентка 52 года

ЖАЛОБЫ: не предъявляет. 7 лет принимает Климонорм, в течение 3 месяцев отмечает отсутствие менструально-подобной реакции. После самостоятельной отмены Климонорма начались приливы.

АНАМНЕЗ:

- **Менструации** с 14 лет, регулярные, через 28–30 дней по 5 дней, умеренные, безболезненные.
- **Б – 4, Р – 2, м/а – 2.**
- **Контрацепция** барьерная.
- **Гинекологические заболевания** – ГПЭ в позднем репродуктивном возрасте (пролечена с контролем), климактерический синдром в пременопаузе, 7 лет приема Климонорма.
- **Соматические заболевания** – отрицает.
- **Наследственность** неотягощена (онкоанамнез, тромбоанамнез, анамнез по СД отрицает).

для СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- **Результаты УЗИ:**
 - матка размерами 42 * 40 * 42 мм;
 - М-эхо 2,2 мм;
 - яичники – 18 * 20 и 18 * 19 мм, фолликулы не визуализируются.
- **Маммография** – без патологии.
- **РАР-тест** – NILM.
- **АД** – 125/80 мм рт. ст.
- **ИМТ** – 25.
- **ТТГ** – 3,1 мЕд/л.
- **Индекс НОМА** – 1,6.
- **Липидограмма** в норме.

ДИАГНОЗ:

Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде – N 95 (МКБ-10).

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

Определить показания к МГТ – постменопауза, климактерический синдром.

Определить противопоказания к МГТ – отсутствуют.

Выбрать состав МГТ – Тиболон 2,5 мг (лечение климактерического синдрома, ГПЭ эндометрия в анамнезе).

Выбрать режим МГТ – нециклический (постменопауза).

Выбрать путь введения МГТ – нет специальных показаний к парентеральному пути введения.