

*When you find the one*

\*Когда ты нашла то единственное



**Алвовизан**  
Диеногест 2 мг

**ZENTIVA**

ООО «ЗЕНТИВА ФАРМА» 123112, г. Москва,  
Пресненская набережная, д. 12, 45 этаж, офис 2  
Тел.: +7 (499) 350-13-48  
[www.zentiva.ru](http://www.zentiva.ru)

**Информация для специалистов  
здравоохранения**

## Кровотечения при приеме диеногеста



**Перед началом терапии диеногестом пациентка должна быть проконсультирована по поводу изменения характера кровотечений.**

- Женщину нужно заверить, что кровотечение во время приема диеногеста не говорит о его недостаточной эффективности или обострении заболевания.
- 2 типа кровотечений могут наблюдаться во время лечения диеногестом: нерегулярные кровотечения в первые месяцы приема и «мажущие» кровянистые выделения при длительном приеме.
- Кровотечение в начале приема может продолжаться 8-10 дней. Назначение аГнРг с последующей длительной терапией диеногестом может уменьшить кровотечения.<sup>1</sup> Назначение диеногеста в 1 день цикла также может уменьшить кровотечение.
- При длительном приеме обычно возникают «мажущие» кровянистые выделения. Если на УЗИ толщина эндометрия незначительная, можно сделать перерыв 5-7 дней для восстановления атрофии эндометрия или назначить эстрадиол 1 мг перорально или трансдермально на 5-7 дней.



**При длительных АМК может потребоваться дальнейшее обследование для исключения ЗППП и другой сопутствующей патологии**

1. Kitawaki J, Kusuki I, Yamanaka K, Suganuma I. Maintenance therapy with dienogest following gonadotropin-releasing hormone agonist treatment for endometriosis-associated pelvic pain. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011 Aug;157(2):212-6.