КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Диециклен[®]



РУ № ЛП-001494

При участии Филяевой Ю.А., к. м. н., гинеколога-эндокринолога, специалиста по патологии гемостаза, www.ogyn.ru

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



Пациентка 34 года

ЖАЛОБЫ: на момент обращения жалоб не предъявляет

AHAMHE3:

Менструации с 10 лет, регулярные, через 28–30 дней по 7 дней, обильные и болезненные с менархе.
С течением времени болезненность и обильность менструации усилились. С началом половой жизни стала жаловаться на диспареунию. В 30 лет – по результатам УЗИ, МРТ, ЛСК поставлен диагноз «эндометриоз (в рамках обследования в связи с диагнозом «Первичное бесплодие»). Назначено лечение – Диеногест, который принимала 4 года (репродуктивные планы были отложены в связи с разводом).

Лечение с клиническим эффектом. С новым партнером репродуктивные планы также отложены из-за длительной командировки обоих партнеров в другую страну. Контрацепция – барьерная.

- Соматические заболевания отрицает. Не курит.
- **Наследственность** не отягощена (онкоанамнез, тромбоанамнез, анамнез по СД отрицает).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- Результаты УЗИ:
 - матка размерами 52 * 50 * 52 мм;
 - М-эхо 2,2 мм:
 - яичники 28 * 20 и 28 * 19 мм, визуализируются мелкие фолликулы.
- УЗИ молочных желез без патологии.
- PAP-тест NILM.
- АД 115/70 мм рт. ст.
- **ИМТ** − 25.

ДИАГНОЗ:

Аденомиоз. Наружный генитальный эндометриоз. Ретроцервикальный эндометриоз. Первичное бесплодие. Хирургическое лечение. Диеногест 2 мг – 4 года. Отложенные репродуктивные планы. Потребность в контрацепции.

Рекомендован препарат

Диециклен ®







ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста. ООО «Алвоген Фарма» 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, МФК «Башня Империя», оф. 1708. Телефон: +7 (499) 350-13-48. www.alvogen.ru