

ZENTIVA



**Расширение  
терапевтического  
взгляда на эндометриоз**

# СТАТИСТИКА

Эндометриоз наиболее распространен в некоторых группах пациентов:

**25-40%**

женщин с бесплодием

**40-60%**

женщин с дисменореей

**70%**

женщин, страдающих хронической тазовой болью




## Эндометриоз

Диагноз обычно устанавливают у женщин в возрасте 25–40 лет (в зависимости от того, обращаются они с бесплодием или в связи с тазовой болью), однако это заболевание может развиваться уже в подростковом возрасте.

Неспецифическая природа симптомов, связанных с эндометриозом, делает диагноз сложным и может привести к задержке в установлении диагноза примерно на 8 лет.



**Окончательный диагноз устанавливается при лапароскопии!**



# Задержка постановки диагноза у пациенток с эндометриозом

“

Согласно данным 5 исследований  
с вовлечением 1 187 женщин,  
между первыми симптомами  
заболевания и диагнозом  
проходит **8,6** лет<sup>1</sup>

# АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Задержка с постановкой диагноза приводит к тому, что эти женщины с неустановленным диагнозом так и будут ходить на прием к гинекологу каждый месяц с различными жалобами, основной из которых является боль.



i

## Симптомы эндометриоза

Эндометриоз часто сопровождается бесплодием или субфертильностью. Женщины могут узнать о том, что они могут страдать эндометриозом, только после посещения специалиста по проблемам бесплодия или после лапароскопии.

### + Наиболее типичные симптомы:


- дисменорея;
- предменструальная боль;
- диспареуния;
- диффузная / хроническая тазовая боль.

### + Другие симптомы включают:

- симптомы поражения кишечника или мочевого пузыря (часто в перименопаузе);
- боль в спине, хроническую усталость.

### + Примечание:

у части женщин эндометриоз протекает бессимптомно.




# АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Согласно рекомендациям NICE 2017, чтобы заподозрить эндометриоз, достаточно одного или нескольких из перечисленных ниже симптомов<sup>1</sup>


- + Хроническая тазовая боль — боль в тазе, которая длится **6 месяцев и более.**
- + Дисменорея, негативно влияющая на качество жизни и повседневную активность.
- + Боль, появляющаяся во время и/или после полового акта, — **диспареуния.**
- + **Гастроинтестинальные симптомы, связанные с менструацией:** боль в кишечнике, запоры или поносы.
- + Симптомы со стороны мочевой системы, связанные с менструацией: например, **боль при мочеиспускании, появление крови в моче.**
- + Бесплодие в сочетании с 1 или более симптомами.

# РЕШЕНИЕ



- ⊕ У Вас есть возможность эмпирического назначения препарата Алвовизан (диеногест) при наличии дисменореи и обильных менструаций и только при подозрении на эндометриоз
- ⊕ Возможность эмпирической терапии прогестагенами обозначена: в Российских клинических рекомендациях, в рекомендациях Американского колледжа акушерства и гинекологии (ACOG), в рекомендациях Ассоциации акушеров и гинекологов Канады (SOGC), в рекомендациях Европейского общества по репродукции и других.

## Клинические рекомендации по лечению эндометриоза. Хронология



ASRM — Американское общество репродуктивной медицины  
ESHRE — Европейское общество репродукции человека и эмбриологии  
RCOG — Королевская коллегия акушеров-гинекологов  
SOGC — Ассоциация акушеров и гинекологов Канады

## Хирургическая или медикаментозная терапия?




# АЛВОВИЗАН

содержит диеногест 2 мг, который значительно уменьшает тазовую боль, уменьшает частоту и интенсивность кровотечений. Таким образом, назначая Алвовизан своим пациенткам с дисменореей и обильными менструациями, Вы помогаете им избавиться от неприятных симптомов и повысить качество их жизни.



Диеногест является эффективным препаратом для долговременной терапии аденомиоза, эффективно купируя боль и кровотечения



ВАШ — визуальная аналоговая шкала

**+** Через год после терапии аденомиоза Диеногестом 2 мг наблюдались:


- Снижение показателей боли по ВАШ в среднем на 86%.
- Уменьшение размера матки на 30%.

**+** 57% женщин отметили аменорею



# АЛВОВИЗАН

Даже кратковременное применение Диеногеста 2 мг продемонстрировало сопоставимую с агонистами эффективность в отношении всех видов болей при аденомиозе.






ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ И  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕПАРАТОВ АЛВОВИЗАН И ВИЗАННА  
ПОКАЗАЛО, ЧТО ПРЕПАРАТЫ

## АЛВОВИЗАН И ВИЗАННА ЯВЛЯЮТСЯ БИОЭКВИВАЛЕНТНЫМИ




Биоэквивалентность может быть доказана, если границы оцененного доверительного интервала для AUC, C<sub>max</sub> и C<sub>max</sub>/AUC находились в пределах 80,00–125,00%.



### ВЫВОДЫ:

- Исследуемые препараты характеризуются высокой степенью сходства показателей фармакокинетики.
- Профили фармакокинетических кривых препаратов Алвовизин и Визанна имеют совпадающие формы.
- Препараты характеризуются близкими значениями относительной биодоступности, максимальной концентрации и относительной скорости всасывания.
- Доверительные интервалы для AUC, C<sub>max</sub> и C<sub>max</sub>/AUC соответствуют допустимым пределам 80–125%.
- Препараты имеют сопоставимый профиль безопасности.



# АЛВОВИЗАН

## Диеногест 2 мг

Лекарственная форма: таблетки 2 мг

Фармакотерапевтическая группа: гестаген

Форма выпуска: таблетки № 28, № 84 и № 168

Срок годности: 2 года

Условия отпуска: по рецепту

Производитель: Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ (Германия).

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<sup>1</sup>:

Лечение эндометриоза

Применение препарата в особых клинических группах пациенток.

Пациентки детского возраста.

Препарат не показан к применению у детей до наступления менархе.

Эффективность препарата была продемонстрирована при лечении эндометриозассоциированной тазовой боли у подростков (12–18 лет) с общей благоприятной безопасностью и переносимостью.



*When you find the one\**

\*Когда ты нашла то единственное